





LEXICON
MEDICUM

GRÆCOLATINUM
COMPENDIOSISS.

à

BARTHOLOMÆO CASTELLANO

MESSANENSE
INCHOATUM:

Nunc verò

MYSTARUM APOLLINEORUM
in COMMODUM PUBLICUM,

Operâ & studio

EMMANUELIS STUPANI, Philos. &
Medic. Basileens. ac Collegii Medicor.
p. r. Decurionis;

EX

HIPPOCR. GALEN. AVICENN.

& complurium aliorum

summè celebrium MEDICORUM

MONUMENTIS

AUCTUM, ILLUSTRATUM,

& PERFECTUM.



F.K.

BASILEÆ,
Impensis JOH. JACOBI GENATHI,
Anno MDCXXIIX,

Castellano

VIRTUTI & HONORI
VIRORUM CLARISSIMORUM,
EXPERIENTISS.
IOHANNIS KÜEFFERI,

&
GEORGII BINERI,
DOCTORUM, & MEDICOR.
apud Argentoratens. celeberr.
summis quin & PRINCIPIBUS
desideratis.

FAVITOR. & AMICOR. COLENDOR.
QUALES-QUALES
HOS

LABORES SUOS, & MEDITATIONES,
AFFECTUS SUI, IN ILLOS
ILLIBATI,

&
perennaturæ amicitiae, firmissimos
ceu obsides,

INSCRIBIT, OFFERT &
COMMENDAT
EMMANUEL STUPANUS, PHILOS. &
MEDICUS BASILEENS. THEOR.
PROFESS. ORDINAR. &
MED. COLLEG. p.t.
DECURIO.

*Non sunt contemnenda tanquam parva, sine quibus
magna constare non possunt.*



EPISTOLA DE DICATORIA.



IN ealarum remigio volatum me-
ditatur, Viri Clariss. Consummatiss.
Icariū mox facturus casum, qui mor-
borum, horumq; effectricum causariū,
absque cognitione corporis, quod cir-
cumferimus nobiscum, status naturalis pariter &
p.n. curam methodicam, adgredi non veretur. Is
liquidem duntaxat Medicus, ait Hippocr. in l. de arte,
qui potest dignoscere, sanare potest. Incogniti au-
tem nulla est curatio morbi. Enimvero, Iarices
genuinorum nominum & terminorū, citra expla-
nationem, materias Medicas velle cognoscere, est
tempus perdere. l. i. de m. m. c. s. Nimirum primum, &
necessariū maximè, benè definiendi, feliciter dispu-
tandi, & accuratè res quaslibet cognoscēdi, princi-
pium, ipsissima est vocum explicatio, quā neglectā,
differtationes nostræ nec de re-ipsā, nec ad rem, sed
ad nomina inania, nuda, turpiter instituuntur. Arist.
l. 8. topic. c. 2. Undè (ab initio, qui parvus apparet er-
ror, in fine, ne fiat maximus. Arist. l. i. de Cæl.) *ἡγὺς τὸ
ὀρθῶς διδόνειν τε καὶ τὸ ἐπιμαρτυρεῖν, καὶ ἡγὺς τὸ
ὀρθῶς εἰπεῖν τε καὶ τὸ ἐπιμαρτυρεῖν*, ne in Disciplinarū campis, *ὡς αἰεὶ
λαλεῖν*, versari, & finè alis, aquilæ volatum conari,
imitariq; velle dicamur. Quem in sensum Gal. l. i. de
temper. c. 3. scitè admodum dicit, Verba, rebus, quia
arctissimè nexa sunt, idè illorum significationem

EPISTOLA

qui ante omnia nō rimantur, eos in miros labyrinthos devenire, cunctis ludibrio fieri, quin & pulcerrimas rerum scientias, tetrīs errorum tenebris hoc pacto involvi necessum est; vocabula siquidem, τῶν τεχνῶν μὲν ὄργανα διδασκαλίας καὶ διανοημάτων, τῶν δὲ πραγμάτων διδωμάτια καὶ ἐργαλειῶν, προσέτι ἡ τῶν οὐτὴ ψυχῇ παθημάτων ὁρὴ φύσολα. *Plat. in Cratyl. Aristot. l. de Interpret.* Eadem deniq; nomina disciplinarum in universum omnium fenestras velut sunt & claves, quibus ea propter non probē ante omnia trutinatis & explicatis, ad illarum possessionem pertinere licet nemini. Et profectō, quemadmodum à fastuoso turris Babylonicæ opere, homines olim dispersi, illud infectum relinquere coacti sunt, vocabula, quibus se-se mutuō loquentes, ad necessitatem intelligerent, quia non habuere: *Genes. iii.* ita præsenti seculo, Paracelsi, quod jacet, doctrina ænigmatica, quibus mysteria sua (si diis placet) involvit magis magisque, in causa sunt nomina nova, inaudita, barbara, per quæ, è Saturni velut prompta podice, turpiter illudit, nempe quod, quæ dicit, scire & intelligere vult neminem. Rectius *Gall. lib. i. m. iii. j.* ait, Artium omnium, medicinalis cumprimis, voces & terminos, vult & præcipit, ut sint perspicui, longo usu recepti, proprii, & mysteriis Medicis designandis accommodati. Quod commodum & beneficium summum utique, Dictionariorum subsidio solo consequimur. Via herclē expeditissima, quam, immenso latices pelago, committentes se-se, Ariadnæ velut filum, quorquot festantur, ad summum ejus apicem, virtute connixi deducuntur promptissimè: undē, quod de iis, qui erran-

DEDICATORIA.

erranti comiter viam monstrant, memoriæ prodidit Tullius, eos, quasi de suo lumine, lumen accendentes, facere, ut cū alteri accenderint, ipsis nihilominus adhuc luceat. Quid-ni id-ipsū de ipsis dici queat Lexicographis, qui suis in Lexicis, proprias disciplinarum dum voces, harumq; significationes explanant, & proprietates, expeditissimam simul ad illarum perfectionem perveniendi, digito velut monstrant viam. Profectō, cū, divino Platone attestante, primi ad scientias aditus, ipsaq; disciplinarum principia obscurissima, prædensis velata sint tenebris, adeō ut, vix dum illis initiati, de internā illarum luce abditissimā desperantes, subsidiis hujusmodi, quibus ceu manu ducuntur, quoties destituuntur, easdem vel deferant protinus, vel, Andabatarum more, clausis, quod ajunt, oculis, motu vagabundo, Artium in stadio, deerent, earumque fructum, & finem ultimum nunquam assequantur. Sanē vel hinc liquet, quid de Compendiis simul & Dictionariis Medicis (totius Artis summam exprimentibus, ejusdemque elementa & principia graphicè delineantibus) judicii ferre deceat: ipsa videlicet haudquaquam, tantum parva, contemnenda, sinē quibus magna, haud minus ac ædificia suis absque fundamentis, constare nequeunt. Hæc sola est ratio, quod unaquælibet disciplina & scientia, propria sua habeat Lexica. Hinc Lexicon Theologicum, Juridicum, Philosophicum; quid-ni Medicum etiam extaret Lexicon, quo, idoneā velut clave, latices penetralia, ejus magis magisque adaperirentur cultoribus? Hac verō in parte, tūm alii complures Viri

EPISTOLA

omni laude dignissimi, inprimis JOH. GORRAEUS & JOH. MANARDUS defudârunt quàm plurimum, quin & BARTHOLOMÆUS CASTELLUS Messanenſis, ſuam, hæc in re, ſoboli Apollineæ, gnaviter præſtiturus operam, ſuccinctam, operoſis illorû ex operibus, extraxit velut epitomen, & omiſſis ſimplicium medicaminû (quippè quas materiæ Medicę ſcriptores copioſè ſuggerû) appellationibus, affectuum p.n. cumprimis, aliorumque Medicinæ *τεχνημάτων*, & inſigniorum terminorum, definitiones, etyma, & ſignificationes illuſtiores, enucleare ſategit. Quod opusculum, ad Medicas res cognoscendas inprimis utile, quàm plurimos ante annos Patavii Anten. ſtudio Apollineo, cum vacarem adhuc, limâ, & elaboratione perfectiore, mihi, jam tunc, quàm viſum eſt digniſimû. Quod proinde, Philiatorum petitioni, & induſtrii noſtræ JOH. JACOBI GENATHII Baſil. Typographi poſtularo, annuës, anno ſuperiori, ad manus ſumens, Artis medicinalis propria & germana nomina, inſigniora Cui dogmata myſtica quæ deſignâr, ordine alphabetico, quàm fieri potuit diligentiffimè, & cõmodiſſimè digeſta, ex Graeco idiomate, illorum pleraque dimanent quantumvis, Latinis ſcripſi, reddidi characteribus, ac mox origine illorû & etymo indigitato, uſitatiores crebrioresque eorundem acceptiones perſequutus, has ipſas, Hippocratis inprimis, & Galeni, ſed & aliorum celebriorum Medicorum auctoritatibus, & testimoniis illuſtrare, & declarare placuit. Prætereâ, omni orationis & ſtyli barbarie (quę opusculum hætenus non parùm obſcuravit) acriter expugnatâ, reſectis item heterogeneis,

DEDICATORIA.

geneis, quæ antea nec ſufficienter, nec ſatis clarè, locoque minùs cõmodo, explicata erant & tractata, ſuſius dilucidavi, & ſuo loco reſtitui, adeo ut Editio hæc, novam Inſcriptionem, & faciem priore multò venuſtiorè aſſumēs, Iatricēs ſtudioſis (ad quorû ſtudia promovenda, omnia mea unice cõparata ſunt) dubio procul exoptata futura ſint & deſiderata.

Vobis verò, Viri Clariff. Excellentiſſ., Medicum hoc Lexicon, ſummis laboribus elimatum à me, & perfectum, inſcribo: quippè quos itidem, & ad publica ſtudioſiſſimæ Juventutis Apollineæ cõmoda juvanda, quàm propenſiſſimos, & materiârum Medicarû amore flagrantēs, cognitione conſummatos, uſu, & experienciâ, admirabiles eſſe novi. Præſens itaque opusculum, ſummè eximias animi dotes, & virtutes veſtras eminentiſſimas admirantis, cumprimis raram illam veſtram medendi peritiâ & dexteritatē, cum feliciffimo ſuccèſſu conjunctam, micante velut in bracteâ fulgentem unice ſuſpiciuntis animi mei, integerrimi ad hæc mei erga vos affectûs illibati, monumentum ut ſit, & ceuvoriva, in quâ, ſummi mei, in vos, veſtrosque omnes ſtudii ardentiffimi, ſigna depicta velut pateant, tabella; familiaritatis denique noſtræ, conſuetudinis priſtinæ, & complures ante annos hic initæ amicitie noſtræ perennaturæ, ut ſit obſes velut & arrha, geſtio unice, opto animittûs, etiam atque etiam peto.

Factum temerariû forſan, tenue nimis, minùsque tûm ſingulari veſtrâ humanitate, tûm tantis virtutibus veſtris, & præclariffimè de Iatrice, ipſisque ægrotantibus meritis, conveniens & dignum: auxiliatrix ſiquidem veſtra manus, veſtra inquam

EPIST. DEDIC.

haud Argentinam duntaxat, & Alsatiā totam, sed & perdisita Europæ loca percrebuit medendi felicitas & industria, quò sit, ut tu cumprimis D. JOHANNES KÜEFFERE, tuaque summis à Principibus, & Dynastis, munitissimisq; ab Urbibus, harumq; capitibus, certatim jugiter sit expectata opera medica, summisq; identidem cohonestetur & deprædicetur præmiis, aded quidem, ut ambobus vos, fastidiosus à medicationibus, & molestissimis à peregrinationibus, atq; ad externos patientes excursionibus assiduus, vix tantillum respirantes, vobis vix ac ne vix quidē quidquam, quod Theoriæ, & principiorū meditationi ulteriori, tribuatis, superet temporis. Interim quidquid sit, Vos, Viri Clariss. Excellentiss. mihiq; amicissimi, quæ vestra est æquanimitas rarissima, quale-quale hoc munusculum, eo quo obfero, æquo bono animo suscipirote, obsecro, ipsius lectione, serios & herculeos labores vestros Medico-præcticos demulcerote, id-ipsūq; solidę eruditionis & auctoritatis vestræ fulgore, potenti ceu clypeo, sinistra adversum Sciorum judicia, & iniquissima Momulorū flagella munitore. Valete, salvet, Viri Clariss. Excell. Dabam currenti calamo, ex Musæo meo, Calendis Septembribus, Anno MDCXXIX.

VV. Excellent.

Studiofissimus

EMMANUEL STUPANUS, D.
& Professor Medic. ordinarius.

PRÆ-

PRÆFATIO

AD

REI MEDICÆ STUDIOSOS.



Nihil arduum nimis, aut laboriosius jussu, unquam existimavi, quod è re & ex usu tuo animadverti, studiose Lector: nimirum nihil mihi jucundius à prima ætate visum est, quàm prodesse cunctis, nocere nemini; non enim nobis solis, sed posteris imprimis nascimur, & Homo Homines adjuvando, ad Deum quàm proximè accedit. Cum igitur experimento longo comprobatum sit, plerosque eos, qui rem medicam, non tam sapientiæ, quàm lucris studio sectantur, cum primum humaniores literas superârunt, & vix è primis Grammaticæ rudimentis emerint, in altum Philosophiæ, & immensum Medicinæ pelagus, se ipsos ignoratis utriusque scientiæ vocibus, quæ prima elementa censentur, infeliciter precipitare, atq; sic, cæco ductore, in vastissimum scientiarum campum, & inextricabilem labyrinthum, citra Ariadnæ filum, (quo remeare possent) ingredi, Græcæq; literas, unde omnis scientiæ, tum præsertim Medicæ rei cognitio, & rerum, & vocum proprietates ortum duxerat, à primo certè limine insalutatas intermittere & præterire: unde postea sit, ut in reliquo Medicinæ curriculo cœcutientes, nihil unquam laude dignum præstent. Propterea tanta temporis studiorumq; & studioforum calamitati consulturus, nullisq; laboribus parciturus, id oneris assumpsi, & in hoc laboravi unicè, ut mea fidei & doctrinæ commissos, primum & ante omnia Medicinæ elementa, rudimenta, principia, & voces, Artūq; terminos insigniores sedulo edoceram, & tūc demum principis hujusmodi instructos ad supremum ejusdem facultatis apicem, virtute connixos deducerem, ut hinc & Medicarum vocum, & univærse Artis cognitio illis facile pateret, nec esset necessum, ut ipso in progressu in re exigua, vocum scilicet significatione, illi diutius, quàm par est, immorarentur, sed ultrò ad altiora ejusdem facultatis axiomata, cognitis vocibus, possint assurgere, quàmvis Græcarum literarum essent prorsus ignari. Non ignoro equidem, id labori à Doctissimo Manardo, Joanne Gorraæ, ceterisq; nonnullis assumptum fuisse: ab illo tamen intempestivâ morte quippè sublato, opus inexplerum; ab hoc completum quidem, sed ob voces & literas Græcæ ab iis saltē, qui Græci idiomatis peritissimi sunt, quorum non nisi paucissimi, peritum.

intelligi posse. Neuter insuper ex Galeni Hippocratisq; autoritatibus
vorum Medicarum explicationem & significationem hausitam, ad-
duxit, sed eas, ut quisq; interpretatur, explicavit obiter. Nec in eo-
rum ego sum genere, qui ne olus quidem in foro empturi sunt, citra
huius definitionem, neq; vocis ullius significationem admittunt,
priusquam eiusdem essentiam quiddam iura (ut in Scholis ajunt)
definitione percrutati fuerint. Mihi satis superq; fuit, etymon &
vocius cuiusq; significatum principalissimum, ex Hippocrate, Galeno
& aliis de sumptum, succincto sermone explicare, ut ii, qui accura-
tius vocis intelligentiam pendere voluerint, ex iisdem Autoribus,
ad quos Lectorem remittimus, eam facile consequantur. Monitum
insuper volote, Lector amicissime, (ne quid in hoc opusculo desiderari
existimes) me hic simplicium & sponte nascentium è terra corporum
appellationes, & harum significationem non attulisse, cum eorum
omnium à celeberrimo Matthiolo, voces & nomina, quæ in usu
sunt, in suo de Simplicibus volumine maximo, recensita, &
declarata fuerint. Interim nostro hoc labore, in tuam
unius gratiam suscepto, studiose Lector,
utere-fruere feliciter.
Vale.



Ad
Excellentissimum & Experientissimum
VIRUM,

D. EMMANUELEM STUPANUM,
Philosophum ac Medicum acutissimum, Theori-
ces Professore ordinarium, & p.t. Collegii Medici
apud Basileenses Decurionem spectatissi-
mum, Compatrem, & Fautorem
suum honorandum.

I.
STUPANUS ille, Prasidis qui sustinet
Nunc inter ordinem medentium vices;
Hic, quæ Camænas excitare Rauracas
APOLLO pergit carminis dulcedine,
Placere Genti semper Aesculapica
Magnò labore nititur; seu pulpita
Scandit Palæstræ, sive dexteram admovet
Docta Papyro. Testis esse LEXICON
Potest, politum durior pumice,
Videre quod vult Phæbicam nunc lampadem.
Devincit undè Paonas cunctos sibi,
Nomenq; fastis inserit perennibus.

Observantiæ testimonium
P.

JOHANNES SCRETA, Schotnovius
à Zavorzitz, Pragâ-Bohemus,
M. D.

II. HIP

HIPPOCRATES brevis est; prolixus in arte GALENUS;
Contrahis hunc; illum reddis at explicitem.

FUCHSIUS innumeris mendis navisq; scatebat;
Nec RIOLANE tuis ultima lima aderat.

Luxuriat CASTELLUS ibi; hic mox deficit idem,
Verbaq; non penitus barbariem effugiunt.

Omnibus his adhibes limam, multumq; terendo,
Sæpe revolvendo, scripta polita minus

Expositis, illustras, emendas, perficis, auges,

STUPANE, ô Medici stella corusca chori!

Luminis inde tui radios emititis ubique;

Atque novis laudes laudibus accumulas.

Perge ita; quin nobis posthâc da plurima scripta;

Erue, quod reliquum, nare sagace animi.

Perge; Jurventutis conatus atque labores

Subleva, & erranti porrige, queso, manum.

STUPANI labor hic, STUPANUM, illud jubar ævi,

Volver ad alta Poli; volver ad alta Sali.

Huic DEUS omnipotens duplicatos Nestoris annos

Addat, ut amplificet Pæonis Artis opes.

Debita observantia atq; gratitudinis ergo
adpos.

JOHANNES MELDER, Ulmenfis,
Medicinæ Doctor,



LEXI-



LEXICON MEDICUM,

EX

HIPPOCR., GALENI, AVICENNÆ,
ALIORUMQ; MEDICORUM
OPERIBUS
CONCINNATUM.



ABAPTISTA, sive Abaptistum, terebella est, quâ in fracturis capitis (quæ usq; ad cerebri membranam pervenerunt, & in quibus id, quod contusum est, extrahi debet) utimur: Cui terebella (ne dum Medici eam audacius tractantes, duram membranam, quæ osi substernitur, violent) supra ejus acutam cuspidem, circum quendam sive labrum, sive supercilium, parum protruberans addidere. Vide Gal. l. 6. de m. m. c. 6. & Celsum lib. 3. c. 23. ubi monent, chirurgicum hoc terebellum, in cranii osium perfractorum & contusorum perterebratione usurpari solitum, ab ægeio & baptisto sic dictum, nimirum quod propter obicem, in summitate illius, quæ conspicitur, neutiquam immergi, altiusq; desigi possit, & cerebri meningis hoc pacto intacta conserventur.

Abarticulatio, idem est quod dearticulatio, συσπρωγος Græcis, est ea naturalis osium conjunctio, quæ evidentem motum habet; sicut coarticulatio, Græcis συνσπρωγος dicta, est ea naturalis osium commissio, quæ exiguum &

A

obscurum aliquando, aliquando nullum motū præ se ferr.
l. 2. de artic. 8. & Hipp. l. de ofs.

Abdomen, ab abdendo sic dictum, communiter idem est quod imus venter, Aristoteli γαστήρ l. 1. hist. anim. 13. vocari solitus, qui superius quidem cartilagine ensiformi, ad latera costis spuris, inferius autē osibus pubis circumscribitur, ac dividitur in partem supremam, (quam in specie γαστήριον nuncupant) mediam, (quæ umbilicalis est regio) & infimam seu hypogastrium. lib. 6. de us. part. cap. 4. Prestissimè autem acceptum Abdominis vocabulū, Anatomicis est ventris imi pars extima, totum illud, quod viscera naturalia integens, ex cute pinguedine, musculus octo & peritoneo compactum est. Gal. loc. cit. & 2. aph. 35.

Abductiones, quæ & abruptiones, Græcis ἀνάπτυξις & ἀποπόσειξις dicuntur, fracturæ sunt, quæ prope articulum, per totam osium crassitudinem, disrupti ad instar caulis, & per medium dissecti raphani in modū, fiunt, aded ut perfracti osis extrema, à se plurimū distent, quas recentiores assatim factas fracturas nuncupant. Gal. com. 3. in lib. Hipp. de his, quæ in medicina fiunt. 31.

Abluentia, & abstergentia medicamenta sunt, quæ succos mordicantes biliosos acres leniendo, evacuant, & intestina eluunt quasi & abstergunt, 1. de simpl. med. facul. c. 37. & lib. 2. c. 14.

Abolitionem pulsūs vocamus, cum applicatis digitis mōtus artieriarum desicit, ac percipi omnino nequit. Differt interim pulsūs abolitio, Græcis ἀποψύξις dicta, à pulsū deficiente seu intermittente: Illa enim totius functionis pulsatilis velut defectus est & privatio; Hic dimidia sātē actionis est amissio. l. 2. de caus. puls. c. 3.

Abortus, est imperfecti fœtus exclusio, à quibuscunque causis

causis & utcūq; facta, quæ Hippoc. nunc ἀβόρσιον, nunc ἀποπόσειξιν vocat; & medicamenta id præstantia, ἀβόρσινα, i. e. abortiva nuncupant. com. 1. in 6. de morb. vulg. 2.

Abrasa, ἀποσύνεσις Græcis dicta, sunt ulcera, quæ mollem & suspensam habent cuticulam. 1. de compos. medic. per gen. cap. 1. Exponitur aliàs quoq; locus desquamatus & frustulum, in ulceribus à partis ulceratæ substantia abrasum.

Abrasio intestinorum, est ulceratio partium in intestinis superficiariarum, quæ earundem partiū ramenta educuntur. 3. de ratione vict. in morb. acut. 33.

Abruptio. Vide Abductio.

Abscedentia corpora, sive quæ abscefferunt, vocat Hippocr. omnia, quæ, cum corpus secundum naturam sese habet, unita aliis partibus sunt, easq; attingūt; in præternaturali constitutione autem unionem vel contractum non ampliū servant. Expansa autem vocat, quæ plurimo intervallo inter se distant: id quod duobus modis fit, vel in toto, vel in labris tantum. 2. de his, quæ in medic. fiunt. 25. Vide Apostasis.

Abcelsio apud Hippoc. generaliter sic dicta, idem est quod continuitatis solutio: & membra, quæ ita affecta sunt, abscedentia vocat; tamen si certa quadam species soluta continuitatis, nempe ea propriè abscessio sit & abscessus, quam in specie apostasin & apostema nuncupant. lib. de his, quæ in medic. fiunt.

Abcessus, tumor est præter naturam suppuratus, constans pure rarerer bono, magnā ex parte ad corruptionē quandam tendente. lib. de tumor. c. 3. Aliquando Hippoc. non eos solos abscessus vocat, qui per fluxionem fiunt, sed etiam cum transit morbus in alium. comm. 2. in 1. de morb.

vulgar. 21. Abscessus definitur aliàs, quòd sit phlegmone
in pus transmutatio. lib. finit. med. fol. 97.

Abfissio, Græcis Apocoe, hinc morbus ex abfissione,
est, qui citra declinationē solvitur, & terminatur in mar-
tem, vel propter ægrotantium imbecillitatem, vel propter
morbi fortitudinem & ferociam, nimirum cum morbus su-
pra vires existit, quod lethaliū morborum est propriū.
Gal. l. de totius morb. tempor. cap. 1. & 5.

Abstergentia. *Vide* Abluentia.

Abvacuatio, aliis hypercristis, seu hypercatharsis, largissima est evacuatio, corpori plus aquo plethorico aut cacochymico conveniens, per patientem aut quamcunque aliam particulam facta. Gal. in Arte parva, c. 95.

Acamatos, media est omnium simpliciter membrorum
figura, (quasi sine fatigatione dixeris, optima.) l. 2. de motu
muscul. c. 1.

Acantha generaliter sic dicta, est spina indiscrimina-
tim qualiscunq; , pressius si sumatur, animalium quorun-
dam, ut echinorum piscium, notat aculeos : in specie Gale-
no, dorsi est spina, seu spina apex, quem natura in spondylis
dorsi est machinata, ex mediis partibus postremisq; , po-
diens, quae esset velut vallum quoddam inter spinam totam
oppositum, quod prius ipsum contrundi, modisq; , omnibus
affici sit necessum, quam ad nullum spondylum noxa perve-
niret. 12. de usu part. cap. 15.

Accessio, alias paroxysmus, & invasio, est deterius
tempus totius circumsus, quod est à primo insultu morbi, us-
que ad tempus & regressus, sive per tertium, sive per quar-
tum, sive quotidie fiat. l. aph. 12.

Accidens aliquando passionem significat, & ipsam
operationis lesionem. l. de differ. morb. c. 7. ubi inquit, Quae
consti-



constitutionem partium similiarium necessario sequuntur,
sanis quidem nobis accidentia, ægrotantibus symptomata
dicuntur. i. meth. med. c. 9.

Accommodatum in corpore dicitur id, quod jussu se-
se habet ac cujuslibet partis nature est accommodatum.
L. de fractur. 2.

Acerbum dicitur, quod sapore pollet adeo adstringente, ut lingua nostra admotum, hanc mirè afficiat, valde desiccat, contrahat, & in multam profunditatem usq³, illam exasperet, sicut pyra sylvestria immatura, ab austeris solâ intentione diversa. i. de simpl. medicam. facult. cap. 37.

cap. 37. Acetabulum, Græcis coryle, est illud cavum ossis extre-
mi, quod capita alterius ossis altius excipit. lib. de ossib. in
proëm. Acetabula præterea dicuntur, vasorum & vena-
rum, quæ ad matricem perveniunt, orificia, (quæ & cory-
liones appellantur) quibus fœtus matri alligatur, & per
quæ fœtus, ex matrice trahit spiritum & sanguinem. 15. de
usu part. c. 5. Non secus ac Polypi acetabula, dicuntur ex-
tremitates vasorum, per quæ polypus nutritur. lib. de semin.
cap. 7. Insuper, acetabula dicuntur vasa, per quæ singulis
quibusq; mensibus excrementitius sanguis in vulvam deri-
vatur. ibid. Quamvis nonnulli homines vulvam aceta-
bulis carere dicant. lib. de vulvæ dissect. cap. 10. Deniq; pro-
fundos sinus, magnis superciliis circumdatos, tum Hippocr.,
tum alii, acetabula nuncupare consueverunt. 1. de artic. 21.

Acerabulares vulvæ eminentiæ, sunt tumores va-
sorum uteri, ex reſento menſtruo diſtencorum prægnatio-
nis tempore evenientes, quales etiam recto inteſtino in hæ-
morrhoidibus accidunt. lib. de vulvæ diſſect. cap. 10.

Achinesia, Græcis ἀκίνησις, i.e. immobilitas, strictissime

6 sic dicta, est media quies, quae inter systolen & diastolen pulsus intercedit. 1. de differ. puls. c. 7.

Achlys circa totum nigrum oculi, à superficiali huius ulceratione facta, est cicatrix tenuissima, aëri caliginoso assimilis. lib. Introd. cap. 5.

Achoures, sunt manantia ulcera pericranii, seu cutis capitis, tenuissimis foraminibus cutem perforantia, ex quibus glutinosa effluit sanies. Huic morbo affinis est Favus, seu Cerion, in quo tamen foramina sunt, quam in illis paulo maiora, melleum humorem continentia. lib. de remed. parat. facil. cap. 5. lib. de tumorib. cap. 15. 1. de comp. medic. loc. cap. 8. Vulgus ulcera haec vocat Tigna & Tineas; Arabes Sabafati.

Achrous, i.e. decolores homines. 4. de rat. vict. 115.

Aciam vocat Hippoc. filum per foramen acus Chirurgi trajectum, quo vel partes corporis dissectas inter se committere, vel caput fasciae subjectis partibus, assuere consuevimus; Nodum verò nuncupat vinclionem, quae ex fasciis inter se connexis exoritur. comm. 2. in lib. de his, quae in medic. fiunt. 7.

Acida bilis, propriè bilis atra, aut succus atrabilarius dicta, quid sit, exemplo ostendit Galenus; Vinum quidem dulce, (inquit) quod nondum ab uvis expressum fervet: ex eo, quem in se habet, calore, ex cuius mutatione duo proveniunt excrementa, alterum levius magisque aëreum, quod florem, alterum gravius ac magis terreum, quod facem vocant; horum alteri flavam bilem, alteri nigram assimilamus: qui succi quidem non eandem habent naturam & speciem, neque naturali, nec praeter naturali in corporis nostri constitutione; quippe flava quae est, efficitur vitellina, ovorum vitellis tum colore, tum crassitudine similis, nigra

nigra verò longè malignior, ea quoque, quae similis ei, quae naturalis est, redditur. Nomen tali succo nullum est inscriptum, nisi quoddam aliqui eum vel radentem, vel acidum appellant, quoniam acris in morem aceti fit, & corpus animalis radit, terramque si supra eam effundat, fermentet veluti, ubi adventitia putredo, nigro illi succo naturaliter se habenti accesserit. Plerique talem succum naturaliter se habentem sive supernè sive infernè rejiciatur, facem, & limum quasi sanguinis, quin & atrum vocant succum, non autem atram bilem, quippe quae ex ustione quapiam melancholiae naturalis inprimis, sed & aliorum succorum producit. Gal. lib. 2. de natur. facult. cap. 9.

Acida pituita est, quae omnino cruda est, talisque in secunda concoctione, quae in venis peragitur, facta fuit. lib. 2. de natur. facult. c. 9.

Acinosa tunica oculi. Vide Rhagois tunica.

Acinus. Vide Staphyle.

Acmaistica febris est, quae continuè crescit & intenditur: ut Epacmaistica, quae decrescit jugiter; Homotona verò, quae similem calorem ad finem usque servat. 1. 9. meth. 4.

Acmen, ἀκμή, i.e. maximam exercitationis & motuum intentionem Graeci vocant. 2. de sanit. tuend. c. 2. Sic etiam etatem integram, juvenilem mediam, & summum, quod in illa viget, corporis robur significat. Inde translata est vox ἀκμή tum ad alia omnia, tum ad morbos: & sic tertium totius morbi tempus, in quo summum habet vigorem, ἀκμή dicitur Hippoc. 1. aph. 13. & Gal. 1. 1. de sanit. tuend. c. 2. & 1. 6. de sanit. tuend. c. 6.

Acopa medicamenta, quae τὸν νότον, i.e. laetitudinem ex multo vehementius, motu corporibus vel totis, vel huius particulis abortam tollunt, appellamus. Dicuntur etiam

acopa pharmaca, quæ dolorem diuturnum in alto corporis latentem, vel motum difficilem, vel particula duritiem, vel tensionem, vel tumorem scirrhosum tollere apta sunt. lib. 7. de compos. med. per gen. cap. 11. & lib. 7. de compos. med. local. cap. 1.

Acor, est ructus quidam acidus ex presentia ciborum corruptorum in ventriculo. 5. de usu part. c. 4.

Acordius homo, i.e. secors, iis duntaxat, qui principatum Anime in corde statuunt, dicitur. lib. 3. de placit. Hippocr. & Plat. cap. 4.

Acosmia. Vide Ataxia.

Actisæ vocabulum ab Hippocr. dupliciter usurpatur, vel cum omnino nullum, aut pravam iudicium futurum est. comm. 2. in 1. de morb. vulg. 46.

Acrochordon, verrucarum genus dolens, cuius exortus orbicularis, angustam obtinens basin. lib. Introd. fol. 97. Id ipsum Galenus vocat pensilem verrucā, 2. meth. med. 2. Acrochordon Aërius & Celsus definit, quod sit verruca sub cute, durior, asperior, callosa, & plerumq. teres, cuti concolor, infra tenuis, ad cutem latior, juniores maximè infestans, sic dicta, vel quod vertice suo similis sit resectæ chordæ, secundum extremitatem, vel quod in imo adeo angusta, ut pendere videatur.

Acromia, vel Acromion, propriè est summus humerus, humerive pars summa, exterior & prominens, brachioq. hærens; notat insuper eam compactionem, quâ os scapulae, à spina tenue inchoatum, paulatimq. plenius effectum, ad Acromii locum pervenit, & brachio connectitur. Alii præter hæc ambo, quæ conjunguntur, tertium os esse inquirunt, quod in hominibus solumprehenditur, idq. Cataclida & Acromion appellant, l. de osib. c. 14. & l. 13. de usu part. c. 10.

Actio-

Actiones, Prisci omnes activos motus nominant, sicut omnes motus, qui naturaliter se habent, nisi activi sint, pathemata, i.e. passionem, Græci vocant. 2. meth. cap. 3.

Actu aliquid tale esse, ex adverso est ei, quod est & dicitur esse potentia, 1. de simpl. med. facult. c. 9. Rursum verò quod energiâ sive actu calidum, frigidum, humidum, siccum esse dicitur, tale est, vel quod summam habet ejusmodi qualitatem, vel vincentem qualitates contrarias, sive ad cognati generis mediocre aliquid, sive ad unumquodlibet aliud, a nobis collatum. 3. de temp. c. 5.

Acuta exercitatio est, cujus celeres motus sunt. 5. de sanit. tuend. cap. 3.

Acutus morbus est, qui ob sui magnitudinē, & symptomatum vehemētiā, ad summū vigorem celeriter properat, & cum agri periculo tempora sua celerrimè percurrit. 2. aph. 23.

Acutus simpliciter morbus est, qui intra quartumdecimum diem integrè judicatur; Acutus verò ex decidentia, sive ex delapsu, usq. ad quadragesimū diem sese extendit, & ulterius. 2. aph. 23. Peracutus verò morbus, qui ad septimum usq. diem se extendit: Qui autē longius procedit, (sicut modò dictū) is dicitur simpliciter acutus: uti qui quartum diem attingit, exactè peracutus vocatur. 2. de dieb. decr. c. 12. Hippocrates acutum ex delapsu, morbum vocat adauctum, & acutum ex conversione. 3. progn. 10. & 1. prog. 25. Acutas etiā simpliciter appellat eas febres, quæ maximā ex parte cōtinuæ sunt. 2. de cris. 12.

Adedentes, i.e. phagedenæ. lib. de acr. aq. & loc. cap. 2. Vide Phagedenæ.

Aden, i.e. glandula, convolutio quadam est sicca, & carnosæ, vel carnosæ conglomeratio. lib. finit. Medic. fol. 97.

A 5

impresionis Veneta. Eundem adenem, corpus carniiforme vocat, quod utiq; velut cuneus quidam, vasorum divisionibus prepositum fulcimentum ipsis tutum suggerit, ut à nullo violento casu afficiantur, 4. de us. part. cap. 20. quem adenem Thymum vocat, 6. de usu part. cap. 4. Insuper, adenam, seu glandulas, vocat carnosas partes raras, & spongiosas, quæ in alis, inguine, & collo sunt, 13. meth. cap. 5.

Adeps, qui & axungia, & sævum, Græcis & æq; dicitur, differt à pinguedine, quod ille crassior sit, animantibusq; natura terrestris ffs. provenit, velut humidiorib. pinguedo. Insuper, hæc liquefit facili, coalescit difficulter; econtra autem adeps concrefcit promptius, sed non nisi ægerimè funditur, ut docetur lib. 2. de part. anim. cap. 17. & Gal. lib. 11. de simpl. med. facult. c. 17.

Adiapneustia, i. e. impedita perspiratio, 11. meth. 10.

Adjutorii os, Hippocrati dicitur os humeri, quod maximum omnium est, femore excepto, lib. de osib. cap. 16.

Adnata tunica, quæ & agnata. Vide Rhagois.

Aegilops, Anchilops, Arabibus Algaras, Barbaris abscessus est, ad angulum oculi, qui naribus propior est, pus continens, quod acrimoniâ suâ, temporis decursu os exedit, & usq; ad nares destillat, lib. Intro. cap. 15. & 5. de compos. medic. loc. cap. 2. & lib. de remed. paratu facil. cap. 12. Id ipsum ulcus, si neglectum fueris, in fistulam desinit, lib. de oculis, cap. 9.

Aequalis & temperata ad pondus temperatura, est in omnibus animalibus & stirpibus ea, quæ ex pari, quoad fieri potest, elementorum commixtorum spectatur mole: sicuti econtra æqualis temperatura ad iustitiam, est, quæ tum animalis, tum stirpis naturæ convenit; (convenit enim aliis, ut humidum sicco, aliis, ut frigidum calido præponderet:)

deret:) & quæ non tam pōdere & mensurâ, sed ex eo, quod unicuiq; pro dignitate convenit, æqualitatem explorat; animalia enim, & stirpes, optimam mediamq; habere in suo genere temperiem dicimus, non utiq;, quasi paritas exacta contrariorum in iis sit, sed quod talis mediocritas, quæ cujuslibet mixti naturæ accommodata est, iisdem adsit, l. 2, de temp. cap. 3.

Æqualis inæqualitas dicitur, non in pulsibus modo, sed aliis propè omnibus, quæ pristinam naturam immutantia, sive magnitudine, sive qualitate equalia capiunt incrementa aut decremēta: nam quatenus æqualitatem primamq; naturam commutant, inæqualia vocantur; sed quatenus æqualem & parem semper mutationē assequuntur, æqualiter dicuntur mutari, & æqualiter inæqualia vocantur, lib. 1. de differ. puls. cap. 11.

Æqualis morbus est, qui æquales motus, symptomata similia, parilemq; ad finem ferè usq; obtinentes magnitudinem, perpetuò sibi constant; cum econtra inæquales morbi aliquot diebus vehemēiores fuerint, postea sine aliqua significatione torpent, mox rursus adaucti continuitatem accipiunt: quo argumento ab Hippocr. dictum est, Continuorum morborum & equalium acutiem non posse ultra diem decimum-quartum protendi, 2. aph. 23.

Æqualis pulsus est, cum omnes ictus æqualem inter se servant proportionem, ita ut secundus respondeat primo, & tertius secundo, 1. de differ. puls. cap. 10.

Æquivoca sunt, quæ nō sunt unius generis: quacumq; enim nomina unam speciem multis singularibus communem significant, univocè de ipsis dicuntur; quæ verò de multis differentiibus specie dicuntur, æquivoca nuncupantur: uti in primis res, quæ ipsis subijciuntur, ab ipsisq; significantur,

ficantur, equivoca sunt. *comm. 3. in lib. de his, quæ in medic. fiunt. 24.*

Aëroſis, quasi *Aëratio*, vel sanguinis attenuatio, & in halitus solutio, est sanguinis portio maximè aërea, vaporosa, aëri, qui per inspirationem attrahitur, permixta, ex qua spiritus generantur pariter, & instaurantur. Quin & *dépoſis*, idem est, quod custodia vel conservatio, vel restauratio spiritus deperditi ex respiratione & transpiratione, & qui ex sanguine attollitur, vapore. *11. meth. 3.*

Aeruginosa bilis, quæ ærugini similatur. Vide *Bilis pallida*.

Aethiologia, sive *Pathologia*, Medicina pars est, in qua ea, quæ præter naturam sunt, inquirimus, morborum genera, symptomata, utrorumq; horū causas, & accidentium concursus, &c. *lib. Introd. c. 7.*

Affectio sanguiflua, est idem quod *αἱμορραγία*, in qua plurimum sanguinis profunditur. *comm. 2. in 6. de morb. vulg. 14.*

Affectus magnus & gravis dicitur, aut propter præcellentiam partis laborantis, aut propter affectus magnitudinē, aut propter ipsius cacoëthiam. *4. meth. c. 6.* Spectatur enim affectus magnitudo tripliciter; ex læsæ actionis præstantia, ex propria affectus essentia, & ex læsa facultate, quæ læsum corpus gubernat. *7. meth. c. 12.*

Affectus flatuosus præcordialis & melancholicus est, quo, iis maximè, qui inclinante ætate plurimā Venere utuntur, sub autumnum maximè, inflatur & tumescit venter. *comm. 3. in 6. de morb. vulg. 12.*

Affectus implicatus est, in quo multa sunt affectæ partes, à diversis tum morbis, tum causis morbidis obsessæ: nam potest idem homo non solum laborare ex thorace, sed etiam

etiam simul & eodem tempore ex pulmone, capite, ex iusto ventre, & ex jecinore decumbere. *comm. 2. in 3. de morb. vulg. in argum.*

Affectus, qui & *χῆσις* dicitur, est dubia & incerta, minimèq; firma corporis dispositio; is verd, qui firmus & certus est, & quasi habitus, *ἔξις* dicitur & *διὰβσις*. *8. meth. cap. 3.*

Affectus, quos Græci *παθήματα* vocant, passionēs sunt, quæ in corporibus nostris fiunt præter naturam. *com. 2. in 1. de morb. vulg. 23.* Dictus verd affectus sive affectio ab afficiendo, & de multis quidem effertur rebus; in Medicina verd recessus in statum præter naturam, qualescunq; ii fuerint, affectus sive affectiones nuncupantur. *lib. de cur. rat. per sang. mis. cap. 3.*

Affectus puerilis. Vide *Comitialis morbus*.

Affusio nutrimenti, Græcis *parenchyma* dicitur, *lib. Introd. cap. 9.* Vide *Parenchyma*.

Agathon significat apud Hippoc. idem quod idoneum, natura nostra congruum, certum item, stabile, verum, & perpetuum, ut auctor est Galenus *com. 2. in lib. de fract.* Idem verd testatum reliquit in *com. lib. 2. de articulis*, *Agathon* apud veteres id omne dici solere, quod in suo genere primum est, & perfectum.

Agerasia, i. e. infescentia. *lib. de marc. core, cap. 2.*

Agglutinatio. Vide *Prosthesis*.

Agitatio. Vide *Vibratio*.

Agnata tunica, sive *adnata*. Vide *Ophthalmia*.

Agonia, est inæqualis motus, ex timore & ira compositus, timore intro & ad vitæ principium, ipsum cor, tum sanguinem, tum spiritum unà cum refrigeratione eorum, quæ in summo corpore sunt, abducente, & contrahente, irâ verd foras

foras agente, & fundente calore, simul spiritum, & sanguinem. lib. 2. de sympt. caus. cap. 5.

Agrestis lichene, i.e. impetigo. 6. de compos. med. per genera, cap. 2. Vide Impetigo.

Agrypnia, i.e. vigilia. 2. meth. 2.

Apathia, impatibilitas, uti econtra ἀπαθεία est perpetua passibilitas. lib. art. med. c. 8.

Alæ aurium. Vide Aurea. Vide etiam lib. Introd. c. 10.

Alæ narium, sunt tenuia cartilagineaq; corpuscula utriq; nasi lateri à parte inferiori adnata, lib. de osib. c. 4. quæ etiam pinnulas vocant, lib. Introd. c. 10. Vocant adhuc & pinnas, 2. de loc. affect. c. 2.

Alaria ossa. Vide Sphenois.

Ala etiam dicitur superhumeralis, Græcis ἐπ' αὐτοῦ, i.e. superior humeri pars, quæ ad collum vergit; nam humerus totū id, quod in dearticulatione hac apparet, & quod inter duas juncturas humeri & cubiti intercedit, vocatur. Vbi rursum advertendum, id, quod nō apparet à posteriore parte, os scapula; ab inferiore verò parte, id, quod dum totum brachium attollitur, manifestum fit, in specie etiam alam nuncupari. 1. de artic. 4.

Alba vitiligo. Vide Leuce, & Vitiligo.

Albam pituitam Medici aqua inter cutem speciem, leucophlegmatian, nominant, quod in ea pituita sit alba, & propter mixtionem aliorum humorū, verum mutet colorem. 7. aph. 29.

Albaras. Vide Aegilops.

Albugineus oculi humor, similis albumini ovi, aliàs & aqueus, oppositā parte vitrei humoris exterius, ante crystallinum positus, non concretus ut alii humores, sed liquidus, in foramine tunicae uveæ collocatus, superfluitas est crystal-

crystallini humoris aquea, ad ipsum, visibilibus adversum vehementiam defendendum, suā humiditate. lib. de anat. vivor. Vide Hyaloides, & Crystallinus.

Albugo, cicatrix est crassa, & profunda, ulceri (oculi Iridem quod obsidet) inducta. lib. finit. Medic. lib. Introd. cap. 17.

Albulam, vocant aquas aluminosas: quin & Rhetia montem, nivibus jugiter obsitam. 8. meth. 2.

Alexipharmaca medicamenta sunt, quæ deleteria, i.e. lethalia venena, intrus assumpta evacuant, obtundunt, & fugant. 5. de simpl. med. fac. cap. 18. & 1. de semin. cap. 16.

Alexiteria medicamenta sunt, quæ venenatarum bestiarum morsus & ictus, ipsaq; venena sanant. 5. de simpl. med. facult. cap. 18.

Alhacab, est illud ligamentum, quod ad muscolum non extenditur, sed ab osse uno natum, continuatur inter duo extrema osium, aut inter alia duo membra, annectendo unum alteri, firmiter subsistit. lib. de anat. vivor.

Alica, ex genere tritici est. 1. de alim. facult. cap. 6.

Alienam caliditatem vocat Aristoteles externam, nō insitam, neq; nativam in quocunq; rerum genere; nam hac coquere apta est, extrema autem & externa corrumpere solet & putrefacere. lib. 2. de differ. febr. cap. 9.

Allantoides. Vide Chorion.

Alopecia, capillorum destitutum est, propter vitiatos humores sic appellata, quod vulpibus frequenter accidit: 1. de compos. med. loc. cap. 2. & in qua locus affectus appareret scaber, colore prorsus exanguis. de remed. pat. facult. c. 6. Eandem aliqui vocabulo specialiori etiam areas vocant. 2. meth. c. 2.

Alphi, i.e. vitilignes, ex humorum vitiostrare, quæ in cute

cute sunt, quemadmodum etiam de Lepra planum est, oriuntur. lib. de humor. com. 3. Vide Vitiligo.

Alteratio, est alimenti concoctio, usque-quod in similitudinem partis, quæ nutritur, transmutatur. 8. de compos. med. loc. cap. 6.

Alvus liquida appellatur, in qua liquida dejiciuntur. comm. 2. in 1. prorrh. 3.

Amara bilis, ea & pallida, & flava dicitur. 2. de differ. febr. cap. 1. Vide Bilis pallida, & Picra.

Amaurosis, est totius in oculo lucis impedimentum, visio obscura & tenebrosa, visus hebes & obtrusus, acutis morbis accidens, & imbecillis facultatis animalis signum. comm. 2. in 1. prorrh. 11. 20.

Ambas. Vide Ambonæ.

Ambolica i. e. abortiva medicamenta. Vide Abortus.

Amblyopia, est visus hebetudo, in qua oculi nec phlegmone tenentur, nec influxu torquentur, nec ulcerati sunt, nec aliud quidvis mali aliàs perpetiuntur. lib. 5. de simpl. med. facult. cap. 23.

Ambonæ, sunt margines, sive labra, & supercilia coryllarum, & cavitatum, 2. de usu part. cap. 17. quas quidam etiam ambas appellant. 1. de artic. 10.

Ambusta sunt, quæ igne, vel ardenti, aut regiâ aquâ comburuntur, ita ut bullas aliquando excitent, 9. de simpl. med. fac. quæ etiam ambustiones vocantur. 11. de simpl. med. fac. Constat autem, si quis in aqua ferventi ustus fuerit, hunc etiam affectum Pyricauton, i. e. ambustum igne, nominari. 1. de compos. med. per gen. c. 4.

Amentia. Vide Anœa.

Ametria, est à justa temperie recessus. 2. meth. c. 4.

Amni-

Ammata, fascias Græci vocant, quibus venter, pectus, costæ, lumbiq; alligantur. 3. de sanit. tuend. c. 2.

Amniculum. Vide Chorion.

Amnium. Vide Chorion.

Amolynta, i. e. non inquinantia medicamenta, similia his, quæ propriè epithemata dicuntur. 7. de comp. med. per gen. cap. 11.

Amphiblestroides, i. e. retiformis seu verrucalis tunica, quæ à cerebro ad oculos profecta, vitreum & crystallinum humorem ambit; cujus tunica figura, in latum diffusæ, atq; expansi nervi verriculo similis apparet: ut est lib. 3. de placit. cap. 5. Vocant tunicam retiformem, quod figura quidem reti sit similis, ceterum nullo pacto est tunica, neq; colore, neq; substantiâ nervum referens, sed si exemplam ipsam reposueris, cerebri portio quadam, aut potius quoddam quasi illius videbitur excrementum. 10. de usu part. cap. 2. Vide Choroides.

Amphimerina febris est, quæ singulis diebus accenditur, atq; intermissione finitur. Idem planè, quod quotidiana simplex; eam enim, quæ intermissionem non habet, non Cathemerinam, ut quidam, sed Quotidianam contrinam vocat Gal. 1. 2. de differ. febr. c. 7.

Amphismela, est instrumenti genus, quo Anatomici secant corpora. 6. de Anatom. adm. cap. 10.

Amuleta medicamenta, quæ Græci *περίεργα* vocant, sic appellantur, quod de collo suspendantur, aut alicui corporis parti alligantur, lib. de remed. par. fac. cap. 1. eademq; qualitatibus familiaritate, seu potius totius essentia similitudine venena trahere & juvare creduntur. Gal. lib. 5. de simpl. cap. 18.

Amygdalæ. Vide Paristhmia.

B

Amylum, ex tritico cibus. 1. de alim. fac. cap. 8.

Anabrosis, quæ & Diabrosis dicitur, est solutio con-
tinuitatis, in osse, vel in vase aliquo, ex erosione ab humo-
ribus mordacibus introducta. 5. loc. aff. 5. Vide Diabrosis.

Anacollemta, medicamenta sunt fluxiones oculo-
rum restringentia, de remed. par. fac. cap. 10. quæ fronti, &
temporibus imponuntur. 11. de simplic. med. fac.

Anadiplosis, est accessionum reduplicatio. lib. de Ty-
pis, cap. 4.

Anadosis, est nutrimenti per venas transitus ad hepar,
idemq; est ac digestio, seu distributio. Differt à Diadosi,
quod sit translatio, traditio, vel porrectio nutrimenti in
invisibilium nervorū, arteriarum, extimarumq; partium
substantiam intimam, nutrimento à lateribus illorum va-
sorum attracto & translatō. 2. de nat. fac. 6.

Analeptice, renutritoria refectoriaq; vocata, est vi-
ctus ratio. 7. meth. 6. Unde Analepsis, i.e. resumptio. lib. de
marcore, cap. 9.

Analogismus, est comparatio & perceptio causarum
morbidarum, præfidiorumq; juvantium, per similitudines.
ad Thrasib. cap. 11. Sive, Analogismus est ratio, quæ ab evi-
denti auspiciata in rei obscuræ cognitionem nos inducit.
1. progn. 6.

Anaplerotica medicamenta sunt, quæ cicarrices
crassant, & alta profundaq; vulnera in carne complent &
ad cicatricem perducunt. lib. de Dynamid.

Anasarca, quæ & Catasarca, Hypofarcidium, &
Epifarcidium dicitur, Hydrops species est prima, mitis-
sima, in qua cruditates copiosissimæ in tota inferiore tho-
racis regione acervantur, habitusq; totus pituita plenus
redditur. 4. de rat. vict. 11. Diciturq; Anasarca, & aqua
inter

inter cutem, quodd per carnem ille humor pituitosus crudus
fluat. lib. finit. med.

Anastoechiolis, quasi reelementationem dixeris, est
colliquatio, seu resolutio, seu dissolutio, aliquando totius
corporis substantiæ, aliquando succorum, qui in venis sunt,
duntaxat: quod autem ex ea colliquatione provenit, alias
ad ventrem confluit, alias ad urinas, alias ad sudores pel-
litur. 3. de sympt. caus. cap. 2.

Anastomatica, i.e. aperientia medicamēta, quæcunq;
vasorum oscula aperire apta sunt; id quod rursum præstat
extergendo, incidendo, obstructiones tollendo, & dividen-
do: differuntq; à rarefacientibus, sive diaphoreticis, quippe
quæ cutis tantum meatus referando, sudores, aut
alioquinæ aëre volu promovenr. 5. de simpl. med. fac. c. 14.

Anastomosis. Vide Osculorum apertio.

Anarasis. Vide Catarasis.

Anatome, est humani corporis totius, abditarumq;
cumprimis ejus partium, dissectio, & speculatio, ut sensibus,
quæ in iis delitescunt, patefiant, pleniorq; & facilior ea-
rundem instituat curatio. lib. finit. med.

Anatryplin, i.e. refractionem veteres Græci solent ap-
pellare, non eam duntaxat, quæ ab inferiore parte sursum
ducitur, sed absolute omnem quomodocunq; factam fri-
ctionem, seu fricationem. comm. 3. lib. de his, quæ in medic.
sunt. 25.

Anchilops. Vide Aegilops.

Anchoralis processus. Vide Ancyroides.

Anchyle. Vide Ancyle.

Ancon, ἀγκών, communiter totus est gibbi cubitus, pro-
priè magis gibberi medium, cui innititur, seu brachii fle-
xum notat, & manus curvaturam: dicitur quin imo

Ancon, alterum majus cubiti os, quod & Olecranon vocat Hippoc. 2. de usu part. cap. 2. Vide Brachium.

Ancos, sive Galianconas, ἀνκὸν ἢ γάλανον, i.e. à felibus aut aliunde deducto nomine, eos vocat Gal. & Hippocr., qui brevibus sunt lacertis, aut quibus, cum auferentur eorum corpora, ex luxatione brachii, in alam, os brachii brevius evasit. 3. de artic. 38.

Ancyle, sunt poplitis flexura & curvatura, uti & ejusdem poplitis partes retrorsum post genua spectantes. lib. Introd. cap. 10. Unde Ancylas, sive etiam Ancyllas, vocat difficiles artuum motus, & ligationem nervorum, articularumque contractiones. 7. de comp. med. per gen. c. 6. Vide Poples.

Ancyroides, processus acutus exiguusque, est in interiori parte, ossis cervicis, & scapulae, qui cum anchoram, vel corvinum rostrum referat, Anchoralis, & à nonnullis Coracoides nuncupatur; quandoquidem extrema ejus pars, uti cornicula rostrum, ad exteriora inclinatur. lib. de ossib. c. 14. 1. de artic. 2.

Aneurisma, est arteriarum, & partium, quibus illae implantantur, tumor p. n. pugni interdum magnitudine, pulsus edens velut arteria magnus, & molestus, qui cum premitur, ex parte refugit, sed mox iterum erumpit: causa antecedens, est arteriarum substantiae nimia dilatatio, orificiisque earundem apertio; proxima, est sanguis arteriosus tenuis, ex arteria erumpens sub cute, eam in tumorem attollit, illicque sinum sibi efformat, in quem arteria sese exonerat. Galenus ait: Ore autem in arteria facto, aneurisma vocatur. Fit autem, vulnerata arteria, cum ad cicatricem pervenerit, quae ei adjacet cutis, manente interim arteria ulcere, eademque, neque conglutinata, neque ad cicatricem simul perducta, neque à carne obstructa; quo fit, ut arteria

teria sanguinem jaculetur, qui contineri non potest. lib. de tumor. cap. 11. Ubi etiam haec addit: Dignoscuntur porro aneurismata, arteriarum haud solum pulsibus, sed & quoddam cum premuntur, omnis tumor delitescat, recurrente in arterias sanguine, qui illum fecit, tenui spirituofo, &c.

Angina, ab angendo, quoddam angat guttur, viamque spiritui pracludat, in genere dicitur omnis faucium & gutturis affectus p. n. in quo respiratio quoquo modo fit deterior; proprie est phlegmone, alias extra collum sitarum partium, alias intra tonsillas reconditarum inflammatio talis, quae simul partes quoque, afficiuntur respirationis, & egra spiratio sequitur. lib. finit. med. Vel brevius, est tumor ad fauces & venas jugulares modò à glutinosa frigidaque fluxione, quam pituitosam vocant, modò à calida & acri, quam picrocholam biliosamque, appellaveris, quae & Cyananche dicitur, 4. de rat. vict. 30. Aliis Synanche, aliis Paracynanche, aliis Parasyanche appellatur. 4. de loc. aff. 3.

Angor, est cordis nativi caloris quoddam quasi contractio, & in centrum retractio, ad quam sequitur ejusdem cordis dolor, palpitatio, & tristitia; pessimumque, est signum, si in principio acutarum febrium advenerit. 1. de humor. com. 1. 4. de diff. puls. cap. 3. & com. 2. in 1. de morb. vulg. 75.

Anguli oculi, sunt interiores oculi termini, ubi palpebrae coalescunt, alter juxta nasum, juxta tempora alter, hic parvus, ille magnus dicitur: uterque autem Canthus, i.e. angulus, appellatur, lib. Introd. c. 10. Dicuntur & Hirque oculorum, lib. de venae sect. contra Erasistr. c. 6.

Angustus pulsus. Vide Pulsus latus.

Anhelosi sunt, qui densum spiritum habent, & simul thoracem multum distendunt: quod contingit in affectionibus, multum à inspiratione indigentibus; ut, à cursu, aut ve-

hementi exercitatione, & ardentibus febribus. 3. de diffic. respir. cap. 11. Propriissimè, anhelationes, asthmata vocat Gal. 1. 8. de simpl. Quando, inquit, qui citra febrem densè respirant, qualiter faciunt, qui velociter cucurrerunt, ab accessione hac, Medicis Græcis, asthmatici, Latinis anhelosi appellantur; eosdem etiam ab alia accessione, orthopnoicos vocant, quod totum corpus rectum habere & cervice erectà spirare coguntur ob timorem suffocationis, & proin stratum circa supernas partes, ad quas thorax reclinatur, sibi ipsis erectius faciunt, ne dormientes strangulentur. 7. de compos. med. loc. cap. 6. & 3. aph. 26. & comm. 2. in 3. de morb. vulg. 4.

Anima (apud Galenum) aut temperamentum activarum qualitarum est, aut illud, quod temperamento alteratur & organo veluti in operando utitur. 3. de loc. aff. cap. 7. & comm. 5. in 6. de morb. vulg. 5. Vide Calornativus.

Animalis motus est, qui animantium corporibus, cum sana sunt, pro arbitrio & voluntate, impetu nervorum, musculorumque ministerio fit, quem Medici voluntariam actionem, sive animalem appellare solent. lib. de trem. & palp. cap. 2.

Animalis virtus est, quæ ex cerebro originem ducit, quæque ex moruum voluntariorum vigore aut imbecillitate deprehenditur; perinde ut virtus, quam ex corde prodeuntem, vitalem nuncupamus; ex pulsum debilitate, atque ex hepate quæ orta, naturalis dicitur, ex sanguineis eggestionibus ab initio aquosis atque tenuibus, postmodum vero crassis ad modum secis. 1. ad Glau. 14.

Annotatio, quam *ἐπισημείωσις* vocant, est accessionis principium. 2. aph. 1. Dicitur etiam annotatio, sive significatio,

ficatio, sive *σημείωσις*, i. e. morborum dignotio ex similibus ac dissimilibus consideratione. 1. de his, quæ in medic. sunt. 1.

Annotatio incompressa, hecticarum febrium proprium indicium est, cum pulsus major statim, ac velocior à cibo efficitur, sine ullo interim horrore, dormitatione, pigritia, frigefactione extremorum, aut inequalitate pulsus, aut frigiditatis caliditatisve sensu: ut dicitur lib. 1. de diff. febr. cap. 9. Vide Febris.

Anodyna, i. e. dolorem sedantia, sopientia, & narcotica medicamenta, 12. meth. 1. quoniam sensum animale sopiendo, dolores sedant, non tamè dispositiones penitus sanant, sed vim sentiendi obtorpescere faciunt. 1. 2. ad Glau. 6. ait, Anodyna dolorem sedantia sunt, sed facultas anodyna alia reverà talis est, alia improprie *ἀνωδύνα* dicitur, eo sensu, ac si quispiam hominè mortuū dicat *ἀνωδύνα*, quia dolore vacet. Caterum, vera anodyna facultas, est eorum, quæ primo ordine calefaciunt, & sunt essentia tenuis; at facultas eorum, quæ dicuntur anodyna quidem, sed reverà non sunt, frigida est & aquea, quæ absoluto utentia frigore, partem obstupesciunt; unde & narcotica, i. e. stupescientia dicuntur. 5. de simpl. med. fac. cap. 9.

Anœa, Græcis *ἀνοία*, i. e. amentia, est ratiocinatricis functionis veluti paralysis, & abolitio. lib. de symptom. differ. cap. 3.

Anomæomeres, membrum est, quod ex dissimilibus partibus est conflatum. 7. meth. 6.

Anorexia, i. e. inappetentia, idem significat quod Astia, & Apostia, i. e. abstinentia à cibo. 4. aphor. 17. Vide Apostia.

Antegressa causa, quæ & antecedens, Procatarectica, anticipans denique, procataxchon dicitur, est, quæ

extra corpus posita, eas, quæ in corpore dispositiones sunt, antegreditur, ac corpus nostrum subiens, id ipsum vehementer & violenter alterat, l. 5. de caus. puls. cap. 1. quascunq; dispositiones, vel motus in ipso animali præter naturam, morborum præcedentes causas nominat; quæ verò extrinsecus adveniunt, & alterant corpus, atq; naturam vehementer transmutant, præincipientes appellat, in lib. de caus. morb. cap. 2. Eadem primitiva, & initiatrix dicitur, 6. de loc. aff. 4. quin & prophasis, & occasio appellatur, com. 3. in 1. de morb. vulg. 19.

Antheridæ, i. e. floridæ appellatæ compositiones. 5. de comp. med. loc.

Antiadæ, sunt glandula, quæ sibi ex adverso in oris termino utrinq; jacent, & ex fluxione in tumorem attoluntur. 3. de caus. sympt. cap. 4.

Anticardion, dicitur cavum illud, quod sub pectore est, carneum molleq; ad os ventris pertingens: vocatur etiã Sphage. Rufus verò, cavitatem eam pectoris, quæ est ad claviculas, tradit ab Homero dici Leucaricon, à Medicis verò Anticardion & Sphagen.

Anticipans morbus est, qui cum diversis horis semper accedat & remittat, prævenit quidem continuò, citiusq; horas persolvit, unde anticipans dicitur, sive prolepticus; qui verò tardat, hystericus sive posteriorius veniens nuncupatur. lib. de Typis, cap. 3. Vide Antegressa.

Anticnemion. Vide Gastrocnemion, Sura, & Tibia.

Antichir, est magnus digitus manus, qui & pollex, & promanus dicitur. lib. de muscul. dissect. cap. 22.

Antidixis, contraindicatio, sive indicationum contradi-

tradictio: indicationes autem, sunt auxiliorum inventiones. 2. meth. cap. 7. Vide Endixis.

Antidorus, medicamentum est, quod non extrinsecus impositum, sed intus assumptum malignas, cæcæ & latentes corporis affectiones sanat. 1. de antidotis, cap. 1. Mos est junioribus Medicis, antidotos appellare, non modò quæ adversus mortifera medicamenta, quæq; ad morsus ictusq; venenosos exhibent, sed etiam quæ contra malas corporis affectiones, præsertimq; diutinas valent, ex aliquo ulcere aut abscessu consurgentes. 2. de antid. cap. 6.

Antispasis, i. e. ad contrarium revulsio; avertitur enim sanguis, atq; ad alia membra convertitur, cum ad proxima derivatus, tum ad contraria revulsus: illud Parocheureusin, hoc Antispasin Græci vocant. 5. meth. cap. 3. Vide Revulsio.

Antispatichon, i. e. auxilium in diversa revellens. 13. meth. 11.

Anthrax, i. e. carbo, seu ulcus escarosum, iis, quæ exusta sunt, quàm similimum; cui adjungitur partium circumstantium inflamen. 6. aph. 45.

Antitalis est, cum quæ disident ossa, ad hoc, ut è directo admoveantur, prius retrorsum trahuntur: osium hæc ad oppositum tractio, Antitalis dicitur, 6. meth. 5.

Anulus, est recti intestini orificium sphinctere musculo donatum, per sedem prodians, quo excretionem, cum lubet, aliquandiu retinemus; sic dictus à figura: ab officio verò strictor dicitur. lib. Introd. cap. 10.

Anus, seu vetula. Vide Umbilicus. Dicitur etiam anus, inferior corporis pars, quæ excrementa redduntur. 3. de usu part.

Apagma, Medicorum appellatio propria est, quoties

osis finis, quâ parte maximè cum alio committitur, caulium disruptorum ad-invicem abruptus est. 6. meth. 5. Vide Abducciones.

Apanthismos, est subtilissima linea, quæ agrè videri potest, quasi tu exolecentem lineolam diceret; cui similia sunt, venarum quadam propagines, filorum araneæ, aut capillorum modo angustæ, & extensæ, quæ venæ capillares dicuntur, lib. de dissect. venar. & arter. cap. 8.

Aparachyton vinum, i.e. vinum meracissimum, purum & originale, cui marina aqua non est admixta. 4. de compos. medic. per gen. cap. 7.

Apechema, diremptio est osis superficialis, vel etiam profunda in partibus ictui oppositis. lib. finit. medic.

Apepsia, i.e. cruditas. 2. meth. 2. Vide Concoctio.

Apepta phymata, solitus est Hippoc. nominare cruda tubera, seu tumores præter naturam, nervosa corpora, vertebra ipsi atq; spinali medullæ insita, extendentia: causam nempe gibborum effectricem. 4. de loc. aff. c. 3.

Aperientia. Vide Anastomatica.

Aperistaron, i.e. cavum ulcus apertum. 2. de compos. medic. per gen. cap. 1.

Aphonia, i.e. obmutescencia, seu vocis carentia, quæ ægris solet accidere, haud laesis duntaxat iis, quæ voci efformanda subserviunt, instrumentis, sed etiam iis, quæ respirationi deputavit natura; quin etiam ob recentem quandam exsolutionem, & afflictionem virtutis animalis, & sensorii communis, cerebri affectus. 4. de rat. vict. 23.

Aphorismus, quam nervosissimus sermo, & succincta oratio, quæ omnes rei proprietates brevissimis verbis circumscribit. 1. aph. 1. Quin & aphorismos definitiones appellat. 3. de his, quæ in medicina fiunt. 32.

Aphthæ,

Aphthæ, sunt ulcera, puerorum summam oris partem occupantia, ob summam mollitiem maximè facta earum partium, quæ neq; tactum, neq; qualitatem lactis sustinent, quod non parvam in se serosam cōtineant partem, 3. aph. 24. ex quo etiā habent aliquid igneæ caliditatis. 6. de compos. med. loc. cap. 4. & com. 3. in 3. de morb. vulg. 12.

Apices matricis, sunt processus quidam mammillares, utrinq; ad latera matricis, ad ilia inclinantes, à Grecis cornua matricis appellantur, per quæ cornua semen à propriis testiculis, vulva attrahit, ut virile per collum. l. de confect. vulvæ. & l. 2. de femin.

Apios, cibus & porus est omnis qualitatis, quæ sensu deprehendi potest, expers, qui neq; adstrictionem, neq; acrimoniam, aut aliam insignem facultatem obtinet, qualis inter humidas substantias, est aqua. l. 1. de aliment. fac. 8.

Apnoea, i.e. ablata spiratio. l. 2. de rat. vict. 43.

Apoclasmata. Vide Abducciones.

Apocope. Vide Abscisio.

Apocrustica, i.e. reprimentia & repellentia medicamenta, quæ adstringendi vim obtinent. 11. meth. 15.

Apodacrytica, i.e. delacrimativa, & percussoria lacrimarum. 4. de compos. medic. loc. cap. 5.

Apoplepsis. Vide Interceptiones venarum.

Apomeli, mellis decoctum intelligo, quod conficitur ex aceto cum melle commisto, tantisper tamen simul decocto, quoad utrorumq; qualitates inter se uniantur, & aceri vis retundatur. 3. fract. 49.

Aponeurosas, sunt tendones, quos muscoli generant, qui ad artuum fines pertinent. 3. aliment. fac. 5. Dicuntur autē Aponeuroses, quasi denervationes & nerveæ musculorum extremitates, 1. de anat. adm. c. 5. quoniam muscoli

in

in eos desinunt. 1. de motu muscul. c. 1. Vide Nervus, Tendones, Denervationes.

Apophlegmatismus, medicamentum, quod ore coluitur, aut dentibus manditur, cuiusmodi pharmata omnia, unâ nomenclaturâ comprehendentes, apophlegmatizonta nominant, ac eorum facultates, apophlegmaticas. 5. de simpl. 20. Rectius autem Apophlegmatismus est medicamentum, quod pituitam per os ex capite, aut thorace educit. 6. de sanit. tuend. c. 10.

Apophihora. Vide Aborlus.

Apophysis, est extranea ossis pars, seu adnata, Latinis appendix. lib. de ossib. in proem.

Apoplexia, est ablatio sensus, & motus in toto animalis corpore. 3. de loc. aff. 10. & 2. aph. 42. Vide Caros, & Paraplegia.

Apoplecticæ venæ, aliis Sphagitides, & Jugulares externæ, seu superficiariæ, Arabibus Guidez manifestæ vocantur, sunt quæ infernè ad aures utring, singula feruntur, à quibus superficiariæ fere omnes, tum colli, tum capitis partes nutriuntur. 6. de usu part. & initio secundi de rat. vict. Apoplecticæ vocantur, quod harum ex interceptione, & obstructione, apoplexia oriatur.

Apocemata, i. e. humorum decubitus, vocantur, cum, qui prius unum membrum infestant humores, eo relicto, ad alterum transeunt. 2. ad Glau. 7.

Apocseparnismus, abscissio est ossis, cum ejus pars per vulnerantia decussa fuerit, fracturæ species. lib. finit. med.

Aposici, more antiquorum Græcorum, ii appellantur, qui appetentiâ carent. com. 3. in 3. de morb. vulg. 72.

Aposicia. Vide Anorexia.

Apospasmata, avulsa omnia nominantur, lib. de constit.

stit. art. cap. 6. Quæ verò continui solutiones, apospasmata, i. e. avulsionem vocantur, instrumentariorum tantummodò partium propria sunt passionem. 1. de diff. morb. cap. 11. Vide Rhegma.

Aposphagma. Vide Unionis solutio.

Apostasis, generaliter loquendo, Galeno qualibet est continuitatis dissolutio: ita enim (ait Gal.) ego totum hoc genus soleo appellare; at Hippoc. abscedentia corpora, quæ ita affecta sunt, vocat, & affectionem ipsam, abscessionem nominat: tametsi una quædam species generis hujus sit, quam propriè abscessionem, & abscessum, i. e. apostasin & apostema nuncupant. 3. de his, quæ in med. fiunt. initio. Apostasis, & Metastasis differunt, quod Apostasis, i. e. abscessus, judicationem infert, agrumq; à molestiis omnibus liberat; Metastasis autem, i. e. commutatio, aliarum habet principium accessionum, ut & aliud exigit tempus ad coctionem mali, aliumq; corporis locum, ad quem instantium humorum facta est translatio. 4. de rat. vict. 68.

Apostema. Vide Apostasis.

Aposymata. Vide Abrafala.

Apothetrapia, nunc pro postrema parte omnis probe peractæ exercitationis sumitur, nunc pro ea Medicina parte, quæ lassitudinem, ex immodico exercitio obortam, submover. 3. de sanit. tuend. cap. 2.

Apothermus, Sapa, Sirceon, Hepsfema, nomina synonyma, significant mustum plurimum coctum. lib. 1. de alim. fac. cap. 13. de attenuante vict. rat. 12.

Appetitus caninus, vehemens est comedendi desiderium, quo & plurima edunt, & maxime gravati, assumpta inalterata paulo post revomunt. 7. de compos. med. loc. c. 2. & 1. de sympt. caus. c. 7.

Appo-

Appositio, quæ & **Adjunctio**, & **Prosthesis** dicitur, naturalis est actio, per quam, vi tractrice, attractum nutrimentum singulis partibus apponitur assimilandum. l. 3. de natur. fac. c. 11.

Apſychia, i.e. animi deliquium. comm. 2. in 1. prorrh. 20. & 1. aph. 23.

Apryſtus, i.e. morbus sine ſputo, præſertim morbus l. teralis, cum pars dolens exquisitè angusta, in se ipsa, universum fluxum cohibuerit, nec per ſputum sese exonerarit. 2. de crif. c. 10.

Aqua inter cutem, **Hydrops** species est prima. lib. 5. de loc. aff. 7. & 4. aph. 11.

Aqualiculus, qui & **Pubes**, & **Epifion** dicitur, est ea trunci pars, in quem thorax finitur, ubi & masculorum pudenda constituta sunt, quin & foeminarum, ad femoris utriusq; exortum, ut sub hoc occultentur. lib. Introd. c. 10.

Aqueus humor, qui & **Albugineus** dicitur. Vide **Crystallinus**.

Aquosa urina, quæ & **cruda** dicitur, est ea, quæ est alba, & tenuis. l. de crif. c. 5.

Aquosus hydrops, **Hydrops** species ea est, quam **Asciten** vocant, cujus proxima causa, aquosus humor est, partim à jecinore manans, partim à tota carne corporis, veluti in aquam resoluta: à quo aquoso humore totum abdomen distenditur, colligiturq; inter peritonæum & intestina, veluti in utre quodam, unde illi nomen dedit; opposita alteri **Hydrops** species, quam **Hipp.** vocat **siccum Hydropem**, qui & **Tympanias** dicitur. Vide **Ascites**, **Hydrops**.

Arachnoides pulsus, araneæ speciem referens, sive aranealis, parvus est, ac brevis aura agitatu movetur. lib. finit. med.

Aræo-

Aræotica, i.e. rarefacientia. 5. de simplic. cap. 14. Vide **Anastomatica**, & **Rarefacientia**.

Aranea tela, est oculi tunica, quæ cum Rhetina, per se tam spheram efficit, circumdantem crystallinum humorem; diciturq; aranea, quia ad modum telæ araneæ subtilis est, ne impediat lumen ingrediens ad crystallinum & albugineum humorem. lib. de Anatom. viv. Vide **Rhagois**.

Arcuatus morbus. Vide **Arquatus**.

Ardens febris. Vide **Synocha**.

Aræa. Vide **Alopecia**.

Argemon, sive **Argemus**, est oculi hulusculi, quod in iridis circulo nascitur, partem aliquam candidi, partem etiam nigri comprehendens: quo vitio qui laborant, et ægyptiæ vocat Gal. lib. finit. med.

Argyrite, terra est, quæ pluribus parvis terræ particulis, plures parvas argenti mistas habet particulas. 9. simpl.

Ariditas, est summorum pilorum lanuginosa superficies, pulvere conspersis adsimilis. lib. finit. med.

Aritænoide, est cartilago laryngis, tum ordine, tum positione, tum magnitudine tertia, in suprema innominata cartilaginis parte sita, gutturniis, infundibuliq; quas **Aritenas** appellant, non ab similibus. lib. vocal. instr. diss. cap. 4. Unde aliqui eam **Aritanam** vocant, & guttalem. 7. de usu part. c. 11. Vide **Cricoides**.

Armatúra conceptus, ab Arabibus **Abgas**, tunica est postrema tenuis, toti fœtui undiq; circumjecta, ipsius velut sudorem excipiens; quasi agninum, à mollitie deducto nomine; **Amnion** Græcis appellata. 15. de usu part.

Arquatus morbus, qui & **Regius**, & **Icteros**, & **Auriginosus**, & **Arcuatus** dicitur, est bilis in summam totius corporis habitus cutim effusio, cum febre acuta, cum

intem-

interiorum adustione, & stomachi vitio. lib. Introd. & 5. de loc. aff. 7. ubi paulo clarius loquens ait flava bilis, quando sibi servans naturam, una cum sanguine per totum corpus deferitur, morbum facit, qui Icterus, i. e. Regius appellatur: sincera verò, & ab aliis succis quando secreta in aliquo membro consistit, herpetem concitat. 2. ad Glau. 1.

Arteria, est commune vas, ortum habens à corde, concavum, ut per ejus concavitatem spiritus vitalis ad omnes corporis partes deferatur. lib. de anat. viv. Differt autem à vena, quod vena sit vas sanguinem continens, nec pulsans; sed arteria vas est pulsans. lib. de caus. morb. cap. 3. Quondam nec-dum eas, quæ similiter ut cor pulsant, arterias, (in solam eam, quæ ex pulmone in laryngem emergit arteriam, arteria nomen inferentes) sed venas appellabāt, in totum velut alias, quæ non pulsant, sic etiam pulsantes, postea verò consuetudine obtinente, arteria appellationem vasibus pulsantibus solis propter equivocationem tribuere, aspera nomen addentes; illi, quæ ex larynge in pulmonem descendit, arteria, asperam arteriam appellarunt, quam ipsam etiam Bronchum vocant, quoniam cartilaginosa corpuscula, quæ plurima ejus pars sunt, Bronchia appellat. 7. de compos. med. loc. cap. 1. Aspera autem arteria dicitur, quæ in pulmones divisa sunt; quæ verò toto insunt corpore, quæq; ex asperis arteriis contracto corde spiritum transsumunt, laeves. 7. de anat. adm. 4. & 7. de usu part. c. 9. Vide Alpera arteria.

Arteria crassa. Vide Arteria aorta.

Arteria magna. Vide Arteria aorta.

Arteria aorta, magna, maxima, crassa, synonyma sunt, significantia unum omnium arteriarum tanquam caudicem, à sinistro cordis ventriculo propagatum, quæ omnes

omnes tum sibi invicem, tum eorum pulsandi modo respondent. 7. de anat. adm. c. 1.

Arteria venosa, est vas, à sinistro cordis ventriculo ad pulmonem procedens, quod arteria vocatur, quia pulsat: venosa autem, quia vena tunica vestitur: quæ verò ex dextro cordis ventriculo oborta est, vena arteriosa dicitur; vena quidem, ab usu; arteriosa autem, quoniam arteria corpus est duplici rectum tunica. 7. de anat. adm. c. 4.

Arteriæ emulgentes, sunt duæ propagines magnæ, à maxima arteria, quæ spina incumbit profectæ, non aliter, quam duæ venæ magnæ, quæ in renes inferuntur, & quibus renes, urinam à sanguine secernunt & trahunt, venæ emulgentes appellantur. lib. de dissect. ven. 5. 14. & 16. de usu part.

Arteria aspera. Vide Arteria.

Arteriæ carotides, quæ & soporariæ, & apoplecticæ, & subjectæ dicuntur, sunt, quæ infernè, à corde, ad jugulum, recta tendunt, atq; ad partes collo superiores distribuuntur. de dissect. art. & 16. de usu part.

Arteriæ laeves. Vide Arteria.

Arteriam conjugem vocant, non eam arteriam, quæ vena est per membranas conjuncta, sed eam, quæ alteri ad eundem usum comparata vena, aut arteria, adjuncta est. 16. de usu part. cap. 13. Nusquam enim vena ab arteria relinquitur, sed ubi vas arteriosum videris, ibi necesse est venam etiam esse. 16. de usu part. cap. 14. & 16.

Arteriæ, & Venæ umbilicales sunt, quæ acetabulis uteri adhaerescunt, quibus fœtus in utero alligatur, & alimentum trahit. 14. & 15. de usu part.

Arteriaca præsidia, i. e. arteria pharmaca, quidam Electa nominant pharmaca; alii penitus nullum disci-

men ipsis adscripserunt; aliqui verò rard addiderunt; alii ad vocem interceptam; alii adhuc generalius ad vocem lasam; sunt qui & ad exasperatam arteriam, & ad exulceratam eandem, huiusmodi accommodata esse scribant. 7. de comp. med. loc. cap. 1.

Arteria trachea. Vide Aspera arteria.

Arteria coronalis. Vide Stephanicea.

Arteriosa vena. Vide Arteria venosa.

Arthritis, sive morbus articularis, & artuum vitium, 11. meth. 20. Sunt & ex genere Arthritidis, Ischias, & Podagra. Quod enim in omnibus articulis, Arthritis est, hoc in uno, juxta coxendicum quidem, Ischiada, h. e. coxendicum morbum appellant, juxta pedem autem, Podagram. 10. de comp. med. loc. cap. 2. Unde Arthriticos vocant, qui hoc articulari vitio laborant. 11. meth. 20.

Arthrodia, per oppositam sibi articulationis speciem, Enarthrosin, clarius intelligitur; utraq; enim est species Diarthroseos, i. e. de articulationis: sed Enarthrosis est, cum excipiens cavum, admodum altum est, caputq;, quod in id inferitur, oblongum; Arthrodia verò, quæ cavum leve, superficarium, capitulumq;, depressum habet. lib. de ossib. in proem.

Articulus, est naturalis ossium compositio, vel per diarthrosin, i. e. de articulatione, quæ est ossium structura, quorum motus est evidens; vel per synarthrosin, quæ est ossium manifestum motum non habentium compositio. lib. de ossib. in proem. Sed rectius: Articulus est, cum duo ossa ita invicem cœunt, ut alterum quidem ipsorum sit, quod movetur, alterum, velut sedes quadam, ei, quod movetur, & firmamentum, ut in ostiorum cardinibus apparet; unde manenti, cavitas, (quæ glene, i. e. pupilla, & Coryle) ei, quod

quod movetur, convexitas (quæ Condylus dicitur) inest. 1. de motu muscul. cap. 9.

Articularis morbus. Vide Arthritis.

Artomel, i. e. jusculum ex pane & melle. 10. meth. 6.

Artus, extrema & compositissima corporis partes sunt, crura scilicet, pedes, & manus.

Arythmus, pulsus est, non is, qui absolutam abolitionem significat, omnig; rythmo orbatu est, sed is, qui nativo rythmo caret: cui opponitur pulsus, qui Eurythmus dicitur. 1. de differ. puls. cap. 9.

Asaphya, est vocis obscuritas, vel propter vocem efformantium organorum offensam, (quam ex nervorum vitio contraxerunt) vel propter mentis lesionem. comm. 2. in 1. prorrhet. 3.

Ascarides, & Elminthes, sunt tenues lumbrici, in parte præcipue inferiore, crassi intestini progeniti, rotundi verò sive teretes lumbrici, sunt vermes, qui in superioribus magis intestinis generantur, adeo ut ad ipsum quoq; ventriculum quandoq; ascendunt; latus est, qui & longissimus est, & per tota sæpe extenditur intestina. 3. aph. 26.

Ascensus morbi, augmentum, incrementum, synonyma sunt, significantia totius morbi, sive paroxysmi secundum tempus. 1. de cris. 3. ait. Ubicunq; accenditur atq; augetur caliditas præter naturam, istuc ab aliis partibus sanguinem solere confluere, quo verò tempore confluit, illas quidem partes mandantes, refrigerari, privatas sanguine, est necessarium; quod verò patitur membrum gravari, ac distendi, & sanguinem ipsum confluentem alterari, tum quia aliis, quæ jam putruerunt, superfluitatibus permiscetur, tum quia intrusum diffilari non potest; atq; hoc tempus accessionis principium nuncupatur. Cum verò jam ca-

linitas materiam convicerit, tunc hoc tempus & ascensus, & augmentum vocatur: in hoc verò usque-adeo calor augetur, ut non modò locum exurat, qui est quodammodò putredinis focus, sed etiam continuatim per totam corpus dispergatur, ac cùm jam ad summum fervoris devenerint humores accensi, id accessionis tempus Consistentia appellatur; tunc verò universum laborantis corpus, igneum videtur, extensà per totum corpus aqualiter caliditate. l. 2. de differ. febr. 11. 12.

Afcia, est revolutio fasciæ, quæ cùm parùm à recto declinet, in obliquum tamè non dum vergit insigniter; à fibrorum afcia, quæ paululùm à recto abiens, in summitate decurvat, sic dicta. 3. de fract. 21.

Afcites, Hydropis species est, in qua in membrana abdominis interiore, peritoneo Græcè dicta, aut potius inter peritoneum & omentum, humor aquosus, veluti in urre quodam, continetur; undè eam vocat Hipp. aquosum Hydropem. Contrà Tympanias, (quam siccum Hydropem vocat) est, in qua abdomen percussum, talem sonum edit, qualè percussa tympana, quoniam in his per cutem extensam, subjectus aër percutitur, quemadmodum aër in hoc morbi genere, qui in profundo abdominis conclusus coërcetur. 4. aph. 11. Afcitem etiam urricularum Hydropem vocant, lib. finit. med.

Afellos. Vide Axes.

Afema crisis est, quæcumq; à nullo dierum indicantiũ antea fuerit indicata, undè sine signo dicitur, 3. de cris. 10.

Afcia, i. e. ciborum abstinentia, aliquando etiam vasorum inanitio, nomine generis, afstia dicitur. 2. de rat. viñ. 47.

Aspera arteria, est arteriarum in animalis corpore alia-

aliarum omnium durissima, solo osse mollior, quam Græci χόνδρον, i. e. cartilaginem vocat, quam ipsam rat. 7. Natura in exactam circuli circumferentiam cõcorfit, circularum, multà serie, continuà longitudine compositorum, à pharynge ad pulmonem usq; pertingens, sanguine vacua. 7. de usu part. cap. 3. Eademq; prout corpus est ex cartilaginibus (ut instrumentis vocis) & ex vinculis membranosis (ut instrumentis respirationis) compositum, trachea arteria dicitur, ibid. cap. 6. quam Bronchon nominant. ibid. cap. 11. Asperæ arteriæ etiam dicuntur, cùm eversa sanguinolentiores apparèt, & magis aspera carnosaq; & sicut acinis similes, lib. Introd. cap. 15.

Asphyxia, i. e. pulsus privatio, cùm non percipitur nostro tactu motus, atq; hoc per totum animal accidat, ut nulla usquam arteria moveri videatur, quod tamen, si ad veritatem exigas, in corpus vivum nunquam cadit, i. de prasag. ex puls. cap. 3. quam Hipp. vocat spirituum interceptionem, 4. de rat. viñ. 26.

Aspreo oculi, est durities & asperitas inæqualis, quæ intra genas oritur, lib. finit. med.

Asia, i. e. stomachi fastidium & nausea. 4. de san. tuend. cap. 4.

Afsidentia signa, quæ & mox apparentia, Græcis συμπτώματα dicuntur, distinguuntur à pathognomonicis, seu passionem infallibiliter & firmissimè significativis signis: exemplo morbi lateralis, in quo acuta febris, spirandi difficultas, tussis, pungens dolor lateris, passionis significativa sunt: quod autem dolor ad hypochondrium, aut ad clavim perveniat, aut quod facilius in latus patiens, quam in alterum, eger decumbat, afsidentia signa sunt. 1. aph. 12.

Afsimilatio, & afsimilatrix facultas, est, quæ ab

actione ipsa, generaliter alteratrix, in specie verò assimilatix dicitur, quā id, quod nutrit, alteratur, & ei, quod nutritur, simile fit. 3. de nat. fac. cap. 1. Naturalium actionum prima, ac propemodum maximè necessaria, nutritio est, quæ alteratricis actionis quadam est species; est enim & concoctio, quæ in ventre peragitur, alteratio, non secus autem & quæ in venis: quibus accedit ea, quæ in quaq; est particula. Hisce aliqui addunt quartam, quam assimilationem vocant, nomine quidem a nutritione disidens, re autem non disidens. 3. de caus. sympt. c. 2.

Afsistentes, sive Astites glandulosi. Vide Glandulosi.

Asthma, i.e. anhelatio, affectus est, in quo propter angustiam, organorū spiritus & bronchiorum oppilationem summe usq; ad opera scoptula & scapulas thorax, citra febrem, motu celeri denso movetur; uti etiam in iis, qui velociter cucurrerunt, quiq; respirando, pinnas narium movent, quas in spirando contrahunt, exspirando dilatant. com. 2. in 3. de morb. vulg. 4. Vide Anhelosi.

Astites. Vide Glandulosi afsistentes, & Parastatæ.

Astragalus, i.e. talus, (os ballista vulgò) 3. de usu part. cap. 6. est principalissimum osium, quæ ad pedes movendos pertinent, in circumferentias quasdam desinens, magnum quidem & maximis superius osibus dearticulatum, in medio tibia & calcanei locatum. ibid. cap. 8. Est & Astragalus furicellus exiguus. 6. de simpl. med. fac.

Astrictio, est densitas cutis, & necessariorum excrementorum suppressio. ad Thrasib. cap. 27.

Ataxia, & Acolmia, est ordo decretorius, dierum febrium, perturbatus, & interruptus. 3. progn. 7.

Ater

Ater succus, est melancholia, quartus naturalis humor, frigidus & siccus, sanguinis limus velut & fax, quem humore, cum ex ustione ac putrescentiâ acidam & radentem qualitatem contraxit, atram bilem nuncupant, sive radentem. 2. de nat. fac. c. 9. Vide Acida bilis, & Melancholicus humor.

Athera. Vide Atheromata.

Atheromata, Steatomata, & Melicerides, alii quidem inter abscessus reponunt, alii verò ad aliud genus referunt; omnes tamen tumores præter naturam sunt, quorum natura ex ipsis nominibus patet; pulcra enim quid simile in ipsis atheromatibus invenitur, melli verò in ipsis meliceridibus, sevo autem in ipsis steatomatibus. lib. de tum. c. 5. Ipsum verò atheroma Græci ἀθήρω vocant. 14. meth. c. 14.

Athymia, i.e. animi dejectio. 6. de loc. aff. c. 1.

Atra bilis. Vide Acida bilis, & Ater succus.

Athroos, est secretio & alteratio p. n. subito facta, violenta, dolorosa, in ipso dividendum genere, videturq; in omnibus sensibus, ex secretionem, ac divisionem, continui unitiq; corporis, cum sensoria, vel universa, vel magnis portionibus, & celeriter (quod Græci ἀθροῶς vocant) dividuntur, aut aliàs affatim corruptivè alterantur, dolor excitari. 1. de sympt. caus. c. 6.

Atrophia est, cum partes corporis vel diminutè alimentum attrahunt, vel non trahunt, vel perperam trahunt, unde corpus non nutritur, sive id quidem, quod nutrit, & quantum & quale esse oportet, suppeditetur, sive non. Caterùm, symptoma aliquod in retentrice facultate incidit simile his, quæ in ventre sunt dicta, quod nutritionem tollit. Atrophia quoq; excreticis vitio accidit, cum plus, quam opus est, vacuatur. de sympt. differ. c. 4. & 1. meth. 9.

C 4

Est adhuc Atrophia quædam in oculo, cum ex longa imbecillitate, vel aliâ quâdam latente causâ, paululum quasi propulsus, deinde cavatus ad radicem, cum dolore minor evadit, obscuréq³, aut nihil omnino, videt. lib. Introd. c. 15.

Atrophusæ, i.e. corporis particula, quæ ex nutrimento fructum non sentiunt. 2. meth. c. 7.

Attonitus morbus, i.e. Apoplexia, 2. aph. 19. quem & morbum stupidum vocant, 8. de placit. c. 6.

Attratrix virtus est, quæ peculiares & familiares parti succos, alendi ipsam gratiâ, & appetere, & attrahere potest; altera, quæ generatim alteratrix dicitur, quâ succus attractus similis evadit parti, quæ alitur, quæ ipsa membratim in hepate, sanguificativa dicitur: Retentrix, quâ pars attractum succû retinet, donec in suam ipsius naturam eum mutaverit: Expultrix, quæ à concoctis, quod inutile est, secernit, idq³ excrementum vocatur, 5. de loc. aff. cap. 7.

Attrahens, sive Attrahentia, sive Epispastica facultas est, quæ ex alto vehementius attrahit, propter essentiam calidam, & renuium partium, sive talis essentia sponte nata sit, sive ex putrefactione acescente generationem sortita, directè opposita est reperiienti & adstringenti virtuti, quæ, in altum, occurrentes sibi succos repellit. 5. de simpl. cap. 17.

Auditorius meatus, est rotundum foramen, quod ad aures pertinens, non solum usq³ ad cerebri membranam pertinet, sed etiam nervum auditorium contingit, qui in ipsum à cerebro descendit, 6. meth. 6. quod & cæcum foramen dicitur, lib. de nervor. dissect. cap. 6. Græcè τρυπη τῆς αὐρῆς. Vide Aures.

Auditus gravitas. Vide Obaudirus.

Augmen-

Augmentum morbi. Vide Ascensus.

Aures, quæ frons ad tempora porrigitur, in ipsius terminis sitæ sunt; quarum pars aperta Ala dicitur, resista ab interiori, in posterius, ipsis summitatibus inflexis, Cubiformis, sub qua semicirculus rotundus, in mucronem exsurgens, Græcè ὠτίς appellatur, huius acumini concavum quod subjacet, Conchula, in cuius medio quod conspicitur rotundû foramen, meatus auditorius nuncupatur. lib. Introd. cap. 10.

Aures cordis, sunt duo sinus cordis, concavi, nigriores, nervosiores & magis cuticulares, membranosioresq³, corde, in utraq³ huius parte, sinistra & dexterâ collocata, ad similitudinem aurium. 7. de anatom. adm. c. 9. Nominata autem porro ita sunt, non ab utilitate, aut actione aliquâ, sed à parva similitudine, quod utring³ cordi ipsi, ut Animalis capiti, aures adiaceant. 6. de usu part. c. 15.

Aurigo, & Auriginosus. Vide Arquatus.

Autopsia, est eorum observatio & memoria, quæ proprio intuitu unusquisq³ inspexit. de part. art. med. cap. 2.

Autopyrus, qui & Syncomistus dicitur, panis genus est, quod ex farinâ universâ comportata, confusâ veluti & permistâ, non discussis furfuribus, constat. lib. de ren. aff. dignor. cap. 6. Syncomistum panem vocant, qui mediû est inter exquisitè purum, & furfuraceum. Vocât autem nonnulli eundem panem Autopyrum, quoniam ad puri panis confectionem, farinam, non qualis naturâ est, talem ad conficiendum panem assumunt, sed prius purgantes, furfur excernunt; contra autè in furfuraceo prius adimunt eam farinæ partem, quæ purissima est: panis autem, qui Autopyrus appellatur, qualem habet ex natura farinam, triticum, talem etiam servat. 2. ad Glauco. 7.

C 5

Avulsa. Vide Avulsio, & Apospasmata.

Avulsio est, cum ossa, quæ membrum colligant, divulsa dicuntur. com. 3. in lib. Hippoc. de his, quæ in medic. fiunt. 31. Vide Unionis solutio.

Axes ipsas, Asinos appellare consuevit Hippocrates; & parvos axes, Asellos, quas etiam Succulas vocat. 2. fract. 48.

Axillaris vena est, quæ per axillam percurrent, maior humerali, per totum brachium in ramos scinditur duos, superiorem, inferiorem, externum, internum, ille vena hepatica, 3. de anat. adm. cap. 5. hic subalaris, basilica, & vena cubiti interna appellatur, lib. de anat. viv. & contra Erasistr. cap. 6.

Axiomata, propositiones indemonstrabiles vocant. 1. meth. 4.

Axungiam, omnes soliti sunt vocare adipem suillum veterem. 1. de comp. med. per gen. cap. 4. Vide Adeps.

Azygos vena, est propago, ex vena cava superiori trunco exoriente, parte dextra, & octo costis inferioribus inserta, quam sub corde oriri semper à se observatum fuisse testatur Gal. 1. 5. de loc. aff. 2. & initio secundi de vict. rat. & 3. de usu part. in iis videlicet corporibus, in quibus thorax longior erat; nostro vero seculo, propter thoracis brevitatem, supra cor, & pericardium exoritur, ad quintam pleuræ, thoracis vertebra, & per ejusdem ramulorum orificia aperta, materia pleuritica inter pleuram, & pleuram effunditur.

Azymus panis, i.e. fermenti expers. 1. de alim. facult. cap. 2.

B

BALLISTÆ OS. Vide Astragalus.

Barycoia, sive Obaudicus, sive Obauditio, est audi-

auditus gravitas & difficultas, proportionem respondens Amblyopia, quæ est visus hebetudo, sive diminuta visio. 1. de caus. sympr. cap. 4.

Basilare os, quod & os palati, os Cunei, os Sphenoidis dicitur, est os, quod toti calvarie substernitur, quod à nonnullis inter capitis, ab aliis inter maxilla superioris ossa (cum inter utrumque sit medium) numeratur. cap. 1. lib. de ossib. & in fine lib. 11. de usu part.

Basilica vena. Vide Axillaris.

Basis cordis, quam alii caput visceris appellant, est vertex cordis, figurâ turbinata, 7. de anat. adm. c. 3. quam & mucronem appellant, 2. de placit. c. 4.

Bathmides, sunt brachii concavitates, in quas extendentibus totam manum, & flectentibus, cubiti ipsius coronæ ingrediuntur, 2. de usu part. cap. 15. Alibi inquit: Bathmides sunt bases quædam, & sinus, in brachii sive humeri ossæ, utrinque, singula, in quas, quum extenditur flectiturque, tota manus, ipsius ulnæ, coronæ sive processus ingrediuntur.

Bechica medicamenta sunt, quæ tussim sedant, & expectorant. 1. de simpl. c. 1.

Belenoides os. Vide Graphoides, & Lithoides.

Beneolentia dicuntur, quorum vapores, à corporibus defluentes, ambienti permisti, ac per nares inter inspirandum in cerebrum delati, familiares sunt cerebri naturæ, & animalibus spiritibus, proportionem quædam iis respondentem, quæ linguae sunt dulcia. 4. de simpl. 22.

Berenicium, est nitrum, vel spuma nitri. 6. de compos. med. loc. c. 1.

Bilis, simpliciter si proferatur, sive biliosus humor, avimus pallidam & amaram, non acidam & nigram; hanc enim semper cum adiectione nominamus, ibi e contra appel-

appellatione solâ bilis, humoris colorem innuentes. lib. de tumor. cap. 9. Bilis appellatio per se sola flavam & amarâ significat, sed cum adiectione, Bilis atra, humorem melancholicum. 7. aph. 32. & 1. de nat. hum. 27. & corn. 5. in 6. de morb. vulg. 14.

Bilis acida. Vide Acida bilis.

Bilis æruginosa. Vide Bilis pallida.

Bilis amara. Vide Bilis.

Bilis atra. Vide Bilis.

Bilis flava. Vide Bilis pallida.

Bilis Isarodes. Vide Bilis pallida.

Bilis nigra. Vide Nigra bilis.

Bilis pallida est, quæ ex bili sincera, & tenui aquosa, serosaq; humiditate (quæ ex urina etiâ, sudorq; provenit) constat. Flava verò, quæ & Vitellina dicitur, colore pallidior, tenui humiditate constans, sed crassiori quàm pallida, crudo vitello ovorum & colore & consistentiâ similis, in vasis genita. Porracea verò in ventriculo genita, porrorum colori similis: Aeruginosa, quæ ærugini assimilatur: Isarodes autem bilis, quæ ab Isatide, cæsium colorem referente, dicta est. Sic etiam & Rubram nonnulli bilem nominarunt, quæ consistentiâ adtenuem sanguinem proximè accedit, sed quoniam non concrevit, idcirco bilem eam nominant, lib. de atra bile, cap. 2.

Bilis porracea. Vide Bilis pallida.

Bilis radens. Vide Acida bilis.

Bilis rubra. Vide Bilis pallida.

Bilis vitellina. Vide Bilis pallida.

Bis feriens pulsus. Vide Dicrotus pulsus.

Blæsum corpus est, cuius pectus pronum, in partem anteriorem redditur; Rhæbum autem, cum posterioris

par-

partes, quæ ad spinam pertinent, gibba redduntur. lib. de caus. morb. cap. 7.

Blena, sive mucus, est humor per palatum & nares defluens, concoctus, adeoq; crassior, minuscq; acris, & mordax, propterea & crassior pituita ab Hippocr. vocatur, lib. de totius morb. temper. cap. 3. & 2. de semin. cap. 6. Vide Phlegma.

Boriborgmos, est sonus, vel murmur, in crasis intestini factum à flatibus, cum excrementis sunt vacua, humidum excrementum denunciâns. 3. de symptom. caus. cap. 2. Vide Physis.

Bothor. Vide Exanthemata.

Bothria. Vide Phathnia.

Bothrion, propriè scrobs, sive parva fovea, unde ductâ similitudine, dentis alveolus & sinus, in quem ille reconditur, sic vocatur. Quin & Bôgeior est ulcus cavum oculi, tunica cornea, parvum, angustum, puncturis rotundis simile, ulcusculo alius. lib. Introd. cap. 15.

Brachiale, quod Græci ραχτιον dicunt, Arabibus Rasietia, est prima pars palme manus, octo constans ossibus, in superficie leniter gibbis, sinuatis intrinsecus, lib. de ossib. c. 18. cuius inferior pars quatuor ossibus (quæ quasi postbrachiale, vel metacarpium dixeris) colligatur. ibid. cap. 16.

Brachichronius. Vide Polychronius.

Brachium, totius manus pars maxima, cuius termini infernè, sunt articulus, qui in curvatura cubiti est, quem Anchona, sive Cubitum, cui innitimur, vocamus; superne autem rursus, humeri articulus. lib. 2. de motu musc. cap. 2. Brachium insuper appellatur, quod inter duas juncturas humeri & cubiti intercedit, totius brachii pars; Superhumeralis verò, i. e. Epomis, superior humeri pars est, quæ ad

ad

ad collum vergit. Nam humerus, totum id, quod in dearticulatione hac apparet, vocatur; quod autē non apparet, & posteriori parte, est os scapulae, ab inferiori est id, quod, dum totum brachium attollitur, manifestum fit, & Ala nominatur. 1. de artic. 4.

Bradypepsia. Vide Concoctio.

Branchus, alias Raucedo, Destillatio, & Coryza, 5. de sanit. tuend. cap. 8. Qualis in ventge, diarrhoea, passio, ex mala concoctione, fit, tale παχύμα est in cerebro catarrhus & coryza. Catarrhus scilicet est, cum, quod supervacuum est, in os diffluit; Coryza, cum in nares; Branchos autem, sive raucitas catarrhis superveniens, fit faucibus humore imbutis. Quod si in Gargarionem fluxio procumbit, aut (quam ex similitudine Graeci γαργαλις, i.e. acinum vocant) in uvulam, hanc in tumorem attollit; at si in glandulas, quae sibi ex adverso, in oris termino utringque jacent, Antiadas; si autem in ea, quae iis proxima sunt, humorum fiat decubitus, oriuntur Paristhmia. 3. de sympt. caus. cap. 4.

Bregmata, Latinis sinciput, sunt duo sincipitis ossa, utringque quatuor rectis lineis circumscripta, una quidem per suturam in longum porrectam, sagittalem, utringque ossi communem, posterius autem lambdoidis suturae lateribus, antierius verò coronariae vocatae, utringque autem parte, squamosis commissuris determinantur. comment. 3. in 6. de morbis vulgar. 1. ubi inquit, Bregmata, vulgò parietalia ossa appellantur. Vide Pregmatitis ossa.

Brevis pulsus. Vide Pulsus latus.

Bronchia, sunt aspera arteriae carvilagines, lirerae & figuram referentes. 4. loc. aff. c. 3. Vide Arteria.

Bron-

Bronchocele, i.e. gutturis tumor. 2. de comp. med. loc. cap. 17.

Bronchon, i.e. trachea arteria. 7. de usu part. cap. 11. Vide Aspera arteria.

Bubo, est tumor, praeter naturam, in collo, secus aures, vel in inguinibus, emissariis veluti communibus, iis, quibus in collo, capite, vel aliquā vicinā parte, vel prope magnam arteriam aut cavam venam, ulcus est natū, aut quae alias naturae insensis plurimis scarent superfluitatibus, obortus. 13. meth. cap. 5. Vide Struma.

Bubonecele, est tumor mollis, in inguine factus, peritonaeo plus nimis dilatato, vulnerato, aut rupto, & postea non conglutinato, diciturque ramex in inguine: quod si umbilico hoc accidat, dicitur Exomphalos. lib. de tumor. cap. 16.

Bulimos, est vehemens esuritio, ex indigentia simul, imbecillitate, & refrigeratione oris ventriculi, orta. 1. de caus. sympt. cap. 7. Differt autem Bulimos à canina appetentia, quod ille sit casus potentiae naturalis appetitivae, tractricis & concoctricis, ex frigidityte exteriorē, qui à fame quidem inchoavit, sed non habet eam amplius adjunctam; Caninus autem appetitus fieri consuevit, vel propter solam intemperaturam frigidiorē, vel propter humores melancholicos, acidos, lancinantes, & venarum succioni similem sensum inferentes, quos exorbuat os ventriculi. 2. aph. 21.

Bulla, i.e. pustula oculis nata. 9. de simplic. med. fac.

Bursa testium, est communis tunicarum, utringque testem cooperientium, rugosus sinus, utringque testiculo circumdatus, Olcheon Graecis, Latinis Scortum, aliis Scrotum dicitur. lib. de dissect. vulva. & in Introd.

C CA-

CACHEXIA, pravus corporis habitus est. 1. meth. 9. Inde Cachecticus, i.e. mali habitus homo. lib. de cur. rat. per sang. c. 19. Vide Habitus.

Cacochoymia, vitiosorum succorum est redundantiâ. Vide Plethora.

Cacoëthe ulcera, ex dyspepulis clarius intelliguntur, quæ enim ex humorum confluxu, vel multorum, vel acrimoniuntur, ita, ut locus affectus talem dispositionem, quæ id, quod influit, bonum sit licet, tamen ipsum corrumpat, non habeat, Dyspepulis nomino: quæ verò dictam dispositionem jam obtinent, præcipuo vocabulo cacoëthes, i.e. maligna, appello. 1. de compos. med. per gen. cap. 18. Sed generalius: Quæ ulcera omnibus rite decenterq. factis non sanantur, ea Medici cacoëthe, i.e. maligna, contumacia, rebellisq. dicimus. 4. meth. 5. Adhuc generalius: Cacoëthes morbos, i.e. malignos appellamus, quicunque periculum minantes, spem salutis interim non adimunt; nam quod summè perniciosum existit symptoma, non cacoëthe, sed mortiferum dicitur. com. 1. in 1. prorrh. 14.

Cacophonia, i.e. vitiosa vox. lib. de symptom. differ. cap. 3.

Cacosphyxia, i.e. vitiosus pulsus. ibid. c. 4.

Cacotrophia, i.e. vitiosa nutritio. ibid.

Calchoidea ossa, sunt tria ossa parva circa calcaneum posita, quæ certis nominibus carent, inferiori naviformis ossi per synarthrosin copulata, cum quibus etiam exterior ex parte, Cyboides pariter connectitur. 3. de usu part. & de ossib. c. 24.

Calcaneus, seu os calcis, quod Græci Pterim vocant, maximum & principalissimum est pedis os, ad firmationem per-

pertinens, quod Astragalo subest. 3. de usu part. & lib. de ossib. cap. 2. 4. 6.

Calcis os, Vide Calcaneus.

Calculus, sive calculosus morbus est, ubi in renibus ex collecta crassorum humorum copia, à calore immoderato calculi generantur. lib. finit. med.

Calefcere, & Calefactum esse, non parùm refert dicere, exemplo lebetis, & aqua calida: Fervens enim aqua, in frigidum lebetem injecta, vel Fervens lebes aquam frigidam excipiens, illuc quidem aqua calefacta est, & lebes calefit, juxta Typum putridarum febrium, hic lebes calefactus, aqua calefit, ad morem febrium hecticarum. lib. 1. de differ. febr. c. 1.

Calidum, hoc ipsum verbum aliquando transferimus ad qualitatem, cuius proprium nomen est caliditas, aliquando denominativè totum corpus dicimus calidum, à caliditate; estq. hic modus loquendi plurimus in omni vita. 1. aph. 14. Communiter Hipp. à qualitatibus nominat elementa: Calidum E. G. appellat, neq. solam qualitatem, neq. quod ab ejus exuperantia dicitur, sed τὸ πᾶσιν θεῖον & θεγουρόν, corpus, quod summam participat qualitatem, ut Ignem. 1. de element. cap. 8.

Callicreon, sive Pancreon, caro glandulosa est, substrata arteriis, venisq. ventriculi, quæ eâ parte in ramos capillares finduntur. lib. de ven. & artic. dissect. cap. 1. Vide Pancreas.

Callosum corpus, i. e. calli naturam referens, regio quadam in cerebro est, in quâ naturalis concavitas esse videtur, quæ ex superjacentibus, & circumdatis corporibus, portionem alimenti non perfectè elaborari (peritoma, sive recrementum vocant) recipit, 9. de anatom. adm. cap. 3.

quod recrementum ab Aristotele excrementum dicitur, lib. de instrum. odor.

Callus, idem quod Clavus, Græcè πόλ & 6. simplic. Dicitur etiam Tophus, ex crudo humore, qui crassus est, ad similitudinem puris crassioris. 10. de compos. med. loc. c. 2. Vide Myrmecia, & Tylosis.

Calvaria, sive cranium, os capitis appellatur, lib. de osib. cap. 1. Vide Cranium.

Calvata, sive ferra, appellat Hippoc. quæ rotunditatem quandam levem in extremis partibus habent, cujusmodi sunt specillorum capitula, & quæ Nucleata appellantur, & spatularia. Oblonga verò his contraria nuncupatur, quorum extrema minime sunt rotunda, sed mucronata, ad suffusionem & cataractam punctione tollendam accommodata instrumenta quodammodo similia. lib. 1. de artic. cap. 43.

Calvities, est capillorum defluvium, propter humorum, ex quibus nutriri consueverunt, inopiam; si verò propter eorundem humorum vitium, corrumpantur, & cadant, non Calvities, sed Alopecia, Area, & Ophiasis dicitur. 1. de comp. med. loc. cap. 2. Vide Madarosis. Capitis sane cutis, pueris, mulieribus, & eunuchis humida est, sed calvis immodicè arida, cerebrum in juvenibus molle cum sit atq; humidum, calvariam tangere, omnemq; interiorem partem complere, in senibus verò siccescens subsidensq; à calvaria distare, sapius in animalium dissectionibus conspicimus, in quibus calvescentibus sincipitis ossa fistulosa alia, & molliora ac superincumbentia ob cerebri (cum ad ipsa usq; non pertingat, neq; ea attingere possit, subsidet enim, in suamq; ac ipsius basin depressum cadit) distantiam, exarescunt, & consequenter, osibus istis resiccat, & ipsi

ipsis obtenta cutis inarescit, atq; ipsi sensui valde sicca, in calvis apparet, ut rationali demonstratione non egeat. com. 3. in 6. de morb. vulg. 2.

Calx, est rotius pedis posterior pars. lib. Introd. cap. 10. Clarius in lib. de osib. c. 25. ait, Calx est os pedis maximum, osi scaphoidi subjectum, quod & rotundas ex talo partes recipit, & geminos, quos habet, processus in sinum ejus inserit, parte, quâ ingredimur, leviter rotundâ, & latiusculâ.

Camarion, sive Psallioides corpus, est pars cerebri, quæ supra communem cavitatem (quâ cerebrum cerebello suâ perforatione committitur) velut domus tectum quoddam in sphaera superficiem concavam circumactum, ad similitudinem testudinum, & fornicum, quibus architectores utuntur. 8. de usu part. cap. 11. Vide Fornices.

Camarosis, est osis peritrio, cum ex alterutra fractum parte, similem camera figuram acceperit. lib. finit. med. Unde recentiorum nonnulli vehementissimas fracturas, Camaromata, & Engosomata vocant: Engosomata quidem, quæ in medio sui membrana innituntur; Camaromata verò, quæ eandem ipsam partem exaltatam habent. Ceterum, quâ primùm ab integris fracturæ partibus, diduci agra capere, intrò magis recedat, ac membrana innituntur. 6. meth. 6.

Camisia fœtus. Vide Chorion.

Campylon. Vide Helosis.

Cancer, est tumor præter naturam, fusci & lividi coloris, in quo venula quædam exaltata primò occulta, (quando & Cancrum latentem vocant, lib. de atrab. cap. 4.) deinde manifesta, à crasso & nigriore sanguine, facci vini æsimiles, sunt oppleta, cancri effigiem exhibens. 14. meth. 9.

Canina cupiditas, est prava dispositio oris ventriculi

superioris, multa impetuosè ingredientis, nec potentis deſcendatorum pondus ſuſtinere, ſed eadem inalterata ſuperne, vel inferne excernentis, ſimilis renum diabetica paſſioni, ubi tanta ſeroſa humiditatis cupiditas adeſt cum virium imbecillitate, ut & humiditatem aſſatim attrahere, ad eam deinde in veſicam conſeſtim renes impellere coguntur. 6. loc. aff. 3. Vide Bulimos.

Canini dentes, quos Græci *κυνόδοντες* vocant, ſunt duo utrinque, utriusque mandibula, ſuperiori, & inferiori, inherentes dentes, qui canum dentibus quàm ſimilimi, inferiore baſi lati, parte ſuperiorem acuti, quibus ſingula quoque radices longiſſime inſunt, ut ſi quid propter duritiem ab inciſoribus dentibus ſcindi minùs potuit, id frangere poſſint. lib. de oſib. cap. 5. Vide Dentes.

Canities, eſt pilorum ante legitimam ætatem, in albam commutatio. lib. ſinit. med.

Canthus oculi. Vide Anguli oculi.

Capillaris vena. Vide Apanthiſmus.

Capillitium. Vide Trichiaſis.

Capitratio. Vide Phymofiſ.

Capitis vena, & Cephalica, & humeraria, & externa dicitur, eſt, quæ ex jugularibus externis jam divaricatis, quibus cum radicem habet communem, utrinque, extra thoracem aſcendit, & per humerum in externam brachii regionem declivis excurrit. initio ſecundi de rat. vict. Vide Axillaris vena.

Capreolaris ſive hederarius anfractus, eſt arteriarum & venarum ad utrumque teſticulum deſcendentium, non recto itinere, ſed inſtar capreoli, aut hederæ, variis modis involutarum, connexus. 1. de ſemin. cap. 12. Vide Glanduloſi aſs iſtentres.

Capri-

Caprizans pulſus eſt, ubi motum arteria interpellat velut & interrumpit, ita ut motus à quiete alter, celerior primo, & vehementior ſit. 1. de diff. pulſ. c. 29.

Capſula cordis, i. e. Pericardium. Vide Membrana Pericardios.

Caput, eſt ſuprema corporis pars, quam nonnulli ventrem ſuperiorem nominant, collo terminatur, & partes animales continet.

Caput cordis, eſt ampla, & orbicularis, ejus pars ſuperior, & baſis. 6. de uſu part. cap. 7.

Caput oſſis, eſt extrema oſſium pars, craſſior, & orbiculata. lib. de oſib. in præm.

Caput-purgia, ſunt medicamenta omnia, quæ capitis purgandi gratia induntur naribus, & dicuntur Erhina, ſive intra os ſumpta, partim colluendo, partim mandendo per ſputum caput purgent, & vocantur apophlegmatizonta. 5. de ſimpl. cap. 20.

Carbo (qui & Carbunculus) dicitur, cum melancholicus humor, in cutem decumbens ſimul cum febre, exanthemata per cutem craſſeſcentem ſicceſcentemque concitat, aſſatim ſanguinem indicantia. lib. de atrab. cap. 4. Carbunculus ulcus eſt, cruſtam citò, cum inflammatione totius partis vicina validam, ut & febres vehementes, & extrema pericula, inferens, 5. de compoſ. med. per gen. cap. 15. cujus cruſta nigra eſt, & cinerulenta, aliter quam quæ ſanguine ſuffuſa ſunt, aut quæ algore frigent, non enim vehementer lividus, ut in illis, tumor eſt, ſed habet aliquid ſplendens, ut bitumen & pix: talis autem eſt, exactè atra bilis. lib. de tum. cap. 6.

Carbunculus. Vide Carbo.

Carcharaconta, dicuntur animalia, quæ ſerratis

sunt dentibus, ut Ursus, Leo. 9. de anatom. admin. cap. 1.

Carcinoma, in utero est tumor sine ulceratione, in-
aqualis, & verrucosus, lib. finit. med. quem etiam à cancro
animali Carcinon vocant. ibid.

Carcinos. Vide Carcinoma.

Cardia, i.e. cor, quod non solum visceri, vitæ principa-
lissimo, quod sui natura palpitat, nomen fuit apud anti-
quos, sed etiam ori ventriculi superiori. 4. aph. 65.

Cardiaca dispositio, est innati roboris labefactatio,
& languor; fit plerumq; conflitante ore ventriculi & sto-
macho, cum sudorum immodica vi. Sunt qui Cardiam,
cordis phlegmonem statuunt, atq; ab hac exortam virium
exolutionem Cardiacam, vel dispositionem, vel syncopen
nominant. 1. de caus. sympr. cap. 7. & lib. finit. med.

Cardiacus morbus. Vide Cardialgia.

Cardialgia, i.e. cordis, seu oris ventriculi dolor, & mor-
sus, qui & Cardiogmos dicitur, à forti ventriculi aestu,
flavâ bile in ipsius tunicis ebulliente, quin & à pituitâ im-
pensissime frigida, & flatuoso spiritu frigido, genitus. 4. aph.
65. Dicitur etiam Cardiacus morbus. lib. Introd. cap. 13.
& 8. de comp. med. loc. cap. 1.

Cardiogmos. Vide Cardialgia.

Carnosa cutis. Vide Musculus cuticulofus, aut
Panniculus carnosus.

Caro, propriè vocatur tantum ea, quæ in musculo est,
reliquarum partium nullam, homines carnem vocant, præ-
terquam admodum pauci, sed quæ in visceribus, seu jecti-
nore, renibus, liene, pulmone, visuntur carnes, eas paren-
chymata (quasi effusiones dixeris) Græci vocant, quæ in
intestinis, ventriculo, stomacho, & utero sunt, sine nomine
relinquunt. 11. meth. 11. Parenchymata autem eas partes
vocant.

vocant, non carnes, propterea quod ex venis effusus sanguis
circum vasa omnia concresecat. 11. de simpl. in initio.

Caros, sive Sopor, est deperditio sensus, & motus, in
toto animalis corpore, illesâ manere spirandi facultate, ex
lesa anteriore cerebri parte, & temporum musculis; si verò
spirationem aded vehementer opprimat, ut quis vel magno
conatu vix spirare possit, eorum exemplo, qui per gravem
somnia stertere solent, Apoplexia tunc affectio nomina-
tur. 4. de loc. affect. cap. 2. & 13. meth. 21. & com. 2. in 1. pror-
rhet. 29.

Carotides, i.e. soporaria arteria, sunt duæ illæ, quæ ab
arteria magna, à sinistro cordis ventriculo emergentes, re-
cta ad caput feruntur, omnibus, quæ sunt supra cor, par-
tibus distributæ. 16. de usu part. cap. 12. & 1. de placit. cap. 7.
Soporaria autem nuncupantur, quia soporem, affectionem
dictarum arteriarum propriam esse autumat. 1. 5. de placit.
cap. 7. Vide Soporariæ.

Carpon, & Carpos. Vide Brachiale.

Carunculæ, nunc substantiæ intestinorum portiones
dicuntur, quæ in difficultate intestinorum excernuntur,
aded magnæ, ut possimus eas carnes nominare, 4. aph. 26.
nunc verò carnosam quandam particulam, in summo ore
pendentem, quam & columellam vocant, significant.
6. de comp. med. loc. cap. 3. Vide Gargareon, & Difficul-
tas Intestinorum.

Casus, aliàs signa, & symptomata mox apparen-
tia dicuntur. 1. aph. 12. Vide Judicatoria signa.

Cataclida, sive Subclavium dixeris, primam thora-
cis costam parvam significat. lib. de musc. dissect. cap. 12.

Catagma, i.e. ossis fractura. 2. meth. cap. 2.

Catagmatica emplastra, quæ & cephalica vocant,

sunt, quæ calvaria fracturis accommodantur, habentq; abstergendi, digerendi, & siccandi potestatem. 2. de comp. med. per gen. cap. 16. Dicuntur & Catagmatica ligamenta, quibus fasciarum instar, ossis rupturæ deligantur. 1. de comp. med. per gen. c. 4. Vide Cephalica emplastra.

Catalepsis, est deperditio sensus visus, apertis palpebris, servatâ tamen secundum naturam spiratione, in quâ posteriora cerebri potius, & nervorum exortus intemperie frigida sicca, unde etiam affectus hic Nervorum exortus dicitur, afficiuntur, 4. de loc. aff. cap. 2. licet alibi Catalepsin dicat esse spiritus cohibitionem, lib. de musc. diss. cap. 26. Et alibi dicit, Catalepsin fieri, refrigerato primo sensorio, i. e. cerebro ipso: quæ refrigeratio cum fortis fuerit, mista humiditati, facit lethargicas passiones; cum siccitate verd eas, quæ à Græcis νάρκησις, i. e. deprehensiones dicuntur. 2. aph. 3. Eundem affectum Catoche & Catobon vocant. 4. de caus. puls. cap. 16. Vide Catoche.

Catalorica medicamenta sunt, quæ cicatrices grossas æquant, & limpidant. lib. de Dynamid.

Caraphora, i. e. veterosa affectio, lib. 1. prorrh. quâ aegris, sopori gravi simile quid obvenit, fiuntq; tum omnis sensus, tum vocis expertes. 1. de dieb. decret. cap. 4.

Cataplasma, compositio est humida, pulvi similis, ex farinis floribus, & humidis unctuosiss. 3. de compos. med. per gen. cap. 2.

Catapotia, i. e. pilula. de remed. par. fac. cap. 6. Vide Pilulæ.

Caraptosis, morbus non est, sed symptoma Comititium, attonitam concidentiam repentinam significans. lib. de tor. morb. temp. cap. 4.

Cataracta, sive Suffusio, aliàs Hypochyma, est p-

tuita

tuita inter uveam, & crystallinū humorē coagulata, prohibens spiritus visibilis tum commeatum in oculum, tum effluvium ex oculo. lib. de ocul. par. 4. c. 12. Vel, Suffusio est, cum cernendi facultas deperditur, sive apparente, sive non apparente in oculis malo aliquo, & aut propriâ affectione molestatis, aut oris ventriculi, cerebriq; ex cognatione, & consensu, iisdem afflictis. 4. de loc. aff. cap. 3. & 5. de loc. aff. cap. 6.

Catafarca, Vide Anafarca.

Catasthefis, dispositio est, quæ faciliè discutitur: opponitur hecticae dispositioni illi, quæ tenaciter inhaeret, & habituada est fixa firma. 3. de loc. aff. cap. 2.

Catastasis, Vide Diathesis.

Catataxis, est corporum ad inferna loca tractio, quæ obitur partim organis tentorii, è regione oppositis, partim transsumptione in contrarium, nempe transmissis per rotulas principis, quæ tentionem moliantur, ac superius adnexis. Opposita huic est Anataxis, quæ est tectio ad loca superna per traductionem. lib. finit. med. Vide Anataxis.

Catarrhus, seu defluxus, est multorum humorum delatio ex cerebro, per palati foramina & nares, quæ in exitu unâ cum flatu egrediente, strepitum quandam faciunt. lib. finit. med. Vide Coryza.

Cathartica, seu purgans facultas, vel medicamenta, duo significant: 1. Omnia ea, quæ quovis modo animalis excrementa expurgant. 2. Id saltem, quod per excellentiam tantum, aut per vomitum, aut per ventris defectionem purgat; neq; ejusdem est generis cum iis, quæ per nares, aut vulvæ, adnota, expurgant, 5. de simplic. med. fac. cap. 20.

Cathemerina febris, i. e. quotidiana: ita enim con-

sueverunt vocare eam febrem, quæ singulis diebus accenditur, neque ullam habet intermissionem; ego verò (inquit Gal.) solitus sum eandem febrem Amphimerinam continuam appellare: nam vocabulū Cathemerinon nusquam apud Græcos usurpatū invenitur; omnem verò rem, quæ quotidie eodem modo fit, Amphimerinam vocant: vocetur itaque, quæ singulis diebus accenditur & finitur febris, Amphimerina, i.e. quotidiana simpliciter; quæ verò non nō intermittit, quotidiana continua. 2. de diff. febr. cap. 7.

Cathæretica medicamenta sunt, quæ excrecentem carnem in ulceribus absument, 5. de simpl. cap. 2. eisdemque cicatricem inducunt. ibid. cap. 15. Vide Septa.

Catherer, est fistula cannulæ urinaria, cujus extremum aliquo linimento, oleo aut cataplasmate illinimus, & ad removendam urinæ suppressionē, virgæ immittimus. ad Thrasib. cap. 23. Vide Syphones.

Catixin, seu secundum rectitudinem eruptio sanguinis est, cum sanguis à directo loci affectu effluit, & emititur. lib. de cur. rat. per sang. miss. 15.

Caroche, qui & Catochus, vigilans sopor est, 3. de loc. aff. cap. 5. estque solius cerebri affectus, veluti & per totum corpus convulsiones. com. 3. in 1. prorrh. 69. Est quoque Carochus fascia longior, quæ in orbem faciei & capiti circumdatur, ut operculum comprehendat. lib. de fasciis. Vide Cataleptis.

Catothetica medicamenta, quæ & καθάρτικα Græcè dicuntur, sunt medicamenta dejectoria, quibus renes, vesica, & gibba hepatis, à vitiosis succis expurgantur per urinam, ut Cava jecinoris & intestina, dejectione. 7. meth. 13.

Cava vena (sic appellata, quod venarū omnium, quæ

per

corpus animalis disseminatur, latissima sit & capacissima, 4. de rat. vict. 27.) est vena magna à gibba hepatis parte orta, lib. de ven. & arter. dissect. cap. 2. per quam hepar, ex ventriculo per mesaraas venas attractum alimentum, & in ipsa hepatis substantiâ elaboratum, in omnes superiores corporis partes distribuit, 4. de usu part. cap. 13. quæ à convexis jecoris partibus orta, tum cava, propter sui magnitudinem; tum jecoraria, à viscere, unde egreditur, nominatur. 8. de placit. cap. 1. Nec verò à jecinore solum hæc vena, quæ à gibbis hepatis egreditur, sed alia etiam, quæ à finis & concavâ ipsius parie, quam portas vocant, (unde & vena portæ appellatur) promanat. 4. de usu part. cap. 13.

Cauda. Vide Coccyx.

Cavernosa ossa, foraminulenta, Ithmoidea, & spongiosa, seu spongoidea, sunt ossa quedam parva supra nasi radicem, ante meningas, in meatu olfactorio posita; à cribri, vel spongiæ similitudine sic dicta. 8. de us. part. cap. 7. Vide Ossia Ithmoidea.

Cavernosum nervum appellant Penis colem, à quo Penem, & ipsum totum, nervosum dicunt. Coles enim in marium genitalibus, & uteri cervix, quoniam extendi, & in seipsam rursus retrahi, & subsidere videntur, nervosum proinde dicunt, com. 1. in 6. de morb. vulg. 2. diciturque flatusosus, & fistulosus, 6. de loc. aff. 6.

Cauledon, est species fracti ossis, quæ per transversum fit, in qua fracti ossis partes ita à se dissident, ut è directo non jaceant. 6. meth. 5. Vide Schidacedon.

Caulos, i.e. pudendum virile. 14. de usu part. cap. 12.

Causa morbi, est id, quo presente afficimur, & quo sublato statim cessat affectus. 1. de loc. aff. cap. 2. Aut, quod ei, qui fit, morbo, aliquam generationis partem tribuit.

Cau-

Causæ præcedentes. Vide Febres putridæ.

Causæ præincipientes. Vide Febres putridæ.

Causodes febres, i.e. incendentes, 1. aph. 12. quas etiâ

Causonas vocant, i.e. febres ardentes. 1. de cris. cap. 4. Vide Continua febris.

Causon. Vide Causodes, Continua, & Synocha. Causon legitimus dicitur, qui ex redundante flavâ bile fit, in vasibus majoribus circa cor putrescente, nothus verò, qui ex putrescente crassâ pituitâ. 4. de rat. vict. 13.

Cautica, h.e. urentia medicamenta sunt, quæ & vehementer calida sunt, & consistentia crassa, quæq; ignis instar, corpus colliquant, & sæpe escharas, h.e. crustas efficiunt, 5. de simpl. cap. 15. Inde & affectiones causticæ, & caustica excrementa, i.e. urentia appellantur, quarum virtus est, morbum & acutum, & periculosum, & velocis judicationis reddere. com. 2. in 1. prorrh. 60.

Cedmata (νέκρωτα) vocat Hippoc. fluxiones in crura decumbentes, & ex iis, eas maxime, quæ primum articulum, ubi coxendix est, occupant. comm. 5. in 6. de morb. vulg. 22. Significat quoq; affectus ex diuturnis illis, quæ sequuntur, defluxionibus tum plerisq; aliis in articulis, tum verò præcipuè circa coxendicem.

Celas, Hernias, Ramices, Circocelas, significant omnes testiculorum tumores, lib. de tumor. cap. 15. Barbaram sectantes medicinam, Rupturam vocant. Hæc variis fit modis, variisq; à parte affectâ, affectûsq; hujus causâ conjunctâ, appellationes accipit: si enim peritoneo rupto, intestina in scrotum descendunt, Enteroccele Græcis, Ramex intestinorum Latinis appellatur; ubi verò intestina supra in inguinibus hærent, Bubonoccele, h.e. Ramex inguinalis vocatur; si humor aliquis aquosus in

scroto

scroto colligitur, Hydrocele, i.e. Ramex aquosus nuncupatur; quum autem caro dura intra testium tunicas concreverit, Sarcoccele, h.e. Ramex carnosus dicitur. In summa, nomen semper à rebus opplentibus, & in tumorem sublatâ à parte, accipiunt. Proinde, si omentum in scrotum devolvatur, Epiplocele, h.e. Ramex omenti nominatur; sic ubi vena ultra modum repleta ac dilatata glomerantur, Cirlocele, i.e. varicosus Ramex vocatur. Vide Hernias.

Celer pulsus est is, cum celeriter & brevi tempore arteria distenditur. 1. de diff. puls. cap. 7.

Cenchria, alterum est herpetum genus, quod à similitudine, quam habet cum milio, (quod Græcis κνίχη & dicitur) Cenchriam vocant, humores mistæ facultatis, bilem scilicet, & pituitam, continens, quæ non protinus ulcus faciunt, quemadmodum bilis sincera, sed admodum exiguas pustulas ad speciem milii, quæ tamen & ipsæ decursu temporis in ulcus transeunt: dicitur & Herpes miliaris, 14. meth. 17. Vide Herpes.

Ceneangia, propriè & primum vasorum inanitionem significat, atq; ob id vorities, i.e. ciborum abstinentia perhibetur symptoma. 2. de rat. vict. 47.

Ceneon. Vide Ile.

Cephalæa, cerebri morborum symptoma, est capitis diuturnus dolor, difficulter solubilis, qui à parva occasione, vehementes habet accessiones, ita ut neq; voces, aut motum tolerare possit infirmus, sed tranquillitatem, obscurumq; cubiculum querat, ob doloris vehementiam; cum nonnulli veluti malleo se percuti, alii caput sibi contundi distendiq; sentiant, non paucis ad oculorum radices dolor extendatur, suis intermissionibus circumacti, non secus ac qui Cepha-

phalalgia laborat, sed in Cephalæa, affectæ partes redduntur multo debiliores, quàm in Cephalalgia. 3. de loc. affect. cap. 9.

Cephalalgia, οἶον ἀλγος τῆς κεφαλῆς, est dolor capitis promiscuè qualiscunq. lib. 2. de comp. med. loc. cap. 2. Vide Cephalæa.

Cephalica emplastra, capitis fracturarum, quæ usq. ad crassæ meningis duplicaturam pervenerunt, accommodata sunt pharma, quorum virtus est, ut ossium squamam sursum trahant, & in pristinum locum revocent, & fragmenta ex capite, ut & aliis ex corporis ossibus, educant. Nonnulli communi genere hæc etiam vocant Catagmatica, propriè verò nuncupata fortiora sunt, siquidem ex alto, non ossa modo, sed his multo quoq. magis, humorem aliquem crassum, & viscosum, vel omnino depravatū suā caliditate attrahunt. 2. de comp. med. per gen. cap. 18. Denig, medicamenta carnem producentia, Cephalica vocant, 3. meth. 2.

Cephalica vena, quæ & Humeralis, sive Humeraria dicitur, ramus est venæ cavæ ad jugulum ascendentis, ubi ad furculas divisa, altera pars humero superposita ad manum tendit; unde & Cephalica dicitur. lib. de anat. viv. Vide Humeraria.

Cerææ, mulieres sunt, quarum uterus propriis ex morbis, [illius sive in processibus supernis & lateribus. (Ceraæ Græci vocant) sive in collo aut fundo consistant,] quandoq. plura, quàm prius, quandoq. pauciora, vel nulla, vel mala emittit menstrua. 3. de sympt. caus. cap. 4.

Ceratoides, cornea, seu corniformis tunica oculi est, quæ à durâ meninge orsa (tunicam choroidem complectens) crassa admodum, parte ejus mediâ interim densissimâ,

simâ, & splendida ad splendorem recipiendum, & transmittendum, cornibus admodum extenuatis similis; unde eam à cornu similitudine Ceratoidem, Corneam, & Corniformem appellant, 10. de usu part. c. 3. Vide Rhagois tunica.

Ceratomalagmata, nomine à sola consistentia desumpto, vocant medicamenta, quæ corpori imponuntur, non omnino quidem humida, siccitatem verò tantam necdum consequuta, quantam emplastra possident. 7. de comp. med. loc. cap. 11. 13.

Cerchis. Vide Cubitus.

Cerchnòs, est exiguus quidam ad tussendum impetus, & conatus, non tussis, sed veluti nausææ vomitiones præcedūt, ita tussim hoc symptoma. Atq. ut nonnulli nautæarunt quidem, non tamen vomuerunt, ita nonnullis Cerchnòs incidit, nec tamen tussis propter causæ parvitatem est secuta. 2. de sympt. caus. cap. 4.

Cerebellum, posterior est cerebri pars, quæ à nonnullis Encranion, vel Parencephalis, vel posterius Cerebrum dicitur, 9. de anat. adm. cap. 2. estq. spinalis medullæ principium, & nervorum omnium, qui in toto animali sunt activi, fons & origo. lib. de ossib. cap. 11. Vide Parencephalis.

Cerebrum, quod Græci à situ Encephalon appellant, (nam nominatur ita, quod ἐν τῇ κεφαλῇ, h. e. in capite situm habet) animæ ratiocinatricis est domicilium, nervorum & sensus omnis, morûsq. voluntarii principium, substantiâ nervis similitum, nisi quod mollius; nam id illi conveniebat, ut quod sensus quidem omnes recipit, omnesq. imaginationes, atq. mentis notiones complectitur. 9. meth. & 8. de usu part. Substantia ipsius glandularis est alba, veluti

veluti è spumâ quâdam concreta, & humida. lib. finit. med.
Cerelæon, compositio est ex cerâ & oleo. 7. de compos.
med. per gen. cap. 2.

Cerion, i.e. favus, ulcus parvum in capite est cum tu-
more, ex cuius foraminibus crassior sanies, & mellis essen-
tiam referens, profluit. lib. de tumor. cap. 15. & 1. de compos.
med. loc. cap. 8. Vide Helminthes.

Certatoriâ, h.e. agonisticâ aquâ frigidâ uti illi dicun-
tur, quibus ea & assatim & frigidissima exhibetur. lib. de
marcore, cap. 8.

Cervix. Vide Spina. Dicitur & Cervix, tenuis osium
processus. lib. de osib. in proem.

Chalastica, i.e. relaxantia, seu remittentia vocantur,
quæ modicè calefaciunt, quorum usus est, ut conviventiâ
adstrictâ, corporis laxent flatuosum spiritum tenuent, &
phlegmones materiam digerant. 13. meth. 5. Induratorum
corporum medicamina, quæ ipsorum solvunt duritiem.
Malactica, h. e. emollientia dicuntur; quæ autem re-
fioni medentur, Chalastica appellantur. 7. de comp. med.
per gen. cap. 9. Vide Relaxantia.

Chalazia, à Græco ἡ χάλαια, i.e. grando, sunt tuber-
cula instar grandinis, pellucida, aut per cutim sparsa, aut
palpebras maxime infestantia. Græci Posthias vocant. 4. de
comp. med. loc. cap. 7. ubi dicit, Chalazia est morbus, ex vi-
tiis, quæ oculos infestant, cum toto genere præter naturam
aliquid peccat, 14. meth. 19. Sic etiam nominatur vitium
quoddam in suis ore, sub linguâ. Ath. l. 3. Deniq; in ovarum
quoq; luteo χάλαια dicuntur, à grandinis formâ & coloris.
Arist. 3. de hist. anim. c. 2.

Cartilago, quam Græci χόνδρον vocant, est parti-
cula simplex in animalis corpore, quæ aliarum quidem
omnium

omnium est durissima, toto autem osse est mollior. 7. de usu
part. cap. 3.

Cartilago ensiformis, Græcis Chondros Xiphoides,
6. de usu part. c. 3. Eadem dicitur mucronata, lib. de ven.
& art. dis. c. 5. Aliqui sunt, qui ensiformem cartilagi-
nem dicunt esse, totam pectoralis osis figuram, (non autem
eam tantum, quæ in imo ejus est,) quia gladii similitudinē
representat. l. de osib. c. 13. Vulgus malum punicum, seu
granatum vocat; pectoris autem osis, quod στήθιν vocant,
pars extrema est, cui τὸ στήθος & γαστήρ proximè subjicitur.

Cartilago innominata, est secunda laryngis carti-
lago, quæ nomine caret, in internis partibus, quæ Oesopha-
gus est, positionem habens. 7. de usu part.

Cartilago peltalis, est imperfectus circulus in prin-
cipio asperæ arteriæ collocatus, ad modum peltæ, cujus gib-
bositas apparet in gutture, ac Adami pomum appella-
tur; ejus verò defectus est versùs gulam, undè cartilago
peltalis dicitur; cujus defectum supplet quedam cartila-
go supposita isti inferius, faciens etiam circulum imperfe-
ctum, sed contrario situ cum superiori, quia ejus gibbositas
interius est versùs gulam, defectus exterius, versùs guttur,
diciturq; cartilago cymbalaris, vel coopertoria. l. de
anat. viv.

Chemosis, morbus oculi est, quando album oculi tu-
mesactum, adeò circulum Iridis excedit, ut & nigrum oculi
concavum videatur. lib. de anat. ocul. Alibi, Chemosis ex
vehementi inflammatione, utraq; palpebras in exteriorē
rem partem detorquet, ita ut totus oculus integri nequeat.
lib. introd. cap. 15.

Chenicias, instrumenta quedam vocant, quibus in
calvaria fracturis utimur. 6. meth. 6.

Cheros, i. e. tempus, seu ætas morborum. lib. de morb. temp. cap. 1.

Chion. Vide Cion, & Staphyle.

Chironia, & Telephia, χερσίωνες sive χερσίωνες ἰλνθ, sunt species ulcerum malignorum, oras habens duras, callosas, & tumentes. lib. de tumor. cap. 13. Tria tantum ulcera propriam habuere appellationem, Anchrax, Phagedæna, Herpes, cætera omnia, communibus deteriora, per se ipsa solebant antiqui simpliciter ulcera nominare Chironia, quæ in longum tempus protrahuntur, cum ne quidem longo tempore fuerint ad cicatricem producta, rursusq; influente in illo Ichore, ex osse corrupto, in partē penitiorē inflammantur, & pus generant pessimum, corruptissimum, à quo cicatrix eroditur, & caro exulceratur. 6. aph. 45. Inveterata ulcera, & dysepulota, h. e. cicatricem ægrè ducentia, itidem Chironia nominant, 4. de compos. medic. per gen. Dicuntur (ait) Chironia partim ab eo, qui primum ea sanavit, partim ab ipsis, qui iisdem sunt affecti, ut Telephium. 2. meth. 2.

Chirurgia, i. e. manualis operatio. 6. meth. 6. Indò Chirurgice ea est Medicinæ pars, quæ manu medetur. 3. de comp. med. per gen. cap. 2.

Chloron, i. e. pallidus & æruginosus color. 2. progn. 20. Hinc Chlorosis, quæ partim de morbo febre pallidâ, utriusque vasorum oppletionē, partim de symptomate, discoloratione universi corporis habitus virginū nubilium, ex utero egrotantium usurpat.

Choana, χόαν, seu χόανον, à χέω, i. e. liquefacio, dis-fundo, vas est ex argillâ, quo argentarii & chymici utuntur, infundendis ac liquefaciendis metallis: alias Infundibulum, Scypho, Pelvis, Pyelos, significat cavitatem

tem quandam, in quam meatus cerebri expurgantes in palatum desinunt. 9. de usu part. c. 3. Alias Choana vulgo lacuna dicitur.

Chœras, ἢ χοίρας ἀδῶ, porcula, scrofula, struma, vel à petris, quæ χοίρας λέες dicuntur, vel ἀπό τῶν χοίρων, à porcis, in quorum gutture frequenter ejusmodi tumores reperiuntur, sic dicta. Fit autem struma sæpè propter ulcus, quod in manûs aut pedis digito est, glandula in inguinibus, & aliis, tum intumescunt, tum phlegmone occupantur, quin etiâ in collo, & secus aures, sæpè glandula (in quibus in collo, capite, vel aliquâ vicinâ parte, ulcus est natum) intumescunt: nominant autem ipsos adenâs, cum sic intumescunt, Bubones; quod si scirrhus earum partium phlegmone aliquando fuerit, hæc & ægrè sanabilis redditur, & Chœras, i. e. Struma dicitur. 13. meth. 5.

Cheiras, Græcis ἢ χεῖρας ἀδῶ, ἀπό τῶν χεῖρῶν, fissura sunt, in manibus præcipuè sed & pedibus & testibus.

Cholagoga, i. e. bilis eductiva medicamenta. 4. aph. 2.

Choledocos, i. e. vesica bilis receptiva, quam etiam jecoris vesicam nominant, lib. 6. de anat. adm. c. 2. Eandem etiam cystim bilis, i. e. vesicam bilis susceptricem vocant, 4. de usu part. cap. 12. ut & fellis folliculum, 5. de loc. aff. cap. 7.

Cholera, i. e. biliaris, morbus est acutus, cum vomitibus multis, alviq; defectionibus biliosis, furis quoq; se contrahentibus, ac frigescentibus extremitatibus: suntq; in his agris pulsus minores, & obscuriores. Nomen habet non tam à χολῶ, quàm à χολῆς, i. e. intestinum, per quod materia ex ventre egeritur. Cholera duplex est apud Hippocratem: altera humida, in qua, ut omnes nôrunt, vehemens est excretio bilis, supra infraq; erumpentis, intestina

graviter torquentur, accedunt convulsiones, sæpè etiam crurum sura contrahuntur; alteram siccam choleram vocat Hippoc. ab eadem proveniente causâ, ac circa eadem consistentem, at citra ventris fluorem, & vomitum. lib. finit. med.

Chondros, i.e. cartilago. 7. de usu part. cap. 3.

Chondrofyndesmus, i.e. cartilagineum ligamentum, 1. de temp. cap. 9. Hinc & *συνχόνδεσις*, unio osium, cartilaginis interventu facta.

Choræ, i.e. regiones oculorum, seu cavitates, quæ superciliis subjacent. 8. de usu part. cap. 6.

Chorion, Græcis *χορίον* & *χωρίον*, i.e. secundina, extrema foetus, hunc totum tam in brutis, quam in homine involvens, est membrana, vulvæ prægnantis mulieris adhaerens, multarum venarum & artiarum contextu, intervalla membranæ obducta habens. (Undè *πρό* & *χορὸς* dicta, quod in eo vasa, veluti in choro disposita sunt; quamquam τὸ *χωρίον* à *χωρίον*, quod foetus velut domicilium, undè cum illo, in partu prolaturus.) Eidem duæ aliæ membranæ interius adnascuntur: altera, quæ Amnium, i.e. Amiculum dicitur, toti foetui circumjecta; altera, quæ Allantoïdes, i.e. Intestinalis, eminentibus tantum partibus, capiti, natibus, pedibus, duplex superjecta, lib. de vulvæ diss. cap. 10. quæ Arabicis Abgas, Camisia foetus, & profundatio sudoris dicitur. lib. de Anatom. viv.

Choroides plexus (qui & Retiformes, & Reticulares dicuntur, Vide Plexus retiformis.) sunt convolutiones membranarum cerebri, ex multis venis, & arteriis, secundarum instar effigiatæ, nomine à Choriis, i.e. membranæ diducto, quæ foetus extrinsecus in orbem ambiunt. 9. de anat. adm. cap. 3. Constituitur autem prope me-

medium cerebri ventriculorum. 9. de usu part. cap. 7. Dicitur adhuc & tenuis cerebri membrana Choroides, i.e. secundiformis meninx. 8. de usu part. cap. 9. Dicitur & Choroides oculi tunica, corpus quoddam retiforme, quasi tunica, (Amphiblastroïde dicta) humorem vitreum oculi ambiens, quod ex portione tenuis meningis & ipsius quasi cerebri supernè descendente, atque amplificatâ, est constitutum, reti simile, quod retiforme corpus, à choroïde, i.e. tenui meninge, quæ illi supernè committitur, continetur; undè tunica oculi choroides dicitur. 10. de usu part. cap. 2.

Chorda, ἡ *χορδή*, dicitur aut intestinum, aut ex hoc contorto, quod sit musicorum chorda, fides, aut tendo, sive musculorum extremitas, ad similitudinem chordæ arcus. 6. aph. 40. & lib. de anat. viv.

Chordapsus, Ileos, seu Volvulus, est tumor eminens in tenuium intestinorum parte internâ, talis, quo videatur intestinum ad similitudinem chordæ obvolutum, vel ab inflammatione, vel obstructione aridi stercoris, graviter egros vomitionibus crucians, aded, ut nonnulli stercus quoque, vomere conspiciantur. Hinc stercoraria etiâ dicitur vomitio, & Miserere mei Domine. 6. de loc. affect. 2. Vide Ileos.

Chronica ægritudines, i.e. longæ. de part. art. med. cap. 7. Vide Polychronius.

Chrysite, terra est aurea, in quâ, parvis terræ particulis, immista sunt parva auri partes. 5. de simpl.

Chylus; est hordei lactisve cremori analogus succus albicans ex assumptis cibis, vi nativâ calor elaboratus, partim tenuioribus portionibus, partim crassioribus constans, ex ventriculo per mesaraas in jecur, ut ibi sanguinis formâ consequatur, transmittitur. lib. de atra bile. cap. 3.

Chymethla, i.e. *perniones*. 6. *simpl.* Vide *Perniones*.
Chymosis (quæ & *Chemosis*) est utriusq. palpebra distortio, ex inflammatione oborta. 4. de compos. med. loc. c. 4. Est item *Chymosis*, carnosæ corneæ oculi pellicula inflammatio. lib. de rem. par. fac. Vide *Chemosis*.

Chymus, est nutrimentum, seu humor ad nutrimentum animalis in hepate preparatus, & ab excrementis separatus. 4. de usu part. Atqui Antiqui saporem vocaverunt *Chymum*, i.e. liquorem. lib. de ocul. par. 2. cap. 1. *Chymi* autem appellatio apud Hippocr. semper humoris corporis destinata est, ex quibus nos constituimur, nutritur, & fovetur, sanguini inquam, pituita, & duplici bili flavæ & nigra. Apud Platonem verò, & Aristotelem, gustabilis qualitas quævis nobis insita, *Chymus*, i.e. sapor, nominatur. lib. finit. med.

Chyphosis, i.e. gibbositas, (quam etiam *Chyrtosis*, i.e. incurvationem dicant) est distortio spinæ in posteriorem partem, sicuti in anteriorem partem retractio, *Lordosis* nuncupatur. Gal. lib. 3. de san. tuend. 13.

Chyrtosis. Vide *Chyphosis*.

Cicatrix, Græcis *σκαρ*, ab Hipp. nunc sumitur pro ipsis ulceribus, nunc pro consolidatione ulcerum, caro callosa, pro cute indurata, ubi vulneris, quod jam coivit, hiatus fuerat. 1. de artic. 36. Particularim autem *Cicatrix oculi* appellatur, ubi nigro oculi ex alto ulcere, membrana crassities supervenit, & color albius apparet: quæ *cicatrix*, si sit & major, & crassior ex ulcere Iridis nata, dicitur *Albugo*. lib. Introd. cap. 15. Vide *Albugo*.

Cilia, extrema illa palpebrarum partes sunt, quæ in somnis, clausis oculis simul committuntur. *Cilia* etiam *Tarfi* nominantur, lib. Introd.

Cin

Cingentes, sive *succingentes*, *membranae simplices* quædam tunica sunt, telæ araneorum similes, quæ totam utramq. thoracis regionem internam subcingunt, vocanturq. in costis *Cingentes*, Græcè *Hypexochotes*: ubi verò recta ad jugulum perferuntur, *Intercipientes*, Græcè *σπαστήριες*, (medium thoracem in latera duo distrahentes) ubi pulmone circumhærescant, hujus operimentum sunt; quarum basis, supernis partibus septi transversæ obijcitur; inferioribus autem, alia quædam membrana, huic persimilis substrata, quæ *Peritonæi vertex*, & principium jure optimo nuncupatur. 6. de anat. adm. cap. 8.

Cinumenus, *κινουμένη*, i.e. qui movetur & diversis horis semper accedit ac remittit. Contrarii huic sunt affectus estætes, iisdem horis subinde accedentes, & remittentes. Illius species duæ: *Anticipans*, & longius *Emanens*, *προλαμπνός* & *ὕστερος*. Ille, qui prævenit, citiusq. horas persolvit, *Prolepticus*, sive *Anticipans* dicitur; qui tardat, *Hystericus*, i.e. posterius invadens. lib. de Typis, c. 3.

Cion, Vide *Gargareon*, & *Staphyle*.

Cionides, Vide *Staphyle*.

Circuitus, sive *Periodus*, est tempus intentionum, & remissionum, in morbis quæ fiunt: ut, *Typus* est ordo earundem intentionum & remissionum, lib. de Typis, cap. 2. Vel, *Circuitus*, sive *Periodus*, est similis ab eodè ad idem reditus. 1. aph. 12.

Circumcisio, vel *circumsectio*, est ablatio cutis glandem contegentis in virili pudendo, quæ cutis præputium dicitur. lib. finit. med.

Circumnuens. Vide *Innuens*.

Circumocularis tunica oculi est, quæ à crassa meningē orta, toti oculo substernitur, *circumrangens*, & cir-

cuminduens osseam oculi orbitam, ne huic oculus indatur nudus. lib. de anat. viv.

Circumossalis membrana, quasi ossium involucrum dixeris, est, quæ singulis ossibus in longitudine circumjicitur. 1. de sem. c. 10. Quam in capite, Pericranion dicimus, lib. de anat. oculi. In costis autem, aliisq, ossibus serè cunctis, Perioption. 8. de anat. adm. cap. 10.

Cirros. Vide Cornua vulvæ.

Cirfocele. Vide Celas.

Cirfos, i.e. varices, aliàs quoq, venas omnes dilatatas Antiqui sic nominabant. lib. de tumor. c. 16. Vide Varices.

Citræ. Vide Citrosa.

Citrosa, i.e. vitiosi cibi appetentia, qualis gravidis conringit, 6. de sanit. tuend. cap. 9. Dicitur etiam νίος, & νίσις, Citra, Pica, & Picatio. 1. de sympt. caus. c. 3. & c. 7.

Claves, sive Jugulum, dicuntur aliàs duæ primæ costæ prope guttur, inter os pectoris, ac spinæ finem, 13. de us. part. cap. 11. Claviculas etiam aliàs vocant, lib. de musc. dist. cap. 12. quas vulgo dicunt furculas, quarum una superior, altera inferior nuncupatur. Recentioribus autem, elatiore in thoracis sine, & quidem in anteriori parte Claves existunt, sic dictæ, quod sterno, Omoplatas, i.e. humerum firment; is autem finis vulgo furculâ superior dicitur; cavitates sub his clavibus summo in thorace quæ conspiciuntur, appellantur Sphage, i.e. juguli, ut sint duæ claves, & juguli toridem, dexter, & sinister.

Clavus, sive Gomphos, est oculi morbus, cum uvea locum suum egrediens, pelliculas superficiei renus operit, unde ejus forma sit quasi clavus. lib. de ocul. cap. 11. Vide Gomphus, & Myrmecia.

Clunes. Vide Coxa.

Cly-

Clydones, symptoma est retentricis facultatis ventriculi, cibos vel non complectentis, vel diminutæ, vel vitiosæ, unde flatulentia, & fluctuationes cum sonitu succedunt: flatulentia quidē, ubi & cibi flatuosi sunt, & ventriculus non admodum frigidus; fluctuationes cum sonitu, cum vel nihil in eo continetur, quod verti in flatum possit, vel vehementer fuerit refrigeratus. 3. de sympt. caus. cap. 2.

Clyster, κλύστρος, Latinis idem est quod lavamen, seu ablutio, à verbo κλύειν, quod & lavare significat. Alio nomine Græcis ἰνιουα dicitur, quæ vox Latinis injectionem significat. Medici hujus temporis, Clysteris, & Enematis Græcis vocibus potius quam Latinis malunt uti. Dicitur etiam Clyisma: unde Diaclyisma, i.e. lavatio ad ulcera, & dentes tirubantes, infirmosq, . Dicitur adhuc & Clysmus, de medic. fac. par. cap. 16.

Cnimi, Græcis νῆμιν, i.e. tibia, seu alterum ex duobus ossibus tibie eodem cum toto membro nomine, alterū verò Perone, seu fibula dicitur. 3. de usu part. c. 9. Vide Crura.

Coadjutrix causa est, quæ solâ suâ virtute morbum efficere nō potest, sed alteri auxiliatur, ut Venus immoderata articulare morbum promovet, & sanguinis eruptionem remigatio. lib. Introd. cap. 8.

Coarticulatio. Vide Abarticulatio, & Dearticulatio.

Coccyx (vulgo Cauda) i.e. Cuculus, est os, quod subest ossi sacro. lib. de ossib. cap. 12. & 3. de artic. 10. 4.

Coctio, quid sit, hinc nosces, cum facultates quatuor sint, atque inter eas non minimè valeat alteratrix, per quam natura alimentum assimilât, coctio nuncupatur nutritivæ substantiæ permutatio, secundum qualitatem. 4. de rat. vict. 4. 4. Perfecta urinæ coctio est, quando in uri-

nis subsederit aliquid album, & lave, & aequale, & continuum: Debilis autem coctio est, quando ex aquosa mediocriter subpallida facta fuerit; & quidem si turbulenta apparuerit, & talis permanserit, hac quoque imminuta & debilis coctionis est signum, & rufa etiam ac tenuis, ex eodem genere est. 1. de cris. cap. 27.

Coctionis signa sunt, quæ hominis salutem, non tamē semper per crisin futuram ostendunt; quo distinguuntur à Decretoriis, quæ salutem hominis futuram, per crisin ostendunt. Coctionis, quæ in spirandi sit instrumentis, sputa; ejus, quæ in venis, urinæ; illius, quæ in ventre, alvi excrementa, indicia, & characteres, statuere oportet. In febribus igitur (quoniam venosi generis sunt passionēs, nam & arterias in hoc genere comprehendimus) ad urinas præcipuē attendere oportet. 1. de cris. cap. 7.

Cœcum foramen, est angustius illud aureū foramen, quod ex duobus inæqualibus foraminibus, quibus quinta nervorum conjugatio à cerebro excipitur, oritur, cui subditur labyrinthus quidam, quæ natura effecit, musculis temporalibus consulens, nervum durum eis simul & labiis immittens. 9. de usu part. cap. 13. Vide Meatus auditorius.

Cœcum intestinum, sive orbem, sive monoculum, est quartum intestinum in ordine, primum locum inter crassa obtinens. lib. de anat. viv. Quidam illud saccum nominant.

Cœlia, apud Græcos νοτιά, sine adjectione omnem ventrem seu cavitatem signifi. ut. 6. aph. 20. Apud Aristotelem in specie dicitur Cœlia, ventriculus, seu illa tantum corporis partis cavitās, in quā cibis devoratur, & in qua prima concoctio peragitur, sed apud Hipp. nunc cum adjectione superior, & inferior venter significantur, ut superior sit

fit ventriculus, inferior, omne, quod sub diaphragmate est, spatium latius.

Cœliaca, i. e. ventralis dispositio, communis morbus est ventriculo, & intestinis, in quo materia, nō mordaces, egeruntur, intestinorum ob imbecillitatem, quæ retinere, contenta, ne exiguo quidem tempore possunt, sed ea illico excernunt, perinde ac si gravē aliquod onus deponerent, nec secus, quam in stranguriā, vesicā (in quā ob acrimoniam & vellicationem hac jugiter, quicquid ad eam pervenerit, excernit) contentorum molem ne quidem exiguam sustinere valet. 6. de loc. aff. cap. 2. Vide Lienteria.

Cœli status, i. e. ambientis nos aeris, temporisq; præsentis constitutio. 9. meth. 5.

Cœlomata, sunt rotunda & cava ulcera, bothriis latiora, quæ in oculis, circa Irim nascuntur. lib. Introd. c. 15.

Cœlum, more vulgi, appellat Hipp. ærem, 1. de morb. vulg. 1. qui supra nos est, usq; ad nubium regionem. com. 1. in 1. de morb. vulg. 4. Quanquam verò Cœli etiam nomine, omnis cavitās designari potest, tamē specialiter, Cœlum vocatur superioris palpebræ superficies; sicut Hypocœlum pars inferior, quæ ei responderet: utrumq; tum in Aqua inter cutem, tum in alterius generis malis habitibus, in diuturnis insuper hemorrhoidibus, longis ad-hæc in mulierum profluvii, atq; inchoantibus ophthalmiis intumescit. Sunt qui cœlum oculorum interpretantur cavitates, quæ sub oculis & utrâq; nasi parte cernuntur, quæ tamē Canthi dicuntur.

Cœrulea oculi tunica, eadem est cum Rhagoide, uvæ, & uviformi, procul dubio, ob versicolore internam hujus superficiem sic dicta. 10. de usu part. cap. 4. Vide Rhagois.

Coincidentia, sive Intercidentia, Græcis *παρέμνησις*, est, cum aliunde in aliud vas humor fluit. 7. de anat. adm. cap. 16. In oculo autem coincidentia est, ubi in meatum, porumve opticū, qui à basi cerebri veniens, oculo videndi facultatem tribuit, humor morbidus ad aperto vel rupto vase incidit, eumq; aded obturat, ut visiva virtutis in oculū prohibito com meatu, animanti, hac ratione, cum dolore visus eripiat. lib. Introd. cap. 15.

Coinclicantia, Græcis *συμπεπληρωσις*, sunt, quæ præter proprias cujusq; morbi indicationes, ægri ad-hac virtutem, naturam, ætatem, anni tempus, regionem, consuetudinem, & si quæ sunt id genus alia, considerant, ac à primis indicantibus indigitata præsidia approbant & confirmant. 13. meth. 16.

Cola, dicuntur in homine longiora majoraq; membra, à thorace separata, & quasi dependentia, ut Brachia & Manus, Latinis dicuntur Artus, 3. de usu part. cap. 1. Dicuntur & Cola, ossa narium, cribrosa illa minutissimis foraminibus pertusa, ut in seqq. dicitur. Vide Ichmoidea.

Colatoria ossa, sunt narium foraminulenta & cavernosa ossa, quæ à cribri similitudine, Ichmoidea, vel à spongiâ, Spongoidea appellantur; varia enim habent foramina, quo modo & spongiæ: neg, ea habent recta ut cribra, quod per ea superflua cerebri excrementa transcolantur, & odoratarum rerum species ad processus mammillares rectâ adscendunt. 8. de usu part.

Coles, est particula corporis insignis, ad extremitatem colli vesica sita, quâ mares feminas exuperat. Hanc ipsam Græci *πενήλιν, πένηλον*, Latini Penem, Colem, Mentulam, Virgam, & Pudendum virile nominant. 5. de usu part. cap. 15.

Co-

Colica dispositio, est morbus plenioris intestini diuturnus, in quo cruciatus intolerabiles, difficultates spirandi sudores perspirationesq; suboriuntur. lib. finit. med. Suntq; Colicus & Volvulus intestinorum etiam inflammationes, quorum alter, tenuioris intestini affectus est, alter plenioris, quare dejectiones includuntur, & status intestinis involuti, eo quod exitum non habeant, dolores vehementes, & tormenta concitant, lib. Introd. cap. 13. & 2. de loc. aff. 5. Indè Colica medicamenta sunt, quæ ad sedandum coli dolorem sunt comparata, quæ quidem etsi anodyna sunt, à communi tamen anodynorum formâ differunt, quod propriè Colica sic dicta, aromatibus odoratis, ac urinam tenentibus seminibus permiscuntur; & quanquā Colica vocentur, non tamen ad Colicos tantum, sed ad omnem dolorem, in quacumq; corporis parte factum, sedandum admoventur: quo factum est, (inquit Gal. initio libri sexti de loc. aff.) ut antidotos omnes dolorem sedantes, veteres Colicos nuncupaverint. Vide Narcotica.

Collectiva medicamenti facultas est, quæ ulcera, & vulnera glutinat. 5. de simplic. cap. 2.

Collectiva inæqualitas pulsuum est, quæ ex inæqualitate plurium pulsuum est conflata. 1. de differ. puls. cap. 30. quæ & Systematica dicitur. Vide Systematica.

Colliculum, idem est quod Nympha, nimirum caruncula membranosa, ad fissuram colli matricis exorta, quæ, dum virgo defloratur, rumpitur: quam ipsam, quod multo promineat, Aegyptii in virginibus excidere consueverunt. lib. Introd. c. 10. Atqui plures ex antiquis Anatomicis, tum præsertim Avicenna, dicunt, id, quæ nondum Venerem sunt experta, circa medium colli uteri, panniculum, virginalem dictum, esse, qui hymen, aliis hymenæon, vocatur, & ut ajunt,

ajunt, in primâ coitione rumpitur; quod verisimile non videtur, nam in dissectione virginum non apparet, nec usquam, quod legerim, meminit Galenus; sed potius credendum est, collum ipsum, quod musculosum sit, & nervosum, in iisdem virginibus tantummodo connivere, & angustum esse. Nympha verò est annata Epiphysis, & appendix cutacea, lata, intra pudendum muliebre, supra alarum commissuram, ad urinarium meatum sita: gemina autem est, utring, scilicet una, data est à naturâ, tum ornamenti causa, (nam quod peni virili præputium est, & uva Pharyngis, id Nympha utera:) tum etiâ, ut uterum à pulvere, frigore, & aliis externis injuriis tueatur. 15. de usu part.

Colliquatio, Vide Anastœchiofis.

Collisio, & Contusio, est, cum exterior superficies percussæ corporis, continuitatem servat, multa verò exigua divisiones in profundo apparuerint; at cum cavitas aliqua forinsecus apparet, quam rei collisa percussor impresserit, tunc Illisio, Græcis ὀλίσσις dicitur. lib. de sympt. caus. cap. 11.

Collum uteri, sive os uteri, est illud, quod intus est, ubi uterus desinit, collum verò incipit; quod magis propriè os uteri diceretur: nam altera colli extremitas, quæ mulieris pudendo conjungitur, non uteri, sed ipsius colli os non sine ratione diceretur. 5. aph. 46.

Collyria, Latinis Medicamenta vocantur, quæ oculis admoventur, Græci κολλύρια nominant: hæc verò duorum generum sunt; quedam enim liquida sunt, & passim collyria nominantur; quedam arida, & hæc barbarè vocantur siefi: Græci hæc vocant ἑγγονόματ' αἰμα; illa verò ἰγγονόματ' αἰμα. lib. 9. simpl. & 4. de comp. med. loc. cap. 5.

Colobomata, Græci vocant partes, quæ in labiis aut

narium

narium alis, aut auribus deficiunt, & decurtantur. 14. meth. cap. 16. Alias curta vocantur, & mutila.

Colon, intestinum quintum in ordine, secundum autem ex crassis. 6. de anat. adm. cap. 9. Dicitur verò Colon, i.e. laxius intestinum, quod excrementa ex chylo segregata, suscipit, lib. Introd. c. 11. quod & pingue intestinum appellat Galenus, 2. de sympt. caus. cap. 5. Unde propter suam latitudinem id ipsum solum, quidam ventrem inferiore appellat. 4. de rat. vict. 112.

Columella, ὠτὸν, ὠτὸν, & Columna, sive Gargareon, & Uva, γαρύφαλλος, caruncula est membranosa, in fine palati, à faucibus dependens, vocis instrumentum, quod hiante ore conficitur. lib. finit. med. Vide Gargareon, & Staphyle.

Coma, i.e. sopor, sive propensio & delatio in somnum, est, cum vigilare agri nequeunt, habentes oculos conniventes, & alto somno detinentur. com. 1. in 3. de morb. vulg. 7. Vide Caros. Hippocrates verò Cataphoram, omnem ad somnum propensionem, Coma appellat; est enim in somnum delatio, nequeuntibus infirmis, vigilantium munia obire, sed tunc palpebras claudere cupientibus, tunc dormire sperantibus: cum autem agri clausis palpebris dormire nequeunt, sed plurimum vigilant, Coma ἀγρυπνῶδες, i.e. pervigil & non somnulosum vocat. com. 1. in 1. prorrhet. 1. Aliquando Coma pro marcere sumitur, 4. de san. tuend. cap. 4. Marcere enim, torpere significat, atq. languore & inertia teneri. Unde Celsus, de Lethargo, dicit: Marcor est & inexpugnabilis dormiendi necessitas, & comatosos proin, somnolentos, & inertes appellat. Vide Sopor.

Comitialis morbus, est omnium corporis partium, ex temporum intervallis facta convulsio, cum mentis ac

sen-

sensuum oblesione: aliàs Epilepsia dicitur. 3. de loc. aff. & de differ. morb. cap. 5. Quin etiam morbus magnus, morbus facer, affectus puerilis, & Hercules dicitur. Puerilis quidem, quoniam pueritia tempore sevit; Hercules, non quod Hercules eo vexatus fuerit, sed quidam morbi sevitiam exprimere volentes, nomen hoc magnitudinem significans, Herculeam effinxerunt. com. 6. in 6. de morb. vulg. 7. Dicitur quoque puerilis, cum à pueritia incipiens, fere semper consenescat. Latini Comitalem dixerunt, quod in comitiis, & hominum frequentia maxime, egros corripit.

Commisflura, quæ & Sutura dicitur, Synarthrosis species est, & osium compositio, ad consuturam rerum similitudinem, quæ & serrata dicitur, cum, serræ modo, contrario occurſu congregiuntur, ubi dentata alterius partes, in alterius finis committuntur. lib. de osib. in proem.

Communis, sive universalis morbus, Græcis πᾶσι κοινός, est, qui multos in communi invadit: cui oppositus est morbus, qui dispersus, sive Sporadicus dicitur, qui aliquos separatim tantum invadit. Inter communes, alii sunt publici, quos vocat Endemios, sive collactaneos, & vernaculares, in quo genere Scorbutus est; alii vulgares, seu publice grassantes, quos Epidemos, seu Epidemios vocant, ut est Pestilentia. com. 1. in 1. de morb. vulg. in argumento. Vide fusiùs in verbis, Pandemus, & Epidemus.

Communis, sive media cubiti vena, est, quæ communis ei, quæ humeralis nominatur, & ei, quæ per axillam ad manum fertur, 2. de loc. aff. cap. 7. quæ & mediana, & corporalis, & purpurea, & nigra dicitur. lib. de anat. viv. Vide Media.

Com

Compages, capitis sunt suturæ, quæ parte ossa capitis inter se murò cōpacta, coaptantur. Calvaria enim ossa aded exquisitè inter se conjunguntur & coaptantur, ut ipsorum conjunctio per harmoniam facta, merito futura, ex pannorum, qui consuuntur similitudine, dicatur. com. 3. in lib. de iis, quæ in medic. sunt. 36.

Complexio febrium est, quando duæ febres simul ægrotum corripientes, horis differentibus invadunt: confusio autem, quando eodem tempore inceperint. 2. de differ. feb. cap. 8.

Compositus morbus est, qui ex pluribus accessionibus, & remissionibus, sive ejusdem generis, ut duarum vel plurium tertianarum, quotidianarum, vel quartanarum; sive diversi generis, ut unius tertiana cum quotidiana, vel cum quartana, constat: cui oppositus est morbus simplex, unam genere intensionem & remissionem faciens. lib. de Typis, cap. 3.

Compressio, est laterum cujusque, vasis adstrictio, & angustatio per coalitum, 1. de caus. sympt. cap. 5. differens ab obstructione, (quæ & oppilatio dicitur, 2. de caus. puls. cap. 1.) quippe hæc est meatuum nostri corporis interclusio, ex aliquo tumore, vel corpore interposito, non per coalitum, lib. de diff. morb. c. 7. Illa autem inprimis ab externis oritur causis. E. G. Compresso extrinsecus nervo, angustia meatui ejus contingit. 1. de sympt. caus. cap. 5. & de differ. morb. cap. 5.

Comunctio, est perforatio, quæ acutis suffusis. 10. de usu part. cap. 6.

Concava vena, est vena porta. 5. de loc. aff. cap. 3. Vide Vena porta.

Concepcio, sive seminis comprehensio, motus est

F

quidam contractionis uteri, dum semen in se ipsum ejaculatum, avidissime manu veluti quâdam amplectitur. lib. An animal sit id, quod utero geritur? cap. 2.

Concoctio, est ciborum à ventriculo, in convenientem & familiarem animali qualitatem alteratio: quâ concoctio, si tardâ, & ægè, longiori, iusto tempore fiat, Bradypepsia; si autem in alterâ qualitatem, nec in eam, quæ sit secundum naturam, fiat mutatio, Dyspepsia; si verò nulla fiat alteratio, sed quales sunt assumpti cibi, tales in omni qualitate manent, & deiciuntur, dicitur Apepsia. lib. de sympt. diff. cap. 4. Alteratio ipsa, usque-quò alimentum, in similitudinem partis, quæ nutritur, transmutatur, concoctio; ubi verò jam parti apponitur, nutritio dicitur. 8. de compos. medic. loc. cap. 6. Concoctio eorum, quæ præter naturam sunt, est ipsa maturatio morbi; at ipsa concoctio, in coquentis substantiam deductio quædam est ejus, quod concoquitur. com. 2. in 1. de morb. vulg. 44.

Condensantia medicamenta omnia, frigida sunt, & aquea, quare poros cutis, & meatus, in unoquoque corpore condensant, & contrahunt. Ceterum, instrumentum undique, totum constringere nequeunt, unde & Pycnotica dicuntur; differuntque à ficcantibus, quod frigida & sicca sint; ab obstruentibus, quod frigida & crassa sint substantia. 5. de simpl. cap. 14. Vide Obstruentia.

Condyloma, quasi dicas Nodus, est extuberatio, quæ cum phlegmone in rugosa contrahenteque se se ani parte exsurgit, lib. finit. med. quæ & Thymus dicitur, 14. meth. c. 3. Est quoque Condyloma, carnis excrescentia callosa in digitis manuum & pedum, in sede item, ac uteri orè coalescens: sic dicitur tumor hic, quod prominet in nodum articuli, quem Condylon appellant; sed hic affectus in sede præ-

præcipue oritur, rugâ aliquâ corporum in ano reduplicatorum insurgente, ac præter naturâ intumescente. Quum enim sinuosus sit anus, rugas coagmentatas habet; ubi verò amplius intumuerit, tunc fit Condyloma, & aliquando citra inflammationem fit, & molle est; quandoque verò cum inflammatione, tumque durum est, & dolorificum. Gal. 1. de ossib. cap. 5.

Condylus, i.e. Tuberculum, seu Nodus, est gibba ossium radii & cubiti explantatio, quæ carpo dearticulatur; ob id etiam aliquando Capita dicuntur, & Apophysis, 2. de usu part. cap. 2. Dicuntur & Epiphyses, i.e. ossium capita; ubi enim os medullam habet, ejus finibus, utrinque caput, instar operculi cujusdam, ut plurimum vides adnati. 10. de usu part. cap. 18. Vide Nodi, & Articuli.

Confusio febrium. Vide Complexio.

Congelationes, passionum omnes dicuntur, quæ à causa frigida, & vehementibus algoribus ortum duxerunt. lib. de differ. morb. cap. 5. In specie Catalepsin & Nervorum rigorem sic vocitant.

Conia stacte, i.e. Lixivium destillatum. 1. ad Glauc. c. 3.

Conjectura artificiosa est, quæ propè ad veritatem accedit. 1. de cris. cap. 9.

Conjunctiva oculi tunica. Vide Rhagois.

Conjunctiva & continens causa. Vide Continēs.

Conoides corpus, sive Turbinatum, quod & Conarium dicitur, cerebri particula est, veluti firmamentum quoddam, venis, à magna vena cava propagatis, adjacens. lib. 9. de anat. adm. cap. 3. Ejus substantia glandula est, figura cono perquam similis; unde ei nomen quoque, est impostum: utilitatem autem ejus eandem esse existimant aliqui, quæ est Pyloro ventriculi; nam ut hunc confirmant

esse glandulam, prohibereq; ex ventriculo cibum prius, quam is coctus sit, in tenue intestinum transsumi, ad eundem modum & hanc glandulam Conarion, in principio meatus ejus, qui spiritum ex medio ventriculo in Parencephalidis ventriculum transmittit, constitutam, custodem quandam esse ajunt, & velut Oeconomum, non plures spiritus de sese emittens, quam quantum spiritus mitti oportet. 8. de usu part. cap. 14.

Connutritus morbus est, qui longinquo tempore hominum corpora infestat, atq; his veluti connatus est. com. 5. in 6. de morb. vulg. 6.

Consistentia urinæ, hujus est tenuitas, & crassitudo. 9. meth. 4. Eandem Arabes vocant Urinæ substantiam.

Consistentia, seu status Paroxysmi, αὐτὴ, est illud tempus accessionis febrilis, cum jam caliditas materiam convicerit, & usq; aded calor augetur, ut non modò locum exurat, in quo est putredinis focus, sed etiam continuatim per totum corpus dispergatur; deniq; cum jam ad summum fervoris devenerint humores accensi, id accessionis tempus consistentia appellatur; tunc verò universum laborantis corpus, igneum redditur, extensum per totum animalis corpus æqualiter caliditate. 2. de differ. febr. c. 11. Vide Ascensus morbi.

Constitutio, ἀσθένεια, luxati corporis in propriam sedem collocatio est, restitutio, & reposicio. 3. de fract. 38.

Contenta, ἰσχυρία. Vide Continentia.

Contentiva causa. Vide Continens.

Contentus pulsus, idem est ac vehemens. 3. diff. puls. 5.

Continentes causæ (quæ continuæ, & conjunctæ dicuntur) sunt, quæ cum præsentibus sunt, morbi quoq; adsunt; cum tolluntur, morbi etiam discedunt: aut (ut

in

Scholis dicunt) quibus positus, ponitur; sublatis verò, tollitur morbus: ut, spina, telum; opponuntur Evidentibus, seu Procatarteticis, & Antegressis causis, quæ postquam adversam valetudinem creârunt, secedunt & separantur ab ea: ut, labor, Solis ustio, cruditas. Concausæ sunt, quæ affectum suum vi solæ generare licet possint, generant etiam, & alteri coherentes, unde Synæctia dicuntur: ut, lapis in vesica, & inflammatio; nam amba urinæ suppressionis causa sunt, licet per se, earum utraq; illam generare possit. Coadjutrices causarum partes sunt, quæ suâ virtute morbum efficere non possunt, sed alteri auxiliantur; ut libido articulare morbum promovet. Præcedens causa interna est, quæ ab evidentibus vel preparantur, vel coadjuvantur; ut, sanguinis abundantia, nutrimenti soboles est. lib. Introd. cap. 8.

Continens febris. Vide Synocha febris.

Continentia, ἰσχυρία, vocat Hippoc. solida corporis membra, ut quæ comprehendant, regantq; humida; Contenta autem appellat humores, ut qui a solidis comprehendantur, quæ cum impetu feruntur substantiæ spiritus; si quidem in omnem corporis partem momento temporis, & facili, & citra impedimentum perveniunt. lib. de trem. & palp. cap. 5. Continentes ergo partes erunt, E. G. corpus solidum cordis, arteriarum, & aliarum partium carvarum, atq; aliquid suo sinu cõcludentium, quæ sunt bases, radices, & fundamenta aliarum; in ipsis enim singulis triplex adeest substantia, verè ipsa solida, circumfusa alia, carnosa munies, & fovēs, & per utramq; sparsa spirituosæ.

Continua febris, συνεχὴς πυρετός, est, quæ ad infestationem, antequam ex toto solvatur, non devenit, etsi declinatio aliqua & remissio sensibilis appareat; cum verò

declinatio aliqua sensibilis non fiat, semper verò à primo principio febris, usq³ ad crism similis perseveraverit, erit febris deurens, ardens, homotonos, Caulon, à continuis, solà acutiae differens, (quae enim idem cum genere nomen sortiuntur, atq³ in pluribus particularibus accessionibus continentur, continuæ vocantur) quæ & Synocha appellatur; alia quidem Epacmaistica, sive Increfçens, sive Anabatica; alia Homotona, sive Acmaistica, in eodem semper vigore & tenore perseveras; ultima Paracmaistica, sive decrefçens. 2. de crif. 6. & 2. de diff. febr. cap. 2. Bisariam Veteres Continui nomine, & Intermittentis appellatione utri videtur; Nam Continuas vocant febres quandoq³ omnes, quæ nullum tempus liberum habet accessione; quandoq³ non omnes, quæ accessione nunquam vacant, sed solas præcipuè illas, quæ omni carent, usq³ ad iudicium, mutatione. Ita Intermittentes interdum appellant illas solas, quæ accessionem perpetuam non habent; interdum eas, quarum equidè non recedit accessio: insignes autem sunt mutationes singularum accessionum, in initio, incremento, vigore, & remissione. At Medici quidam iuniores, quæ non magnam mutationem habet, non Continuas, i.e. Synochas, sed Synochos nominant; Continuas autem has solas, quæ non veniunt ad integritatem, & intermittunt, singulis accessionibus, has vocant Antiqui interdum Continuas, interdum Intermittentes, nam sunt rectè inter Continuas & Desinentes in integritatem, media. Proinde rectè, ubi cum Synochis conferuntur, Intermittentes appellantur; cum iis autem, quæ ad integritatem veniunt, Continua. com. 3. in 1. de morb. vulg. 2.

Continui solutio, ἀνέκτασις. Vide Unionis solutio.

Con-

Contractiones. Vide Ganglia.

Contraindicare. Vide Endixis.

Contraria, apud Hippoc. & Medicos sunt, nō in corporum modò qualitate, ut calidum frigidò, humidum sicco; sed in quantitate etiam, ut magnum parvo, laxum denso, plenū vacuo, quæ Aristoteles opposita vocat; & hoc sensu dicunt Medici, curationem fieri per contraria. 11. meth. c. 12.

Conturbatio, seu Perturbatio, ταραχὴ. Vide Taraxis.

Contusio, θλάσις est, cum grave aliquid, supra corpus durum aut molle incidit, ac id ipsum collidit, ita ut carnea pars disrumpatur; cum verò caro contusa, in loco sub cute, cruorem contraxerit, sine ulla cutis divisione, exuccatio, sugillatio, effusio, nigror, & nigritia affectio hæc dicitur; venas tamen exiguas, simul cum carne rumpi, ac discindi in huiusmodi sugillationibus, est perspicuum. 3. de his, quæ in medic. fiunt. 30. lib. de tumor. cap. 105. & de compos. med. per gen. cap. 3. Vide Collisio, & Unionis solutio.

Convexa hepatis. Vide Sima.

Convulsio, κράσις, cum omnes arbitrarii motus, musculis obeantur, quando hi, ad sua ipsorum capita retracti, unamquamq³ particulam, cui inferuntur, simul attraxerint, si affectus aliquis p. n. in tensionem musculos ducens, iisdem acciderit, hunc motus sequitur, similis quidem naturali, sed citra voluntatem, & vocatur affectus Convulsio, lib. de trem. & palp. c. 8. quam convulsionem Celsus lib. 2. cap. 1. vocat nervorum distentionem; quæ vel universalis est, (ut, cum totum corpus curvatur, aut in anteriora, & dicitur ἐμπροδόνος, aut in posteriora, ὀπίσθονος, aut in utramq³ partem equaliter, τέρωνος, quibus additur & ἐντολόνος) vel particularis, aut in musculis oculorum, & di-

F 4

citur *σφαβισμός*, aut mandibula, *τενωμός*, aut oris, *νωμός* *αλωμός*, aut penis, *αλβέλας*. Vide Rhegma, & Unionis solutio.

Convulsio canina, *αλωμός* *νωμός*, est affectio musculorum maxillarium, per quam, os, nasus, oculus, labrum, atq; adeo dimidia faciei pars, in obliquum intorquetur. Alias vocant oris torturam. 4. loc. aff. c. 2. versùs finem.

Convulsio comitialis, aliud nihil est quam Epilepsia. 5. de loc. aff. 5. & 3. de loc. aff. 7.

Convulsivum affectū vocat Galenus, qui ante mortem, necessario convulsioni habet symptoma. 1. de præag. ex puls. c. 4. & com. 3. in 1. prorrh. 69.

Convulsi, & vibrati pulsus sunt, qui naturali sede relicta, unum locum non tenent, sed sursum atq; deorsum agitantur. In vibratis, arterie quadam partes, quasi jacula superiora petere, quadam demitti uno eodemq; tempore conspiciuntur. 1. de diff. puls. c. 28.

Convulsivus pulsus est, in quo ad utrumq; terminū tenditur arteria, quæ convulsio sequi solet. 2. de caus. puls. 12.

Coopertoria cartilago. Vide Cricoides.

Cophosis, *νωφωσις*, i.e. surditas, est abolita auditus actio, inducta ab iis, quæ vel ipsam audiendi facultatem, ejusq; primarium instrumentum, (quod est animalis spiritus, in aures affluens) aut ipsius organa, quæ natura ad audiendum comparavit, ledunt.

Copos, i.e. lassitudines, Græci vocant affectus, ex multo vehementer motu corporis vel torius, vel particularum, quæ jussu plus laborarunt, obortos: unde Acopa medicameta, quæ talem lassitudinem tollunt. 7. de comp. med. per gen. cap. 11.

Copula, Ligamentum, Græcis *συνδεδωμένος*, terminus

mus

musculi est, sensu omni carens, durior & trassior nervo, & tendone, usum eum, quem vel nomine ipso præ se fert, exhibens; differt à Nervo, & Tendone, quod Nervus, à cerebro, vel spinali medullâ exorsus, sensum aut motum membris inducit; Tendo vero finis musculi nervosus est, ex Copula, & Nervo prognatus. 1. de placit. cap. 9. com. 1. in 6. de morb. vulg. 2. Vide Nervus.

Cor, *καρδιά*, est viscus, carne compactâ, durâ, fibrosâ, cavâ, constans, principium vitalis facultatis. Sunt qui musculum esse definierunt; verum & minus rubet quam musculus, & longè durius, spissius, solidiusq; est, multoq; aliter fibris intertextum; fibris namq; validis & rectis caro ejus circumfusa est, (undè & Parenchyma, nomine quoq; aliis visceribus communi, appellatur) à basi ipsius, in mucronem tendentibus, arteriarum & caloris nativi, quo animal regitur, quasi fons & domicilium, in medio omnino thorace situm, præsertim suâ basi, quam caput ejus nominant, mucrone ad partem levam vergente. 6. de usu part. & 7. de anatom. adm. Vocant adhuc & Cor, Veteres omnes, os ventriculi, propter affinitatem maximam, quæ illi est cum corde, & mutuum consensum: ut ostendit Gal. 2. de placit. & 5. loc. aff. 6.

Coracoide. Vide Ancyroide, & Acromion.

Coryphe. Vide Vertex.

Cornea, sive Corniformis, (*νεφαισίδης*, *χιτών* ἢ *ὀφθαλμός*) oculi tunica est, tenuis, dura, & densa, quæ à dura cerebri meninge profiscitur, & tenuem oculi tunicam choroidæ in orbem amplectitur, quæ & Ceratoide, 10. de usu part. cap. 3. quin & Cærulea dicitur, estq; tunica secunda oculi, h. e. proximè subjecta, adnata tunica, quam *επιπερόν* appellant. Vide Cærulea, & Ceratoide.

Cornicularis processus. Vide Ancyroide.

Corniformis. Vide Cornea, & Ceratoide.

Cornua, κέρατα, numerantur inter affectus præter naturam: sunt autem due eminentia ossæ, quæ prope tempora nascuntur; dicuntur alias Dionysisci: sunt & cornua vulvæ, sive sinus, duo processus insignes, à lateribus vulvæ, ad utraq; ilia, quos alii vocant Cirros. l. de vulvæ diss. c. 3. Vide Apices matricis.

Corona oculi. Vide Iris, & Stephanos, ἑρπύλλιον.

Coronale os, ut Coronalis futura, στεφανώσιον, ἑρπύλλιον, sunt futura anterior cranii, ab uno temporum osse ad alterum transversim perveniens: sic etiam os frontis, coronale dicitur, quoniā aut eā capitis parte, ubi id ipsum consistit, corona gestari solent, aut quoddam orbem frontē cingant. 9. de us. part. 2. de ossib. c. 1. 6. de anat. adm. cap. 1. Inde & Coronalis vena, στεφανώσιον φλέψ, propago est, veniens à magno trunco vena cavæ sursum ascendens, cingens cordis basim in modum corona, eidemq; alimentum advehens. Est & alia vena cavæ propago, quæ

Coronalis stomachica, στεφανώσιον στομαχικὴ appellatur, quæ à ramo splenico vena cavæ proficiscitur, & ad stomachum effertur, ibiq; bipartito ramo, majore, seu coronā stomachum totū cingit, minore ad pilorū descendit. Quem admodum autem à vena cavā coronalis hæc vena proficiscitur, sic à magnā arteriā statim, ubi à corde orta est, arteriæ due coronariæ prodeunt, major sub valvula dextrâ, minor sub postica, quæ in cordis superficiem, & ejus partem crassiorem, perinde ac vena, distribuuntur. 7. de anat. adm.

Coronæ, sive Coronon, est extremitas ossis, hujusve pars ultima, quæ in mucronem desinit. l. de ossib. in proem. Unde omnes apophyses rotundas appellant Coronas, vel

Co.

Coronos, κορώνη, κορώνον: sic autem dicitur, quia τῆς κορώνης, h. e. cornicis rostro similis sit. Quæ autem apophysis in caput crassum & rotundum desinit, non Corone, sed Auchē, Græcis αὐχὴν, nominatur. 2. de usu part. c. 14.

Corrugatio pupillæ. Vide Tabes oculi.

Coryza, gravedo, κόρυζα, tenuis & incoctus humor aqueus est, qui per nares secernitur; quæ ipsa defluxio, cum per palatum sit, dicitur catarrhus. 2. progn. 49. Est autem hic humor, non σπῆνς, sive crudus, sed ἄπειρος, h. e. liquidus & tenuis. Celsus autor est, & destillationem, & gravadinem κόρυζας Hippocratem appellasse. Catarrhum appellamus, cum quod supervacuum est in cerebro, in os defluit; Coryzam, cum in nares. Bronchos autē sive rautitas catarrhis supervenit, faucibus scilicet humore imbutis; quod si in Gargareonem fluxio decumbit, quam ex similitudine Græci staphylen, i. e. acinum vocant, in ea gignit, aut alias eam in tumorem attollit, at si glandulas, antidas, aut eas, quæ iis proxima sunt, Paristhmia. 3. de sympt. caus. cap. 4.

Costa extrema est, non parva illa reverà spuria, quæ ab aliis discedit, & carnosæ parti septi transversi obducta est, sed ipsi proxima, cui manifesta jam membrana tenuis, intus subrenditur, ei continua, quæ omnes costas subcingit. 5. de anat. adm. 3.

Costæ, ossa pectoris sunt, quæ à collo toto, ad ilia usq; ex anteriore parte, ad utrumq; latūs protenduntur. lib. Introduct. cap. 10. & 3. de artic. 37. Duodecim ut plurimum numero sunt, ex quibus superiores septem simpliciter πλῆγεα dicuntur, quinq; verò reliquæ costæ inferiores, πόδα vocantur, h. e. spuria, & illegitima, quia imperfectæ sunt.

Coryle, κορίλλα. Vide Articululus, & Acetabulum.

Cory.

Coryledones, *νοτολα δόλες*. Vide Acetabulum.

Coxa, quæ & Ischion, magnum femoris ossis caput est. Græcè *ἰσχίον*, i.e. coxa appellatur, veluti cavitās ejus, acetabulum dicitur, 2. de fract. 70. Unde affectus sit, qui Ischia & Coxendix appellatur. Inde Ischiadici & coxartici, i.e. coxæ morbo laborantes. 7. de compos. med. per gen. cap. 16. Ischion aliquando significat, ligamentum ipsum, quo femur coxendicis acetabulo colligatur; interdū verò ipsum articulum; quin & Ischia *ἰσχία* dicuntur à quibusdam, partes carnosæ ex utroq; sacri ossis latere, (alias *ὀστέα* à Græcis, à Latinis clunes appellantur.) Os autem coxendicis, est apophysis ossis sacri, ad coxendicis acetabulum undiq; pertinens. Os enim sacrum, quā parte femoris caput ei inseritur, Ischion vocatum est.

Cranium, Calvā, Calvaria, *κεφάλιον*, est os capitis crassum, rarum, rotundum, ossibus septem compactum, suturisque, veris tribus, coronali, lambdoideā, & sagittali, distinctum, cerebrum continens, atq; utramq; meningem ambiens, sic dictum, quòd quasi *κεράν*, i.e. galea cerebri adiaceat. 8. de usu part. cap. 9.

Craſis, Græcè *κράσις*, & *κρίσις*, temperiem significat. 1. de natur. hum. 12.

Crassa membrana. Vide Membrana dura.

Crassa vena, i.e. humeralis. 1. de artic. 53.

Crassus pulſus. Vide Gracilis.

Crea. Vide Tibia.

Creber pulſus est, cujus, intermedia quietis est brevis tempus; rarus, cum longum. 4. de pulſ. ad Tyron. c. 4.

Cremasteres. Vide Testes.

Cremor, idem est ac chymus, *χυμός*, 3. de natur. facult. cap. 4.

Cremor prisanæ est, ubi à decoctione, quis prisanam colaverit, deinde cremorem, à decocti parte aquosā separaverit. 1. acutor. 26.

Cricoides cartilago, est laryngis cartilago, basim annuli figuram representantem efficiens; tribus enim cartilaginibus constat larynx, quarum prima maxima, cujus convexum extrā protuberans pomum Adami vocatur, concavum intus, quæ dimidium totius capacitatis laryngis comprehendit, ad formam scuti, unde hanc Anatomici Thyroidem, i.e. scutiformem, alii peltalem, quòd peltæ formam agat, nominant. Posterior, quæ basim Cricoidem, i.e. annuli figuram imitantem, efficit, postrema ipsius arteriæ cartilagini, literam *Σ* imitanti, incumbit, scutiformi verò in priori sui ipsius parte subjacet, (quæ & Cricoides, Cymbalaris, & Coopertoria dicitur.) Reliqua ab his cartilago, tum positione, tum magnitudine tertia, in suprema Cricoidis, quæ & Innominata dicitur) cartilaginis parte sita est, gutturniis, infundibulisq; quas Arytænes vocant, similis; unde & Arytænoïdes dicitur. Quæ autem à radice lingua exoritur, quam Epiglottida, quasi superligulam dixeris, non est bronchi propria. lib. de vocal. instr. diſſ. cap. 4. & 7. de usu part. cap. 11. & lib. de anat. vii.

Crimnoides urina, *κρίμνιδος*, cujus sedimenta crimnoidea sunt, i.e. talia, quæ speciem surſuris, vel spume referunt, significantq; sanguinis cremationem, si rubea sedimenta sunt; vel solidorum nimiam liquationē, si alba. lib. de urinis, cap. 29. Vide Hypostasis.

Crisis, sive Judicium, sive Judicatio, *κρίσις*, apud aliquos, est subita, in morbo, in melius pejúsve, ad vitam aut mortem, mutatio; apud alios est ea, quæ antecedit judicium,

cium, humorum agitatio; apud alios, integra totius morbi solutio; apud alios, illa tantum morbi solutio, quæ ad bonum fit. 1. de cris. cap. 1. Sed ea, quæ repente fit, per excellentiam Crisis dicitur, & à naturâ, ea, quæ præter naturam sunt, superante, perscitur. 3. de cris. cap. 1. Judicatio per morbos, de foro translatiâ appellatione, dicta est, significans, præcipitem in morbo mutationem, cum quadam evidenti evacuatione, vel abscessu; quæ quadrifariam existit: aut enim statim vindicantur à morbis, aut magnam obtinent in melius mutationem, aut statim moriuntur, aut multo deteriores evadunt. Itaque duas primas judicationes, absolute proximas duas autem magnâ ex parte cum adjunctione, vâla aut pravam judicationem, quandoque, verò, sine adjunctione, simpliciter sic vocat. 3. prognost. 1. Utitur item Hippoc. crisi pro λύσις, i.e. solutione morbi, ut, in progn. optimam eam dicit esse urinam, in qua per totum morbi curriculum, donec ipse judicatus sit, subsidet album, lave, & æquale. Tertia adhuc est ejusdem ὁρίσματος significatio, quâ significat crisis, motum vehementem naturæ pro cuiuslibet rei molestâ depulsione, secundum quam non modo morbi, sed & conceptiones, & abortiones, & partus, & omnino quæcunque magno conatu naturæ indigent, dicuntur judicari & per crisin solvi. lib. de sympt. par.

Crisis alima est, quæ à nullo dierum indicantium aut signo, in illis apparere solito, prædemonstrata fuerit & indicata, 3. de cris. 10. ubi huiusmodi crisis perhibetur. Periculosa, quæ cum gravibus symptomatibus accidit: Infida seu incerta, cum morbi recidiva contingit; Obscura, quæ citra excretionem, vel abscessum evidentem evenit: Absoluta crisis autem est, quæ in morbo nihil facit reliqui. 1. dier. decr. cap. 2.

Crisis

Crisis imperfecta, quæ non omnino à morbo liberat, 3. cris. 7. sed ex morbo quippiam relinquit. 1. dier. decr. cap. 2.

Crisima signa, i.e. discernentia & judicantia. 1. aph. 12.

Criche, i.e. Hordeum, sive Hordeolum sive Posthia, & oculorum tuberculum. de remed. par. sac. cap. 10. Vide Hordeolus, Posthia, Chalazia.

Crotaphite, ὑποπόρριον, i.e. temporales muscoli, qui maxillam inferiorem movent, & sursum trahunt. lib. de musc. diss. cap. 6. Vide Manducatorii.

Cruda urina. Vide Aquosa.

Crudititas, ἀσάρκων, est, cum ventriculus, vel proprio morbo, vel vitiosis humoribus in ipso accumulatus, vel pravam alimentorum ob qualitatem, ut nidorosa, acidam, fetori, aut putredini, aut corruptioni obnoxiam, aut ex preparationis modo, ad huiusmodi aliquam dispositionem deducta, cibos non amplectitur, sed in ipso corrumpi eosdem finit. Differt ab Incoctione, quæ est rerum, quæ non possunt concoqui, ut acinorum, & omnium, quæ omnino integra, & omnino non mutata dejiciuntur. 1. de loc. aff. cap. 3.

Crudus humor, ἀσάρκων, est, cum alimentum, suam naturam, in ventriculo, hepate & intestinis quam diutissime servat, nullâ alteratione, ex particulâ, quæ ad ipsum concoquendum est destinata, susceptâ; vel, cum transmutatio fit, sed in peregrinam qualitatem. 8. de compos. med. loc. cap. 6. Humor crudus, pituita crassior est, ac minus flatulenta, qualis in urinis subsidet, iis præsertim, quæ ex edacitate sedimen multum, sabaceæ pulcritudinis simile, obtinent: quin & corporibus iis, quæ ab exercitatione abstinuere, cibis verò quàm plurimis, ac balneis post sumptos cibos utebantur, sæpe ejusmodi humor confertim per alvum descendit, sed & unâ cum hoc humore, perindè

ac

ac cum pituitâ, decolor quâdam in toto corpore subest albedo, qui crudus humor inappetentes homines efficit. lib. de multitud. cap. 11.

Crura, Græcis à currendo, (quod crurum ministerio curramus), aut à Græco verbo κέρω, quod inter ingredientium hunc atq; illuc ferant, Græcis κρέω & κέρω dicuntur extremæ corporis partes, quæ thoracem medium, & inum ventrem prætergrediuntur: ut, quicquid prominet ultra os sacrum, & carnosos musculos ibi subiectos inferne, usque ad pedes, id crura dicantur. Dividit hæc Galenus in partes tres, eis κνήμιν τε, καὶ νύχτεον, καὶ πόδα. Κνήμιν etiam dicuntur tibia in rota, à similitudine tibia in animalibus. lib. Introd. cap. 10.

Cryforchis, κρυφορχίς, i.e. testiculi, aut testiculorum occultatio, vel recessio. lib. finit. med.

CrySTALLINUS humor, κρυσταλλίνος ὕγρον, & Crystalloidis, (qui glacialis adhuc dicitur, quod concretam glaciem imitetur, 7. de placit. cap. 5.) est humor albus, splendidus, lucidus, non omnino rotundus, sed aliquantulum planus, in medio oculorum situs, primum depressus & videndi instrumentum, qui per διαδοσιν, i.e. transsumptionem (non per venam quidem, quæ nulla inest) vitreo humore nutritur. Cui adheret vitreus oculi humor, qui & Hyeloides dicitur, quiq; quantò crassior & albior est sanguine, tantò à crystallino humore, humiditate, atq; albedine superatur: subest huic Albugineus, albo ovi similis, quem Hydatroidem, quod aquæ sit similis, vocant. 10. de usu part. cap. 1. lib. de ocul. cap. 2. & Introd. cap. 11.

Citræ, muliebris pudendi sinus, pilis decoratus, appellatur: quæ sinum ambiunt, ἀγρυγία, i.e. alæ vocantur. 15. de usu part. c. 3.

Cubi-

Cubitus, (κύβων, κύβος, ὀλέκων, πῆχυς, ὀλέκων) est os, quod inter Humerum, & Carpum, quod brachiale dicitur, situm est; ejusdemq; partis os grandius. Cubitus item dicitur, qui alteri subest osi, quod Radium nominant, lib. de osib. cap. 17. quem cubitum Pechyn, i.e. ulnam dicunt, 2. de usu part. 2. Clarius: Cubitus, Pechys, πῆχυς, seu ulna, Arabibus facile majus, est ea pars totius brachii, quæ superne terminatur, quâ brachio quidem continua est, per articulum, qui in curvatura cubiti est, cui innititur; inferne autem, quâ Carpo, manus extrema conjungitur, quo in spatio duo ossa recipiuntur: alterum magnum, & rotundum, nominatum eodem nomine, quo pars, i.e. cubitus; alterum, quod Cerchis, Arabibus facile minus, i.e. Radius appellatur. 2. de motu muscul. cap. 2. & 1. de fract. 18.

Cubiforme os, quod κυβοειδὲς ὄστρον dicitur, est os, quod ab externis pedis partibus, firmum in terra statuitur, externisq; tarso partibus est locatum; & articulatur cavitati calcanei, ad sinem adjacenti. 3. de usu part. 7. Est enim os unum, ex quatuor tarso ossibus, solum nomine donatum, cum reliqua tria careant nominibus; est autem os, ut reliqua tarso ossa, intus cavum, foris gibbum, cubo simile, quod latera sex habeat cubo communia.

Cuculus. Vide Coccyx.

Cucurbitulæ leves, quæ citra scarificationem adaptantur. 3. loc. aff. cap. 4.

Cunei os, sive cuneiforme, quod & ὀστὴν σφαιροειδὲς, os basilare, & os palati appellant, medium inter superiora, & inferiora totius capitis ossa. lib. de osib. cap. 1.

Cunnus, τὸ γυναικῶν, pudendum muliebre, naturâ inter ossa pubis extrinsecus locata, uterini colli capacitatis

est pelliculam quandam habens, virorum præputio correspondentem. lib. de vulva. disc. c. 2.

Curatoria, Θεραπευτική, Medicina pars est, quæ tunc factum morbum tollit, tunc fieri occurrit, tunc eum, qui imminet, aut futurus timetur, amolitur, præcavet & impendit. (quod est proprium θεραπευτικῆς.) Therapeutices autem tres sunt partes ad curationem necessariae, διαγνωτική, θεραπευτική, & προνοητική, quarum prima victus rationem instituit, altera medicamenta propinat, postrema manu adjutricem admoveat. de part. art. med. cap. 1.

Curta, νοζολόμαστα, i.e. mutila & curta. Id autem dicitur à Grecis Coloboma, quod in labiis, aut narium albis, aut aure deficit: hujus generis sunt, & quas in majore angulo Rhœadas vocant, eo utiq; vel impensius extenuato, minoreve facto, vel prorsus abolito. Vide Colobomata.

Cuticula. Vide Cutis suprema,

Cuticularis membrana. Vide Membrana dura.

Cuticulosus musculus est, qui extrema sedis ora cuti commixtus, obrinet, ut vel cuticulosus musculus, vel carnosus cutis dici possit. lib. de musc. disc. c. 30.

Cutis suprema, Δερμὶς, & Δέρμα, quæ & Derma dicitur, quasi Corium dixeris, quia excoriari potest, cujus exterior pars, Epidermis sive summa cutis corporis, sive Cuticula est, & toti superextensa, sensuq; destituta, aut certe hoc perquam obtruso polles, quippe quæ sæpe citra dolorem facile ab ea separatur. 2. de usu part. cap. 6. & 3. meth. 4.

Cyboides. Vide Cubiforme.

Cyclifcus, sunt cava excisoria scalpra. 6. meth. 6.

Cyllum, κύλλω, dicitur apud Hippoc. cruris varum, i.e. in exteriorem partem luxatum, vel conversum, adeo ut

si

sæpe processus, qui talem exterius complectitur, sine ullo stabilimento suspensus relinquatur; quamvis propriè mutillum, & imperfectum significet, ut scribit Gal. 3. de dieb. critic. ubi in ea significatione mensem κύλλω appellari inquit, qui diebus viginti novem constet, alios autem perfectos, qui triginta. Unde Cyllolim, κύλλωσις, distortionem cruris in exteriorem partem vocat Gal. 4. de artic. Idem tamen com. 3. dicit, nonnullos, de omni longorum membrorum distortionem κύλλωσις intelligendam censere, generaleq; ei tribuere significatum; alios verd eo nomine distortionem solum intelligere, in qua, in interiorem partem, membrum inclinatur.

Cyema, κύημα, factus est, cum nondum menses duos in utero absolverit, quo tempore Embryon dici nequit, sed Cyema, i.e. uteri gestatio, & conceptus, & genitura. 1. de sympr. caus. cap. 7.

Cymbalaris. Vide Cricoides.

Cynanche, est inflammatio extra guttur existens, quæ & Paracynanche dicitur; si autem sit inflammatio faucibus adjacentium musculorum, dicitur Synanche, vel Parafynanche. 4. aph. 34. Propriè loquendo, Angina Græcis est inflammatio, quæ in gutture & faucium partibus & musculus externis internisq; advenit; Hippocrates verd & alii Veteres, omnes passionēs, in his locis advenientes, quas spirandi difficultas comitatur, Anginæ nomine vocant, nullo existente in pectore vel pulmone vitio; quæ in re differt Angina à Peripneumonia & laterali morbo, ex eo, quod angustia sensus in gutture est, cunctis in angina speciebus: suntq; ejusdem (exquisitè loquendo) quatuor differentie: una, ubi fauces inflammantur, altera, ubi neq; reliquæ oris partes, neq; etiam externarum par-

tium nulla inflammata videtur, ager tamen suffocationis periculum in gutture persentit; tertia, quando gutturis partes, tum externa, tum interna similiter inflammantur; quarta, ubi ad anteriorem regionem, cervicis vertebra luxantur, & inde carus apparet locus, doloremq, quando tangitur, ager sentit. Recentiores Græci quidam, ut est Paulus lib. 3. cap. 27. & nostra ætatis Medici non pauci, inter Cynanchen, & Synanchen, inter Paracynanchen, & Parafynanchen discrimen faciunt, quod tamen Galenus lib. 4. de loc. aff. cap. 5. & 3. progn. 20. reprehendit. Inflammationem itaq, quæ in interioribus faucium musculus oritur, $\Sigma\omega\acute{\alpha}\chi\chi\lambda\upsilon$ nominant, eam verò, quæ in exterioribus eorundem musculis fit, $\Pi\alpha\rho\alpha\sigma\omega\acute{\alpha}\chi\chi\lambda\upsilon$: Inflammationem item, quæ in interioribus musculis gutturis accidit, vocant $\text{Κω}\acute{\alpha}\chi\chi\lambda\upsilon$; eam autem, quæ in exterioribus ejusdem musculis oritur, $\Pi\alpha\rho\alpha\sigma\omega\acute{\alpha}\chi\chi\lambda\upsilon$. Vide Angina.

Cynodontes. Vide Canini dentes.

Cyphosis, $\nu\acute{\upsilon}\phi\omega\sigma\iota\varsigma$, gibbositas seu gibborositas, vitium spinæ est, quod à casu, ictu, & tuberculis crudis & duris, anteriorem thoracis partem distendentibus, pulmonemq, prementibus, aliquando contingit, ut docet Gal. eo aph. quo scribit Hipp., gibbos ex asthmate, aut tussi factos, ante pubertatem mori. Vide Gibborositas. Dicitur eadem $\nu\acute{\upsilon}\phi\omega\sigma\iota\varsigma$, ut annotavit Gal. 8. de artic. Opposita huic Contorsio, dicitur Lordosis, $\lambda\omicron\rho\delta\omega\sigma\iota\varsigma$, spina vertebris in anteriorem partem conversis. Vide Lordosis.

Cyrtoma, $\nu\acute{\upsilon}\gamma\tau\omega\mu\alpha$, tuberculum in iliis appellavit Hippocr. quod & œdema ab eodem appellari solet. 2. progn. 25.

Cyrtosis. Vide Cyphosis.

Cyffaros, $\nu\acute{\upsilon}\sigma\alpha\rho\text{Ⓢ}$, est ultimum intestinum in ordine, quod

quod & rectum dicitur, & podex est. lib. Quod animal sit, id, quod in utero. cap. 5. Vide Rectum.

Cystis, $\nu\acute{\upsilon}\varsigma\iota\varsigma$, $\beta\epsilon\gamma\omicron\delta\acute{\alpha}\chi\text{Ⓢ}$, vesica, est pars membranosa, urinam à renibus excipiens, & foras excernens, exanguis, nervosa omnino, latissime distendi, & artissime contrahi idonea, ut reliqua omnia alba, & exanguia, nervi insignibus instructa: in quam, renes, tanquam in lagenam, urinam deponunt per meatus, ureteres dictos, qui à renibus prodeuntes, obliquo itinere delati, inter ipsius binas tunicas, paulò supra ipsius os, inseruntur; cujus vesicæ cervicem musculus ambit, transversis constans fibris, quibus undequaque constrictis, vesicam claudit, ne urina effluat.

Cystis choledochos, quæ & vesica fellis, & vesica bilis susceptiva, Græcis autem $\nu\acute{\upsilon}\varsigma\iota\varsigma$ $\chi\omicron\lambda\omicron\delta\acute{\alpha}\chi\text{Ⓢ}$ & dicitur, vesica est, in cavâ ipsius jecinoris parte sita, inter venæ portæ & cavæ radices, bilem ex jecinore attrahens, quam rectis fibris trahit ex hepate, obliquis retinet, transversis verò expellit, quæ & ob id fellis folliculus appellatur. 4. de usu part. cap. 12. & 2. de natural. fac. cap. 9. & 9. de anatom. adm. cap. 2.

D

Dactylion, $\pi\epsilon\gamma\omega\tau\iota\varsigma$ $\nu\acute{\upsilon}\delta\iota$ η $\epsilon\delta\epsilon\alpha$, i. e. podex. 1. de compos. med. loc. cap. 15. Sunt quoq, qui rectum intestinum eo nomine intelligant.

Darlis, i. e. excoriatio, quâ, cutis, à subjectis partibus scalpello deciditur & separatur. 3. de anat. adm. cap. 2.

Dartos, una est è quatuor membranis, quæ testes involvunt: earum prima & intima Epididymis; post eam Erythroides, i. e. vaginalis; tertia Dartos, carnosâ, Erythroide multò valentior & crassior; quarta & extrema Scrotum est. Introd. cap. 11. Mulierum autem testes, peni-

tius in vulva latentes, unicâ tantum tunicâ contenti sunt, quæ Dorta appellatur, proportionem respondens tertii testium virilium tunica, cæteris autem recensitis carent. de dissect. vulvæ, cap. 9.

Dasympma, oculi vitium, idem quod Trachoma, ut scribit Aërius lib. 7.

Dearticulatio, ea est ossium naturalis conjunctio, cujus ratione copulata ossa evidentem motum habent: & e contra Synarthrosis, coarticulatio, naturalis ossium est commissio, quæ exiguum & obscurum aliquando, aliquando nullum motum præ se ferunt, & edunt. 2. de artic. 8. & 1. de artic. 1.

Declinatio est illa paroxysmi pars, quæ statum ipsum subsequitur, usque ad secundæ accessionis principium. 1. de crisi. 3. Vide Principium.

Decrescens febris. Vide Continua.

Decretorius, sive Judicatorius dies est, in quem ut plurimum morborum judicii tempus incidit. 1. de dieb. decret. cap. 3. Est adhuc alius dies Judicatorius incidens, sive intercalaris, in quo imperfectæ solent fieri judicationes, ut dies tertia, quinta, sexta, nona. 3. progn. 1. Decretoria autem signa sunt, quæ salutem ægri, per crism futuram ostendunt. 1. de crisi. 7. Incidentes verò, sive Intercidentes dies differunt à Judicatoriis, & decretoriis, cum naturâ, tum usu. Naturâ quidem, quod nature sua ratione, Judicatorii perfecti sunt, (omnibus siquidem ritè factis, solâ naturâ spontè agente, in iis crises fiunt) ac numero quaternario, & septenario dividuntur; Intercidentes autem minùs perfecti sunt, & in eos, non nisi aliquo errore interveniente, crises incidunt: unde non vi naturæ, sed morbi malitiâ, aut aliquo extrâ-

neo

neo impellente, in iis crisis accidit. Atq; hinc est, ut à nonnullis dies provocatorii nominentur, quod in his natura, ad pugnam irritata, insurgat. Ussu adhuc differunt dies Judicatorii & Intercidentes, quod ad futuri vigoris & judicii cognitionem, quaternariorum circuitus sufficiunt; ad crism verò jam factam discernendam, num scilicet fida, aut infida sit, intercidentium cognitio conducit.

Deficiens pulsus est, qui admoventi digito, videtur exolutus, & applicatos paulatim tenenti, prorsus desinit. 2. de caus. puls. cap. 3.

Deficiens, decurtatus, *μὲν ὁ σφύζων*, pulsus, qui & mutilus, & decrescens pulsus dicitur, est, qui perpetuò diminuitur, nec minui desistit, ad quietem denique omnimodam venit, prorsusq; deficit. Qui pulsus, si iterum redit, & de integro augetur, decurtatus reciprocus dicitur. 1. de differ. puls. cap. 11. Quod si in eo nulla servetur æqualitas, motusq; ipso frequenter deficiat, deficiens inæqualis appellatur. 2. de caus. puls. c. 12. Nomen autem Græci, à figuris, quæ in acutum desinunt, & à cauda transulerunt. Hujusmodi autem Pulsuum inæqualitas, systematica, sive collectiva dicitur.

Deglutitio, *ἀναποσία*, est cibi, & potus, ab ore in ventriculum per œsophagum descensus, larynge simul in tantum sublatâ, quantum gula deorsum trahitur, factus vi ventriculi tractoria.

Dejectiones, & Subductiones solet Hippoc. vocare excrementa per alvum exeuntia. 7. aph. 64. Syncera autem dejectio est, quæ unum tantum humorem, cæteris impermistum habet. 2. prorrh. 15. Ut dejectio biliosa, solam bilem flavam egerit.

Deleterium, quod & Phtharticum, & Phthoræpæum dicitur, lethale venenum est, quod ubi in animalis corpus ingressum fuerit, totum id momento temporis immutat, sibiq; simili affectione alterat, penitusq; enecat. i. de sem. cap. 16. Tamen si verò alexipharmacum medicamentum ultra modum exhibitum nos quoq; interficiat, moderatâq; in dosi assumptum sanet, non tamē ob id deleterium censendum est. Propriissimè enim deleterium est, quod, quocunq; tempore, loco & quantitate (quantumvis in minimâ) sumptum, aptum est interficere. com. 6. in 6. de morb. vulg. 5.

Delirium, Desipientia, *παράφροσύνη*, mentis alienatio, duobus modis dicitur, generaliter & speciatim: generaliter, est motus errans & depravatus facultatis animalis principis imaginatricis, aut ratiocinatricis; plerumq; in utraq; facultate consistit delirium, quatenus delirantes tum parum probe imaginando, tum parum aptè ratiocinando hallucinantur; aliquando verò in altera tantum facultate, ut exemplo illustrat Gal. lib. de sympt. diff. cap. 3. atq; tum maximè sine febre est, i. prorrh. 1. & 4. Insanire omnes dicunt eos, qui citra febrē desipiunt; & subdit, omnes, qui mente læsi, continuè febricitant. Phrenitici vocantur, solâ febre ab iis, qui deliri appellantur, discrepantes. Speciatim verò significat *παράφροσύνη* mentis alienationem cum febre; à Phrenitide verò differens, quòd hæc fiat, cerebro primario affectu laborante, cum symptomatum magnitudine & vehementia. Delirium autem ejusdem febris symptoma est, atq; ex subjectis cerebro partibus affectis, imprimis verò ex inflammato Diaphragmate, originem ducit, sublato in caput acri & ferventi biliosi sanguinis vapore; neq; impetus tantos habet, quantos Phreni-

Phrenitis. 5. loc. aff. 4. Vide Phrenitis, & Paraphrosyne. Deltoides, quasi litera Δ figuram imitans, musculus est, qui superiorem humeri partem, quâ brachii caput est, tegit, qui etiam totius manus initium est. 3. de anat. adm. 6. 3. Græcè Δειτοειδής sic dicitur, quòd triangularis videatur, & ad literæ Δ similitudinem efformatus.

Denervationes, (*ἀπονεύσεις* Græci vocant) sunt nervæ musculorum extremitates, in quas muscoli destinant, & Tendones dicuntur. i. de motu musc. cap. 1. & i. de anat. adm. cap. 3. Vide Tendones.

Dentem, sæpè Hippoc. secundam colli vertebram vocat: propterea hunc processum à dentis similitudine, Odontoidem, i. e. dentiformem appellat, lib. de oss. cap. 8. Alii Pyrinoidem, productionem, à nuclei similitudine nominant, 12. de usu part. cap. 7.

Dentes, in ossium numero reponuntur, mollium cerebri nervorum participes, & ob id soli dentes, ex toto ossium genere, sentiendi vim habent evidentem, lib. de oss. cap. 5. Priores quaterni, quia secant & cibos incidunt, Tomi, i. e. incisorii ad cultri cibos incidentis similitudinem dicti, molliem in se habent: huc utring; canini adjacent, quòd canum dentibus sint quàm similimi, ad dura cibaria non secanda, sed admodum cōsringenda. Ultra hos mammillares & molares, ab utroq; latere, quòd iis cibi (veluti molis, cereales fruges) attenuantur, & continentur. Ibid.

Dentes genuini, qui omnium novissimi nascuntur, *σωφρονιστές*, ut plurimum ab anno duodevigesimo, usq; ad annum vigesimum-sextum: visi aliquando sunt etiam anno octogesimo nasci, utrobq; singulares, in penitissima oris parte oriuntur; ideoq; ita nominantur, quòd nascan-

rur, cum homo sapere incipit; sunt autem è genere dentium molarium.

Dentifricium, medicamentum est, quo utimur ad dentes confricandos, à sordibus abluendos, quin & gingivarum circumsitaram, quando humore fuerint pręgnantes, ad depurationem & abstersionem. 5. de loc. aff.

Dentitio, *οδοντιος*, est dentis jam concreti, extris gingivam, eruptio, & protrusio. 8. de placit. c. 6.

Depascens ulcus, idem est ac *Phagedæna*. Vide *Herpes*, *Phagedæna*.

Derivationem, appellare consuevit Hippoc., quando succus aliquis evacuationis indigus, neq; per convenientem regionem ferri incipiens, artis auxilio vacuatur per loca proxima. E. G. Si per lotii vias exire ceperit, vitiatâ vesicâ, aut renibus, tunc per alvum derivare satius fuerit; veluti si per ventrem vitiatâ intestinis ferri tentaverit, succum evacuandum, ad urinarios meatus dirigamus. In mulieribus verò, nonnunquam ad uterum, aut è contrario, interdum uteri profluvium, ad urinâ vias, ac ventrem derivabimus. At, si in aliquâ id genus evacuatione vomitum cõcitaverimus, revulsionem hanc nominant; ut, si vomitus etiam retraxerimus, ad uterum, aut vesicam, aut sedem. com. 2. in 6. de morb. vulg. 7. *Derivatio*, *Γρασις παροξέσσεις*, ejusdem est generis cum evacuatione, facta per particulam, quæ fluxionem suscipit; sit autem per aliquam vicinarum partium. Rivare igitur est, per rivos ducere; derivare autem est, à rivis ad latera divertere. Ex *Oriba*, lib. de Cucurbitulis. Vide *Purgatio*.

Derma. Vide *Cutis* suprema.

Desipientia est, cum agri nihil rationi consentaneum dicunt, agunt, & loquuntur. 7. aph. 14.

Desipien-

Desipientia ferina est, in qua agri calcitrant pedibus ferunt, obvios mordicus impetunt, & excandescunt eos, qui ingrediuntur, capitales suos hostes reputantes. com. 1. in 1. prorrh. 25.

Desiccatio oculi, est idem ac *spasmus oculi*. lib. de ocul. c. 13.

Desperata ulcera sunt, quorum curationem pleriq; aggressi, non absolverunt, sed tanquam ab insanabilibus desistere. 4. de compos. med. per gen. cap. 5.

Destillatio, est qualibet fluxio, quæ per venas, à capite, ad partes inferiores fertur. 3. aph. 12.

Desudatio, ab Hipp. sumitur vel pro sudore, circa thoracem & caput apparente, vel pro eo, qui ex toto manat corpore, ubi rum paucus, tum nihil conferens, fuerit. com. 3. in 1. prorrh. 33. Dicuntur etiam *Sudamina*. Vide *Sudamen*.

Detritio. Vide *Rhacosis*.

Deurens febris. Vide *Continua*, & *Synocha*.

Diabetes, est urina profluvium, hydrops matella, hydrops ad matulam, *Dipsacos*, hydrops in vas urinale, *Diarrhæa* in urina, *διαβήτης*, *υδρῶς* & *εἰς αὐτὴν*, *εἰς ὅρα* & *διαπύονα*, & *ἄλγος*: synonyma sunt, quæ significant, cum confestim, continuo & exsuperanter per urinam redditur id, quod bibit, nihil planè immutatum. 6. de loc. aff. c. 3. & de sympt. diff. c. 6. Passio hæc talis est, qualis circa alvum levitas intestinorū, & bulimos, extinctio, ut diceret quispiam, utriusq; virtutis, & retentricis, & alteratricis. 1. de cris. 12.

Diabocanum, emplastrum est, quod ex herbis factum. 6. de compos. med. per gen. cap. 2.

Diabrosis, sive *Anabrosis*, *διαβρωσις*, ἢ *ἀναβρωσις*, erosio, est alicujus vasis erosio, 5. loc. aff. 5. à re acri & mordaci

daci facta, sive intrinsecus à vitioso succo, sive extrinsecus à valentioribus medicamentis, aut igne.

Diachylon, *Διαχυλον*, emplastrum, quod ex succis est compositum, emolliens, concoquens. 7. de compos. med. per gen. cap. 9.

Diacodion, confectio est ex capitibus papaveris. 7. de compos. med. loc. 2.

Diadosis, *Διάδοσις*, digestio seu distributio alimenti est, cum sanguis alimentarius, ex jecinore, per venas majores, in minimas, ipsumque in corporis habitum transit. Vide Anadosis.

Diæta, i.e. victus ratio, est certa victus institutio & norma, non in solo cibo & porione consistens, verum in omnibus aliis sex rebus externis non-naturalibus, ut otio, exercitatione, Venere, somno, vigiliis, repletionem, inanitionem, animi affectibus. Gal. lib. ad Thrasib. cap. 35. Indè disciplina, quæ hanc instituit, Diæterica, *Διατερικὴ* dicta, est pars artis Medicinæ curative, quæ agris ad præsentem morbos profligandos debetur. 11. meth. c. 15.

Diagnostica signa, sunt præsentium rerum, causarum morbidarum, & morborum declarativa. lib. de opt. sec. emp. cap. 5. Vide Prognostica.

Dialemma, est illud intervallum, quo febris ad infectionem venit, antequam sequens annotatio adveniat. lib. de morb. temp. cap. 3.

Diapedesis, *Διαπείσιν*, est exiguorum vasorum apertio, aut potius eorundem tunica extenuatio, adeoque, seri sanguinis excretio, per tunicas extenuatas. 3. de caus. sympt. cap. 2. Fit ergo ex tunica rarefacta, sanguine vero tenuato, & ex gracilium vasorum ore adaperto; unde transcolatur sanguis, & sudoris, aut roris more transmittitur. 5. meth.

5. meth. c. 2. Differt ab Anastomosi, in hac siquidem cum majorum venarum, arteriarumque ora aperiuntur, cum sanguis impetu, & copia ex iisdem apertis erumpit.

Diaphanes Græcè, Latine dicitur Lapis specularis, ex iis est, quæ leniter, ac sine morfu exsiccant, qui ustus, ulceribus ægrè cicatricem admittentibus, non item malignis, ac rebellibus, conducit. 4. de compos. med. per gen. cap. 1.

Diaphoresis, *Διαπόρσις*, Latine digestionem, seu evaporationem dixeris, est, quæ humorem, qui in phlegmone obsessâ inflammatae parte continetur, sub specie halitus per meatus insensibiles, educit: 13. meth. cap. 16. & medicamenta, quæ id præstant, *Διαπορητικά*, h.e. discussoria, & per halitum digerentia appellantur, duplici ratione, aut humores ebibentia, velut & per cutis meatus exugentia, cum poris quibusdam insunt, aut totam alterantia partem. 5. de simpl. med. facult. c. 5.

Diaphrattontes membranæ, *Διαφραττοντὲς μεμβράναι*, dicuntur membrana illæ, quæ totum thoracis spacium, à jugulo ad septum usque, in duos sinus, dextrum, sinistrumque dividunt; vulgò Mediastinum vocatur. Vide Hypezochores, Cingentes.

Diaphragma, septum transversum est, quod & Phrenas, i.e. mentem appellarunt Antiqui; quia (ut aliqui putant) eo inflammatione affecto, mens ladatur: nam multi quidem, varios ob morbos, delirare solent; sed quæ diaphragmate p.n. affecto incidunt deliria, non multum distant à Phrenitide: nulla enim pars, cerebro subdita, præter septum transversum, perpetuum delirium excitat; itaque maximè illi videtur esse cum mente & hujus sedes (cerebro) consensus. A Platone Diaphragma vocari cæpit, i.e. septum transversum; est enim musculus rotundus.

rotundus, obliquus, membranofus, & carnosus, medius inter partes nutritioni servientes, (quas peritonaeum continet) & inter spiritus organa, (quae tunica succingente concluduntur: eamq; ob rem diaphragma nominatur, quod eas partes διαφράγμα, i.e. dividat septum veluti mediū: quā ratione Aristoteles id ipsum succincturam appellat, 5. de loc. aff. 4. Majores nostri præcordia nominarunt, com. 1. in 1. progn. 24.

Diaphthora, est corruptio ciborum in ventriculo. 2. de loc. affect. 1.

Diapyemata. Vide Empyemata.

Diaria febris, ἐφύμετος & πνεύσας, Ephemera febris est, quae unica accessione, unoq; ut plurimum die naturali, à sola ferè natura curatur, à causa manifesta (ut, ex ira, insolatione, luctu, pugna) orta. 9. meth. 1. ait: Febrem in spiritibus accensam excitant causae, aliis febribus communes, (præter spirationem & putredinem) ira, dolor, vigilia, cura, æstivus Sol, fatigatio, bubo pertinax, studium, cruditas.

Diarrhoea, διαρροία, i.e. profluvium, copiosior est alvi fluor, sine phlegmone & ulceratione intestinorum. lib. finit. med. Per diarrhoeam vel pituita, vel bilis altera, sincera, aut invicem mista vacuatur, ab humoris copia, vel cruditate, quae aut in toto corpore, aut in certā quādam parte sedem habet, exorta: ventriculus enim multitudine gravatus, quam vel ipse colligit, vel ex aliis sese in eum exonerantibus suscipit, aut pravā aliquā qualitate irritatus, quam cruditas (quae propriè διαρροία dicitur) invexit, τῇ διαρροίᾳ infestatur, praesertim si ejus orificium, supernaq; partes valentes sint, infernae autem languidae; nam si contra acciderit, vomitiones, pro diarrhoea succedent, ut docet Gal. 3. de natur. facult.

Diarrhoea

Diarrhoea in urina. Vide Diabetes.

Diarthrosis. Vide Articulus.

Diaspermaton medicamentum est, quod ex semini- bus constat. 7. de compos. med. per gen. 7.

Dialpoleticum medicamentum est, cujus compositionem, cuminum, piper, ruta, ingrediuntur. 4. de sanit. tuend. cap. 5.

Diastrale, est motus dilatationis, & elevationis arteriae, ad substantiam quandam exterius attrahendam, cum primis aëream, quo nativus totius animalis calor, per immis- sum spiritum refrigeretur; quemadmodum Systole, est ar- teriae submissio & contractio, ut id, quod ex humorum deustione in toto animali contractum, veluti fumida su- perfluitas est, expellatur. lib. de usu pulsuum, cap. 3. Et proin eundem praestat Arteriarum Diastrale, & Systole, to- tius animalis calori, quem Inspiratio, & Exspiratio, parti- culatim calori Cordis. Ibid.

Diastraron, emplastrum, quod ex quatuor rebus con- stat, Chalcitide, Misy, Diphryge, Chalcantibi. 5. de compos. med. per gen. cap. 14. Διαστράρον Græcè.

Diatrionpipereon, i.e. medicamentum, triplici pipe- ris genere constans. 4. de sanit. tuend. cap. 5.

Diatriton, i.e. tridui inedia: ut Diatritarii, qui tri- duanam inediam præcipiunt, 4. meth. cap. 4. cujus primus autor Thessalus. Διατρίτων Græcè.

Dichophyia, pilorum defectus est, quando bifurcan- tur. lib. finit. med.

Dichroma, (διχρωον Græcè) emplastra sunt, quae & Gilva dicuntur, coloris ambigui, 2. de compos. med. per gen. cap. 1. Sunt enim quadam medicamenta, quae fulva vocant, quibus ubi statim reponuntur, quadam extrinse- cūs

cus eminentia fusca supernascitur, sub qua pars medicamentum profundior, plus quam ab initio fulva videtur, propterea dichroma vocant, i.e. bicolora; quidam vero eadem vocant Diprosopa, διπρόσωπα, i.e. bifacia. 2. ad Glauco. 8.

Dicrotus pulsus, διπρότος & σφύζων, i.e. bis feriens, est, cum in diastole, quæ sit quasi recessio, arteriæ, non perfectè obitur, sed cunctatur, idq; pro subductionis, aut inhibiti spiritus quantitate, deinde repetitio perfectæ, debita sit contractionis. lib. finit. med. Estq; unus pulsus; non duo, (contra Archigenem) qui simul atq; omnem distentionem efficit, se paulisper suaducit, ac mox pulsat iterum, ut intermittentium quies media, ictus intercipiat, cujus dicroti contractio, congressus, vel reditus dicitur, 1. de differ. puls. 6. 17. qui post absolutam diastolen, antequam perfectè contrahatur, secundò ictum ferit, ut ex malleis incudem percutientibus, & postea resilientibus, apparet.

Didymoi, διδυμοί, 1. de usu part. cap. 14. dicuntur propriè fratres uno partu editi; dicuntur & testes, honestiore vocabulo, ut ait Galenus. Dicuntur & διδυμοί in Cerebro, de quibus vide Glutia.

Dies, apud Medicos non solum lucem, sed etiam noctem complectitur; non id tempus tantum, quo Sol supra terram fertur, appellantes diem, sed etiam illi tempora noctis adjacentia. 2. de cris. cap. 2.

Difficultas intestinorum, quæ δυσπρόσια dicitur, 2. de facult. nat. cap. 9. propriè ulcus intestinorum est, ex mordaci bile flavâ, atrâ, & pituitâ salsâ, quam sequitur interaneorum abrasio, cum quibus paulum cruoris immixtis cum torminibus secernitur. 6. de loc. aff. cap. 2. In quibus difficultatibus intestinorum, cum adhuc incipiunt, quadam

quadam corpora pingua excernuntur; post hæc autem, nisi finiri anticipaverint, quadam ramenta intestinorum, (ablatâ ipsarum superficie interiore, quæ membranosa existit & densa, illi, quæ cutem exterius contigit, Epidermidi, i.e. cuticulâ appellatâ, proportionalis:) post hæc autem (dysenteria videlicet jam completâ) aliquid ex ipsa abraditur substantia intestinorum; excernuntur enim partes magna intestinorum, quas & carnes, & carunculas vocare possumus. 4. aph. 26. Talis quippè propriè dicta Dysenteria est, nomen habens à læsa particula, quam solam pleriq; Dysenteriam nominandam censent: erit Hipp. atque alii, non ipsam modò intestinorum exulcerationem, verum omnem cruoris per intestina vacuationem, Dysenteriam cruentam nominent; nomen morbi, symptomati tribuentes. 4. de art. 40.

Difficultas urinæ. Vide Ischuria.

Diffusio, & Diffusus, & Perflatus, ea, quam Medici sensum latentem transpirationem appellant, quâ diffantur corpora vaporosa, & humida, in vapores resoluta, alia est vaporum, alia autem, qualis aer siccus, atq; talis, cum quæ videri possunt, exeunt humiditates. Adversus Lycum, cap. 2. quæ Græcis λόγος θεωρητός διαπνοῦς & ἀδνα & ἀδνα δισα διαπνοῦς, h.e. perspiratio, & diffusio, qui ratione comprehenditur, & transpiratio sensu imperceptibilis appellatur, quæ calidioribus temporibus, regionibus, etatibus, naturis, diætiis communis & familiaris est, non parvâ substantia nostra portione, per διαπνοὴν exhalante, & contrâ in frigidioribus, paucâ, propter cutis adstrictionem. Vide Inspiratio.

Digiti, δάκτυλοι, quinq; sunt in omni manu. Primus, Pollex, quod oppositus ceteris quatuor digitis, hæc equi-

polleat, proin *αὐτῆς*, h.e. promanum, tanquam pro rota manu esset, vocarunt. Hippoc. *μέγαν*, h.e. magnum nominat, quamvis parvus sit, quia ceteri sine eo ferè inutiles sunt, apud Arist. 4. de part. animal. cap. 10. Magnus Galeno dicitur, non solum viribus, sed & magnitudine; nam principium pollicis, ut ait, prope radium est, aded ut eum ferè attingat. Celso, & Aristoteli, viribus tantum magnus dicitur. Secundus, *ἄναξ*, Index. Tertius, *μέσος*, Medius. Quartus, *καταπύκνωτος*, annularis, Medicus à Medicis appellatur. Quintus, *μικρός*, minimus, auricularis, omnibus aliis corpore & viribus inferior. Singuli terna ossa continent (prater pollicem) mutuo sibi colligata, & ordine sibi succedentia, veluti in acie; unde & *παλαιοὶ* à Græcis appellantur; ab aliis autem *συντάξις*, à turmâ equitū, quam Græci *συντάξις* vocant. Latini, communi vocabulo, digitorum internodia dicere solent.

Dignotio, est presentis morbi, hujus sedis item & causa effectricis conjuncta cognitio. Græcis *ῥήσις* dicta. Præcognitio verò, est futuri morbi cognitio. 3. de crif. c. 1. & 1. progn. 5.

Diniotio. Vide Prolapsiones.

Diplosas. Vide Diabete.

Diprosopa. Vide Dichroma.

Dilcisiones, magna vulnera solet Hippocrates appellare, quæ lethalia sunt; ut, vulnus in Cerebro, cum ad aliquem ejus ventriculum pervenerit. 6. aph. 18.

Discretiva, Medicina pars est ea, quam Significativam Recentiores vocant; Græci *συμμετρίως*. 1. de his, quæ in medic. sunt. 1.

Dispersus morbus. Vide Communis.

Dissimulare membrū, heterogeneum, seu compositionem

fitum est, cujus quamcunque partem assumpseris animalis, toti nec nomine, nec definitione similis erit: E. G. Manus & Facies. lib. anatom. viv. Vide Instrumentale.

Dissidentias vocat Hippoc., cum ossa, quæ naturâ coherent, ac sese mutuo cōringunt absq. articulo, ob aliquam lationem dissident à sese invicem ac distant: ut Cubitus, & Radius in brachio ad gibbū, & ad manum; in crure Tibia, & Sura, quæ & Genu, & Calci committuntur. comm. 3. in medic. 31.

Dissolutiones, animi defectus, Græci *ἀπορροιαὶ* vocant. 1. ad Glauc. 14.

Distentio, idem est ac nervorum convulsio: quæ est triplex, Opisthotonos, i.e. tentio ad posteriora, Emprosthotonos, i.e. tentio ad anteriora & Tetanos, i.e. æqualis in utramq. corporis partem tensio, 4. aph. 57. per universum corpus qui sparguntur, nervis eventiens. 3. de loc. aff. 10.

Distorsiones sunt, cum à sua sede dilabitur aliquid vel in exteriorem corporis partem, vel introrsum in inanitatatem aliquam prolabitur, ut in naribus, si in exteriorem partem, aut os, aut pinnula earum abiit; & contra memoratæ partes cum in foramen descendunt, introrsum distorsio fit. 2. de iis, quæ in medic. sunt. 33.

Diuretica, alias & Uretica pharmaca, *διουρητικά*, medicamenta sunt, quæ ad ciendas urinas accommodantur. 11. meth. 16. & 5. simpl. 20. Duū autem ea sunt generum; aliqua enim mediocriter id præstant, & proin Eccathartica, i.e. poros expurgantia dicuntur, calida sunt & tenuium partium; alia vehementius, ut quæ plurimum movent urinam, quæ magis & succant, & exalesciant prioribus.

Diurnus sive Chronicus morbus est, quicūq. acutorū

ex decidentia terminum prætergreditur, quem nunc quadragesimum, nunc sexagesimum diem Hipp. facit. 2. de dieb. decret. cap. 12.

Dodecadaetylon, sive Duodenum Intestinum, δωδεκάδακτυλον, primum est omnium intestinorum fundo stomachi alligatum, à longitudine duodecim digitorum sic appellatum. 6. de anat. adm. c. 9. Hoc quidam non dignantur vocare intestinum, priusquam in anfractus, orbesque convolvantur, sed id ipsum ἐνδοχόν, i.e. productionem simpliciter, vel cum appendice productionem duodecim digitorum, ἐνδοχόν δωδεκάδακτυλον nominant, primumque intestinum in ordine dicunt esse jejunum. Ibid. cap. 12. Hoc idem Duodenum vocant Portinarium, sive Janitorem. lib. de anat. viv. In hoc ipsum Duodenum, biliaris meatus inseritur, à vesicâ bilem continente, per quem, hæc, in illud expurgatur.

Dolor, ὀδύνη, tristis sensus est, ut voluptas, blanda est sensatio. 2. loc. aff. 2. qui si per inflammationis fiat affectus, atque in corporibus sensibilibus, vel per se proprio & primario affectu, in arteriis, vel reliquis partibus sensibilibus omnibus per consensum, ed quod à vicinarum contactu premantur, pullatorius, sive pullativus, ἐκφυλάσας δὲ ὀφύνητος dicitur. 2. loc. aff. 3. Si verò in aliquo viscerum, hæc circumambiens membrana, per quam nervus dispergitur, à tumore præter naturam, extendatur, ita ut gravitas quedam sentiatur, dicitur sensus, seu dolor gravis, βαρὺς, aut gravitatis. Ibid. c. 4. Quæ partes si inflammatae sunt, unico doloris modo vexantur, tensivo, τεννώσας, sive extensionis: Qui verò in membranis sit, ipsius affectus veluti radice, eo loco fixa, ubi membrana pungi-
tur, qualis est in morbo laterali, dolor punctorius,
πυκνωτός

πυκνωτός dicitur. Ibid. c. 5. Si nervis ipsis primò accidar, dicitur dolor ραχικός, stupidus. 2. loc. aff. cap. 2. Quod si in lateribus spiritus quidam flatuosus procreatur, qui tùm extenuatus, tùm discussus dolorem sedat, deinde rursus procreatus alter, dolorem augeat, dolor ραχικός, rarus dicitur. comm. 1. in 1. prorrhet. 22. Dolores autem ulcerosos, tùm Medici, tùm Gymnastæ vocant, eos, per quos, inter movendum, vel tangendum, lassatas partes, sensus veluti ulceratarum partium ἐννώσας, percipi solet. 2. loc. aff. 7.

Dorsum, quod Græci ὄστρον ἢ ὀστέγερον, & μετέστρον appellant, est omnium vertebrarum, quos Spondylos vocant, compactarum basis velut & fundamentum. Nonnulli tamen ex recentioribus Medicis, non totam vertebrarum structionem, spinam appellandam censent, sed circa thoracem tantum, & lumbos, non circa collum. 3. de artic. 1. Aristoteles verò 1. de histor. animal. Dorsum dicit esse totam posteriorem corporis partem, ab occipite usque, ad extremum Coccygem, ex triginta quatuor vertebris (si modò ossis sacri partes, vertebris annumerentur) compactam; quod dorsum conficiunt, collum, thorax, lumbi, os sacrum & Coccyx, in quo costæ, velut in carina, trabes, connectuntur, totumque corpus stabiliunt. Sed aliter Galenus lib. de ossib. c. 7. his verbis: Spina est tota connexio, viginti & quatuor vertebrarum à Capite usque, ad os sacrum, ita ut septem primæ à Capite vertebræ Collum, sive Cervicem constituent; duodecim, quæ sequuntur, Dorsum, cui à parte anteriori respondet pectus, quing, reliqui lumbos, os, in quod omnes vertebræ finiuntur, sacrum, vel latum dicitur, sive etiam os magnum. 12. de us. p. c. 12. Vide Spina.

Dorhien, ὀσθίον, i.e. Furunculus, 2. meth. 2. Vide Furunculus.

Dracunculus, Δρακοντιον, est ulcus partis propinqua ipsius nervi dilatationis, sic dictum, quod nervus movendo corpori destinatus in id ulcus recedat, in eodemq; quasi occultetur. lib. finit. med. Vide quid scribat Aëtius ex Leonida, de Dracunculo, l. 4. tetrab. serm. 2. c. 85. inquit, In superioribus Aegypti partibus, pueri, maxime in tibiis generari, ac partibus aliis musculosis. Paulus addit, ex Sorano, Dracunculos hos non esse animalia, sed nervosas extremitates, quae speciem morus exhibeant, verè autem non moveantur. Nostrates affectum hunc, vernaculâ linguâ, vocant *Mitesser*.

Dropax, Δροπαξ, est medicamenti forma quadam, nunc liquidioris, in modum malagmati, nunc consistenteris ficcioris, emplastri modo, prout usus exigit; cuius materia eadem est, quæ Acopis & Emplastris debetur. Est autem Dropax duplex: Simplex alius, qui & τιτλωσις, h. e. pica-tio appellatur, solâ pice aridâ, oleo liquatâ constans. Compositus est, cui præterea adjunguntur alia ad diversos usus. In hoc genere est illud medicamentum, quod Græci Ψιλω-δρον, i. e. depilatorium vocant.

Drymea medicamenta, i. e. acria, quæ cacoëthiam humorum extinguunt. lib. de dynam. in præcæm.

Dura ulcera, quæ Græci οχθόδα, i. e. verrucosa ulcera vocant, sunt, quæ callum contraxerunt, & prætumidas ac duras oras habent. 4. de compos. med. per gen. c. 12.

Duodenum. Vide Dodecadactylon.

Dura mater. Vide Membrana dura.

Durum, στυγερόν, Medicis est, quod largo & superfluo humore, aut vapore in partem aliquam affluente, tactui renititur, nec cedit sponte, (aliter ac Philosophis:) & præterea quod ita durum est, propriè ἀντίρριον, h. e. reni-tens appellatur.

Durus

Durus pulsus. Vide Mollis.

Dyonisisci, sunt ossæ eminentia, quæ prope tempora nascuntur: dicuntur autem cornua, desumpto à corni-geris animalibus nomine.

Dyplasiaismus, duplicatio, est duorum musculorum, qui ab ipsa scapulâ excipiuntur, & ad exteriora, poste-rioraq; membrum circumagunt, quatenus ambo simul agentes, brachii circumductionem efficiunt. lib. de muscul. dissect. cap. 18.

Diploës, secunda est lamina Calvaria. 6. meth. 6.

Dyprosopa. Vide Dichroma.

Dypsacos. Vide Diabete.

Dyesthesia, ὁσώαδυσία, i. e. sensus difficultas, est vi-tium actionis sensitivæ diminuta. lib. de sympt. diff. cap. 2. Perinde ut ὁσώαδυσία, non modò difficultatē motionis, sed etiam immobilitatem significat. Ibid.

Dyscrasia, intemperies, est mistio intemperata qua-tuor primarum qualitatū; ubi enim illæ ita coierint, ut earū pares sint vires & portiones aquabiles, temperamen-tum emergit exquisitissimum, quod cæterorum omnium norma est: ab eo quodcūq; desciscit, intemperies dicitur; tunc enim aut una aliqua, aut duæ qualitates exuperent, necesse est.

Dysenteria. Vide Difficultas intestinorum.

Dysepulota. Vide Cacoëthe.

Dyspathia, h. e. ad patiendum difficultas. 1. de us. p. c. 15.

Dylpepsia. Vide Concoctio.

Dysphonia, i. e. vocis difficultas; ut Aphonia, ejus-dem abolitio. de sympt. differ. cap. 3.

Dyspnoea, difficultas spirandi, vel inordinata spiratio. 2. meth. 2. & 1. de diff. respir. cap. 1.

Dyſtherapeuta ulcera, i. e. curatu difficilia. lib. 6. de compoſ. med. per gen. cap. 1.

Dyſthymia, i. e. mœſtitia melancholica. 6. de loc. aff. c. 1.

Dyſtichia, eſt alterius pilorum ordinis in gena matrigine exorſus, præter naturam. lib. finit. med.

Dyſuria, *δυσουρία*, eſt urina vel difficilis ſaltem & debilis, vel cum dolore ſolo, ſive doloroſa ſimul & languida excretio. 7. aph. 48. Vide Iſchuria.

Dytriachifis, oculi morbus eſt, cum pilis naturalibus alii ſubnaſcentes, ipſum pungunt, fluoremq; concitant. lib. Introd. cap. 15.

E

ECROLIA, *ἐκβολὴ* pharmaca, i. e. abortiva medicamenta, quæ abortum faciunt, quæ & *φθορὰ* appellantur; eadem & fœtus demortuos extrahunt. Vide Abortus.

Eccathartica, quæ & Ecphractica vocantur. Vide Rhyptica.

Ecchymoma, (Græcis *ἐκχύματα* ἢ *ἐκχύματα*, i. e. ſuſcillatio,) eſt affectio circa cutem, cum, tenuibus ejus venis contuſis, ſanguis per fiſſuras effunditur, nondum in grumos coactus, ſed poſtquam per Diapedeſin effuſio ipſa facta eſt, contingit ſane aliquando, ubi ita coierit temporis progreſſu, eundem liveſcere, & denigrari, parvis nimirum grumulis, ex diſperſo in multas cutis partes ſanguine, coactis. 2. de compoſ. med. loc. cap. 1. & 4. meth. 1. Ecchymofin, ſolutionem continuitatis cum contuſione, & ruptione conjunctam vocitat. Generatim verò Hipp. ſolitus eſt vocare Ecchymofes, ſanguinis ex vaſculis effuſiones, & inaniſiones: & alio nomine *παυσιμωρία*, com. 2. in 9. de morbu. vulg. 9. Quæ effuſio in phlegmone quoq; fit à cauſa inter-

na,

na, ubi ſanguis è vaſis effunditur, & tumor excitatur, tactu mollis & cedens: diſtinguit tamen Gal. 6. aph. 20. Phlegmonem, ab Ecchymofi; quod in Phlegmone, ſanguis per muſculorum cavitates, ſolâ ratione contem- plabiles, ſecundum minimas ſui partes, effunditur; in Ecchymofi verò in ſpatia effluit, quæ venis adjacent. Species Ecchymomatis ſunt, Hypopion, & Hypophagma, *ὑπόπιον* ἢ *ὑπόφάγμα*, & ſanguinis ad ungues con- curſus, ex plagâ. Vide Unionis ſolutio.

Eccope, *ἐκκοπή*, exciſio. Diviſio eſt calvaria, quâ os offenſum, reſractum eſt. lib. finit. med. Inde *ἐκκοπήματα*, medicamenta imbecillia ſunt, quæ movendi tantum ſtercoris, & ea, quæ in ſpaciis inteſtinorum primæq; regionis viis continentur, deſiciendi vim habent, non etiam ex alto at- trahendi, & humores evacuandi.

Eclegma, (Græcis *ἐκλεγμα* ἢ *ἐκλεγεῖν* *φαρμακον*) me- dicamentum eſt, per ſputum evacuans, quæ in ſaucium par- tibus, phlegmone obſeſſis, uti etiam in aliis partibus ſpiri- talibus continentur. 4. de rat. viſt. 20. Ori enim inditum, ſenſim liqueſcit, & deglutitur, ad pectoris, & pulmonis vi- tia accommodatum: proinde alio nomine vocatur Arteriacum, *ἀρτηριακόν*, diciturq; *ἀπὸ τῆς λείψεως*, i. e. à lingendo. Arabes vocant Looch. Paulus verò lib. 4. c. 57. nomen hoc tribuit medicamentis, quæ devorantur ad lumbricos ene- candos. Vide Arteriacæ.

Ecphraxis, i. e. pororum apertio, & recluſio. 11. meth. 13. Inde *ἐκφραγμὰ* medicamenta vocantur, quæcunq; ob- ſtructione, & obſtructione agrotantes liberant: facultate ni- troſâ & amarâ, oppoſita emplaſticis medicamentis, quo- rum eſt meatus obducere, & obſtrare. 4. de comp. med. loc. c. 1. Hæc ipſa dicuntur alio nomine Eccathartica, *ἐκκαθαρμὰ*.

Ecphyfis, i.e. exortus, seu processus alicujus cum primis ossis, sed & intestini, vel visceris, 2. de anat. adm. c. 5. Porro, Ecphyfis simpliciter & sine adjectione prolata, est medium spacium inter intestinum jejunum, & fundum ventriculi, carens circumvolutione lib. 5. de usu part. cap. 3. Vide Do-decada & ylon.

Ecphysefis, efflatio, sive exsufflatio, est copiosissimi aeris exspiratio confertim facta. 2. de motu muscul. Græcis ἐκφυσις ἢ ἀέρας ἢ πνεύματι & ἔκφυσις; propria vocis materia, neg. vox citra eam fieri potest: differt à simplici expiratione, tum violentiâ, tum musculis, per quos efficitur: 4. de usu part. nam & paulatim exspiratio fit à solo septo transverso. 4. de loc. aff.

Ecplexis, est subitus & vehemens timor, Græcis ἐκπληξις: hujus oppositum Pericharia dicitur. περικαρία Græci vocant, quasi excessum gaudii dixeris: scimus autem, amborum occasione, plures subito periisse. 12. meth. 5.

Ecpietisma, ἐκπιεσμός, calvaria in multas partes diffractio, ubi simul intrusa ossis partes in imum decubuerint, ac meningem membranam, innixio suo premunt lib. finit. med. Est, inquit, affectio, in quâ profundius fracta ossicula descendunt, & membranam Cerebri comprimunt. Unde Ecpietismus, ἐκπιεσμός, est totius oculi prolapsus extra suam cavitatem, ut prominens appareat. Differt à Proptosi, ἀπὸ τῆς προπίσεως, h. e. à procidentia, quod in hac uvea tantum tunica, in illâ totus oculus foras erumpat, præsertim iis, qui strangulantur, athleticis, & foeminis, quæ præ dolore partus vehementius distenduntur, aut fluxionibus à capite in oculos tentantur.

Ecpyema, ἐκπύημα, dicitur ab Hipp. copiosissimi puris collectio, tumore aliquo p. n. phlegmonoso, pleuræ cū primis suppu-

suppurato, & hinc concocto. Εἰς πυρην, idem est, quod ad suppurationem perducere.

Ecrhythmus pulsus est, qui nullius ætatis rhythmum servat. 1. de diff. puls. cap. 9.

Ecstasin melancholicam, mentis motionē, aberrationemq; intelligimus vehementem & ferinam, quæ Cerebro, assatâ à flavâ bile obfesso oritur. com. 1. in 1. prorrh. 14.

Ecthlimma, est exulceratio, quæ in summâ cute, ex compressionē violenta nascitur. 2. de fract. Græcè item ἐκθύμα dicitur.

Ecthymata, ἐκθύματα, cutis velut efflorescentia, papulae sunt per summam cutem erumpentes, ab humoribus superfluis, falsis, tenuibus, ided etiam in cute leviter extuberant, quod tenues humores exulcerationem potius, quàm tumorem insignem procreent. Dicuntur alio nomine Græcè ἐκθύματα, cujusmodi sunt, tum quæ per febres ardentes exeunt, tum Variolæ vulgò dictæ & Morbilli.

Ectrosis, ἐκτρωσις, luxatio, seu osium à propria sede amorio, & divulsio, citra fractionem: significat etiam ἐκπρωσις, sive ἐκπρωσις, apud Hipp., ut notat Gal. in initio libri de Articulis; cujus luxationis causa alia est externa, omnis ea, quæ articulum loco dimovere potest, alia interna, humoris defluxio, articulum præ copia sua, vel mollior, ex loco suo naturali propellens.

Ectropion, est suppullulatio carnis in gena, quæ genam ipsam suâ gravitate foras invertit. Causa autem genæ evertenda, est vel caro adnascens, vel resolutio, vel cum cicatrix inducitur. lib. finit. med. Alibi: Ectropion, inquit, est diversio, sive inversio, palpebrarum virium, cum exulceratis oculis, plûs extra feruntur. lib. Introd. cap. 15. Est autem affectus solius inferioris palpebræ, oculum contegentis,

gentis, ita inversa, & retracta deorsum, ut parum sursum attollatur, sed pendeat & hiet, neq. ex toto oculum integat. Quod vitium si palpebra superiori acciderit, *αγρία φθαλμος*, lagophthalmos dicitur; quod vitium naturaliter contingere potest: Ektrypion verò non nisi à causa præter naturam, à cicatrice, carnis excrecentiâ, relaxatione, medicamento, futurâ, vel ustione inartificiosâ, & à senectute summâ dependet.

Ektrismos, apud Arist. 7. de hist. animal. sunt aborsus & imperfectorū fetuum corruptiones infra diem quadragessimū factæ; quæ verò intra septimum diem fiunt, non *ἐκτρυπνόν*, seu abortiones, sed *ἐκρύβες*, i. e. effluxiones vocat idem Philosophus.

Eczemata, *ἐκζέματα*, Latinis carbones, sunt pustule ardentes, & fervide, dolorem cientes, citra saniem; ingens enim fervor omnem materiam absorbit.

Efflationes, sunt magnæ & vehemētes spiritus expulsiōnes, quæ per eadem instrumenta fiunt, per quæ & tussis, & tussiendo efficiuntur. Efflatus quoq. dicuntur, ab expiratione, quæ sine strepitu fit, copiâ & velocitate motus differentes. 2. de motu musc. cap. 8. & 2. de sympt. caus. cap. 4. Vide Ecphyfesis.

Efflorationes, sunt ulcerationes superficiaria, facta in corporis ambitu & superficie, subrubra & aspera, de medic. sac. par. cap. 5. quas, si noctu enascantur, Epinyctidas vocant, lib. de tumor. cap. 15. & 2. meth. 2. Easdem Celus vocat pustulas pessimas, colore sublividas, & subnigras, albas, suo humori similes, magnitudine fabam non superantes, cum vehemēti inflammatione & dolore, ex quibus adaperis, sanies effluit, & exulceratio mucosa interrenta. Paulus & Aërius dicunt, esse ulcuscula sponte nascentia.

scientia, phlyctenis similia, subrubra, ex quibus cruenta sanies effluit. Utrumque verum est, & pustulas, & ulcuscula esse.

Effulgescentiæ, quas Græci *ἐκλάμψεις* vocant, Hipp. sunt morbus puerorum proprius, aut certè quàm familiarissimus, Epilepsia videlicet, ut notatur comm. 1. in 6. de morb. vulg. 5. et si alii de hoc significato contendant.

Effusio. Vide Contusio.

Effusa & Nigrores, sunt sanguine à venis effuso subcutem, nunc per tunicas contusas, nunc verò in sinibus reseratas. lib. de tumor. cap. 10.

Elcos, Latine Ulcus, solutio continuitatis est in omnibus corporis partibus, (præterquàm in solo osse) ab interna causa, humore scilicet vitioso, acri, & erodente, partibus, cui inest, continuitatem (sive ea caro sit, sive cutis, sive cartilago sive membrana) solvens. Id autem vitii ubi in os incidit, caries, sive *τερυδον* appellatur. Aliquando verò Hipp. Ulceris nomen ad omnem morbum dolorificum extendit, continui solutionem eo nomine significans.

Elementa, *στοιχεῖα* Græcis, apud Medicos sunt, calidum, frigidum, humidum, siccum, ex quibus homo primis velut & simplicibus, minimisq. ex corporibus est constitutus, & in quæ ultima apparatus, & simplicissima, ac minima, resolutionem capit. lib. finit. med. Adhuc elementum appellatur minima pars ejus rei, cujus est elementum: omnium autem corporum, quæ gignuntur, & corrumpuntur, quatuor sunt elementa, Ignis, Aër, Aqua, Terra, ut minimum intelligatur id, quod minimè divisionem suscipere potest: 8. de placit. c. 2.

Elephas, (qui & Elephantiasis dicitur) morbus est, in quo naturalis faciei figura mutatur, resimatur nasus, labra

labra crassa sunt, extenuantur aures, ad Satyrorum effigiem, lib. de caus. morb. cap. 7. ex sanguine melancholico primam generationem habent, quam affectionem, cum incipit, Satyriasmum nominant, quoniam vultu Satyris similes fiunt. Non desunt, qui ossas eminentias, quæ in temporibus sunt sic vocant. In aliis autem partibus, quæ fiunt tales ossium eminentia, Exostoses vocant. lib. de tumor. cap. 14. *ἐλεφας* ἢ *ἐλεφαντίασις*, universi corporis cancer est. Id nominis nactum est hoc malum, quod in eo cutis, corio Elephantum per similes videatur, nam maculis quibusdam ad atrum colorem vergentibus inficitur, atq; inaequaliter aspera, crassa, ac veluti squamis fœda, livens, serinaq; redditur. Nec Elephas quicquam a lepra Arabum differt.

Elminthes, *ἐλμίνθες*, lumbrici, animalia sunt in humano corpore, cum primis in intestinis, in auribus, in vesica, & in ventriculo, interdum etiam in sordidis ulceribus, generari solita. Lumbricos Græci *ἐνδοδακτύλους* vocant. Sunt autem trium generum. Primi generis sunt teretes, seu rotundi à figura, longitudine aliquando palmares, sæpe longiores, quos vocant *ἐνδοδακτύλους* & *γούρβας*, in gracilibus plerumq; intestinis consistunt, & ventriculum subeuntes, sæpe per os eiciuntur, quibusdam è naribus redduntur, ut plurimum cum febricula consistunt; atq; hoc genus pueris infantibus, & puberibus peculiare est. Alterius generis sunt, qui lati vocantur, *ἐνδοδακτύλους*, aliquando nequias, h. e. institas, à similitudine, quam cum institis obtinent; instar enim harum lati sunt, & longi, aliquando *τρίκωνες*, i. e. fascias vocant, quod fasciarum effigiem, suâ latitudine, & longitudine, referant. Plinius lib. 11. cap. 33. tradit tricenarum pedum ténias ventris aliquando visas, interdum plurium. Tertiū generis lumbrici sunt, qui Alcarides nuncupantur, breves

breves ac tenues, parvis vermibus similes, qui in extremo intestino reperiuntur, & glomeratim, in multas phalanges compacti, per sedem deiciuntur.

Elythroide membrana, quæ & Erythroide, *ἐρυθροειδής* dicitur, testium est tunica, vaginalis dicta, 2. de sem. cap. 5. quâ tunicâ, uti & scroto, foeminarum testes continent. lib. de vulva diss. cap. 9.

Embroche, Græcis *ἐμβροχή* ἢ *ἐμβροχία*, medicamenti genus est, cum locis affectis, liquore aliquo humectatis, perfusisq; lanam deinceps aut linteum, eodem liquore imbutum admoveamus, imbecillius cataplasmate.

Embryon, est animal utero gestatum, 6. de usu part. cap. 13. quod tamen non prius Embryon dici debet, quam duos menses in utero absolverit. Vide Cyema.

Emmota, *ἐμμοτὰ*, medicamenta, i. e. linamenta sunt humida consistentia, similia in, quæ linamentis, vel linteolis excipiuntur; cerati specie. 13. meth. 5. Emmotos vero vocat Hippocrates, eos, qui ulcus cavum & exesum contraxerunt ex suppuratione, quod curationem per linamenta desideraret. 3. artic. 55.

Emollientia. Vide Chalastica.

Emphraxis, *ἐμφραξις*, obstructio, est meatuum aut vascularum naturalium stipatio, ex copîâ, vel vitiosa qualitate (ut lentore, & crassitie) succorum proveniens, cujus species Gal. 12. meth. ponit *τέτταρον*, & *πέντε*. Unde medicamentum, quod suo lentore obstruit, *ἐμφρακτικόν*; huic contrarium est medicamentum *ἐμφρακτικόν*, quod obstructione liberat. 5. simpl. 12. Vide Rhyptica.

Empirici, (Græcis *ἐμπειροί*) nomine ab *ἐμπειρία*, h. e. experientia deducto, solâ experientia, experimentisq; particularibus nituntur. lib. de sect. cap. 1. Unde Empirica Medico-

Medicorum secta, accidentium syndromasin agris respicit, illorumq; curationem ab experientia solâ deducit, idq; nec morbo, nec causâ cognitâ. lib. Introd. cap. 3.

Emphysema, inflatio, Græcis ἐμφύσημα, ἐμπύσημα, τῶν αἰμάτων, ἢ τῶν πνευμάτων, est spiritus flatusque collectio, in inanibus corporis partibus. Vide fusè infra Physis.

Emplaston, sive Emplastîcû, ἐμπλάστον, pharmacum est, quod meatus obducit: ut picatio, quæ imponitur pilis in totum abrasis. 1. de compos. med. loc. c. 1. Atque hoc pharmacorum emplastîcorum genus, substantia sicca & terrestris est, citra refrigerationem, aut caliditatem manifestam, aut in primo ordine refrigerantium, vel calefacientium. 4. de compos. med. loc. cap. 1. Sinè mordicatione siccant eadem, inquit lib. 4. simpl. cap. 5. & lib. 5. cap. 11.

Emplastromena, medicamenta vocant, quæ exiguis totius corporis meatibus herentia prohibent, ne quid per urinas, vel universam curim diffletur, & effluat. 8. meth. 2.

Emprosthotonos. Vide Distentio.

Empyemata, quæ & Diapyemata, ἐμπύματα, medicamenta suppurantia omnia sunt. Insuper, cum in viscere, phlegmone in pus cōversa est, πύμα id solum empyema nominant; & qui sic affecti, empyos. Alii eos solos empyos dicunt, quibus inter thoracem & pulmonem pus aggregatum est. lib. de tumor. c. 3. Εμπύος ἢ ἐμπύμας Græci vocant suppuratos & purulentos, qui multum puris in capedine inter thoracem & pulmonem collectum habent. 4. de caus. puls. cap. 9. Sed & omnes, quibus inflammatum viscus aliquod suppuratum est, suppuratos vocant, ubi pus universum constitierit, concocto tumore quoque præternaturali. comm. 1. in 1. progn. 40. & 2. progn. 59. & 60.

Empyreuma, reliquia sunt caloris febrilis post soluta-

ram accessionem. Intermittentium enim & putridarum febrium proprium est, ut soluta accessione supersit nonnihil caloris, vel in ipsis humoribus relictis, vel solidis adhuc etiam partibus impressi, quem aliqui febris fomitem appellant. Huic contraria est ἀνπύεσις, sive Infebricitatio.

Emulgentes venæ, & arteriæ, sunt vena cava ex hepatis convexo emergentis, trunci descendens, rami maximi in utrumque renem subjectum implantari soliti. Similiter alia duo vasa aequè magna, à maxima arteria, quæ spina incumbit, profecta, non aliter quàm venæ in renes inseruntur, quæ venæ, & arteriæ vulgò emulgentes appellantur, quippè per quas, renes, urinam à sanguine secernunt & trahunt, simul etiam multum bilis, ac prope modum omne id, quod ipsæ continuerint, attrahunt. lib. de venar. diss. cap. 5.

Enarthrosis, species est Diarthroseos, cum ossis excipientis cavum, altum admodum est, caputq; quod in id inseritur, oblongum. lib. de ossib. in procem. Vide Arthrodia.

Enæmon, ἐνέμων, est medicamentum, quod glutinat, 6. meth. 2. imponiturq; maxime cruentis vulneribus, sistendi sanguinis causâ: lib. 1. de compos. med. per gen. cap. 14. quæ ided & sanguinarium, & cruentis opitulans, & glutinatorium dicitur. 3. de compos. med. per gen. c. 2. Vide Glutinatorium, & Sanguinarium.

Ençorema, ἐνçόρημα, quod & Appendiculum quiddam vocant. Vide Sublimamentum, & Suspensum.

Encanthis, ἐνçανθίς, i. e. inangularis, immoderatum est augmentum angulorum oculi; Rheas, immoderata eorundem diminutio. de differ. morb. cap. 9. Est etiam quiddam præter naturam tumor, in magnis Hircis oculorum, quod tuberculum non est omnino præter naturam, lib. de

tumor. cap. 17. estq; ut plurimum in majori angulo: quam carunculam, quidam Chirurgici rescindentes, effluxum excrementis eâ parte aperuerunt, quem affectum Rhœada quidam appellârunt. 10. de usu part. cap. 11. Alias Encanthis propriè angulum oculi significat; major autè angulus, qui naso est proximus, proprio nomine Rhanter. *ῥαντήρ*, dicitur, minor, qui est ad tempora, *ῥαπωνιάς*: inde verò ejus nomen, morbo inditum est.

Encathisma, *ἐνκάθισμα*, est sessio in aquâ medicatâ, ab imis pedibus, vel feminibus, usq; ad umbilicum, ita ut superna partes non madescant. 5. de comp. med. per gen. c. 13.

Encephalos, *ἐνέφαλον*, Cerebrum. Vide Cerebrum.

Encharaxis, *ἐνχαρῆσις*, scarificatio, est cutis & subje-ctæ ejus carnis, per scalpellum sectio, non punctum, sed cœsim, multis foraminibus facta. Differt à Phleboromia, quod hæc uno vulnere venam adaperiat, illa multis sectionibus, cutem, carnemq; dividat & vulneret.

Encheridæ, grumi sunt, cera modo facti in emplastris, dum liquida illis insunduntur. 4. de comp. med. per gen. c. 5.

Enchymoma, Græcis *ἐγχύματα*, à *ἐγχύω*, est sanguinis & humorum, in partem aliquam, naturalis effusio, per quam & partis ejus venula repletur sanguine, & color vividus rubens ac naturalis, parti inditur, ut in Irâ, Verècundiâ, Gaudio, Somno fit. Eadem autem sanguinis effusio si fiat præter naturam, ut in vulnere contingit, abscessu, aut phlegmone, dicitur Ecchymosis, vel Ecchymoma. Vide Ecchymoma. 2. de morb. vulg.

Enchyta, medicamenta sunt, quæ oculis instillantur, ut sem. sænugraci decoctum, candidum & tenue ovi, lac muliebre, & quæ in hunc usum præparantur collyria. lib. de remed. par. fac. cap. 10.

Encope,

Encope, *ἐνκοπή*, & *διανοπή*. Vide Hedra.

Encranion. Vide Cerebellum, & Parencephalis.

Enema, i. e. infusum, quod per inferna, in alvum insunditur: dicitur quoque *ἐνδοσμία* *ναυήρ*. lib. de ren. aff. conit. cap. 4.

Endemus, & Endemius morbus appellatur, quasi patrium dixeris & vernaculum, qui morbus communis est multis eandem regionem incolentibus: ut Epidemus, & Epidemius morbus est, qui cum perniciosus non sit, tempore tamen statò in regione aliqua sevit & insolefcit: si enim perniciosus sit, pestis dicitur. 1. de vict. rat. 9. Morborum itaq; alii sporades, h. e. dispersi; (*σποράδες*, qui singulos separatim corripunt, non ab aère, sed potiùs a victus ratione cuiq; propriâ, exorfi:) alii communes sunt, quos Græci *νοῦς*, *παῖνοῖς* à *παῖναι* vocant, qui sunt certi morbi & singulares, qui alicubi vagantur, & multos aequè simul corripunt, causamq; habent communem, ut aèrem, quem omnes inspiramus, vel depravatæ aquæ potum, aut Gravem & vitiosum cibum, quem omnes pariter absorbuerint, vel terram exhalationem, vel quid simile, quod vitari nequeat. Qui morbi communes, Pancceni & Pandemi; si patrii sunt, Vernaculi; & alicujus regionis familiares, Endemi & Endemii vocantur, causamq; communem agnoscunt, & communem insultrum, de quibus Hipp. lib. de aquâ, aère, & locis. Si verò à communi causa nati, communes quidem sunt, non tamè patrii & familiares, sed potiùs externi, & adventitii, sint autem perniciosi, & contagiosi, pestilentes dicuntur, Græcè *λοιμώδεις*. Si verò non pestilentes, sed pestilentibus mitiores sunt, *μὴ λοιμώδεις*, carent proprio nomine, quanquam Galenus, quasi oblitus eorum, quæ in proœm. lib. 1. epid. scripserat, asserat, eos, qui pestilen-

res non sunt, vocari Epidemios, mutuato scilicet generis nomine.

Endixis, ἐνδείξεις, Indicationes sunt, i.e. communitates, scopi, & auxiliorum fontes, velut & loci: ἀνδείξεις vero his opposita sunt. 9. meth. 7.

Engisomata, instrumenta sunt, quibus in Calvarie fracturis utimur: aliis sunt ossis pertusio, cum pars affecta in profundum descendit, ac super illasum os corrui. lib. finit. med.

Engonios, i.e. angulosa brachii figura, quæ illi membro naturalis est: omnis enim cuiusq. partis figura rectissima, maximè est à dolore aliena. 6. meth. 5.

Engisomata. Vide Camarosis.

Enrhythmus pulsus, commune quoddam genus est ad Eurhythmum pulsum, & Arythmum. i. de diff. puls. c. 9. Qui enim naturalem & optimum servat rhythmum, ὀρθὸς & dicitur, unusq. est & indivisus; qui vero non servat, ἄρρυθμος, in tres divisus differentias: omnis autem pulsus, qualiscumq. ille sit, modò servet rhythmum, ὀρθὸς & appellatur.

Ensisiformis cartilago. Vide Cartilago ensiformis.

Entera, ἐντέρας, intestina: sunt corpora cava, rotunda, membranosa, ab imo ventriculo ad anum protensa, distribuendi ad jecur chyli, & continendi, expellendiq. stercoris instrumenta, in orbem involuta, fibris circularibus & transversis contorta, ad chyli & stercoris expulsionem; quorum tria superiora tenuia sunt, ἐμφύεις, sive ἠωδέναι, ἀκίςφυλον, νῆστις, ἐλκον ἢ λεπίον, h. e. Ecphysis, Jejunum, Ileum, sive tenue; tria inferiora crassa, τοφλόν, πῶλον, & σιγῶν, Cæcum, Colon, & Rectum: atq. inde patet, etsi unū & continuum numero sit intestinum, loco tamen, magnitudine,

tudine, numero orbium, & anfractuuum evariare, senariūq. resultare numerum. lib. 5. de usu part. & 6. de anat. adm. Ubi verò ἐντέρας, in singulari numero, ab Hippocrate profertur, docente Gal. com. 4. in 6. de morb. vulg. ipsum significatur Colon, per excellentiam, ratione suæ magnitudinis, quod solum ex intestinis in scrotum descendit, & Enterocelen efficit, i.e. herniam intestinalem, apud alios verò Cœcum. lib. 4. de usu part. cap. 17.

Enterocèle, Epiplocèle, & Hydrocèle, sunt species Herniarum, in quibus rumpitur is meatus, qui à Peritonæo ad testiculos pertingit. lib. de caus. morbor. cap. 10. ait: Cum articuli suis sedibus excidunt, aut loco tantum moventur, aut cum omentum vel intestina, ad inferiores testiculorum tunicas devolvuntur, alterum morbum Græci Epiplocelen, alterum Enterocelen appellant. de differ. morb. c. 10. Præter hæc ex ambobus etiam morbis compositum affectum Enterœpiplocelen juniores Medici appellant. lib. de tumor. cap. 15. Vide Celas.

Enthusiasmus, i.e. Fanatica percussio, seu Numinis afflatio, est E. G. cum quidam in sacris faciendis, mente capiuntur, si quæ viderint, aut si tympana, vel tibias, vel signa audiverint. lib. finit. med.

Epacmaestica 9. meth. 4. Vide Continua.

Epaphæresis, i.e. repetita sanguinis misio. de cur. rat. per sang. cap. 1.

Eparmata, præter naturam tumores, secundum aures, in ægrotantibus exortos, vocat Hipp. comm. 4. in 6. de morb. vulg. 1. Galenus 3. de compos. med. loc. cap. 2. dicit, Eparmata (quæ & Parotides sunt) de genere esse inflammationum, quæ sunt glandulis, circa aures p. n. affectis. Paulus verò ait: Tumor omnis, sive œdematosus, sive scirrhusosus, etiam

citra inflammationem, glandulas sub auribus occupans, *απορτί* dici potest.

Ephebeon, Pubes & Pecten, Aqualiculus Latine, Græcis ἐφῆβαιον, ἐπίοισον, ἡβή, id totum est, quod est ab Hypogastrio, seu imo ventre (quem & lumen vocant) usq; ad pudenda. lib. Introd.

Ephelcis, i.e. ramentum seu cruoris exigua guttula, quæ interdum, per rufim in hamoptoicâ passione, rejicitur. 4. de loc. aff. 5. Aliquando generalius, ἐφελκίς, crustula est, quæ ulceri obducitur, diciturq; de internis, quandoq; enim crustula & per tussē pulmonibus, & per dejectiones ex intestinis, dejiuntur.

Ephelis, ἐφῆλις, est aspreudo, & nigrities, in facie ex ardore Solis progenita, ἀπὸ ἡλίου, i.e. à Sole, nomē desumens.

Ephemera febris est, quæ à causa procathartica, sive præincipiente, sit cum urina coctione, primâ die apparento, vaporosâ, blandâ caliditate, pulsu ad magnitudinem, & celeritatem effatu dignam accedente, systole pulsus parum à naturali tenore mutata, equali atque incomprehensâ ascensu in caliditate, etiam cōsistente febris, sudore ad hoc aut rore, aut omnino cum aliquo optimo vapore integrè judicari solita. 1. de differ. febr. cap. 7. Ephemera febris, ait, in spiritibus citra humorum putredinem, accensa est. Ibid. cap. 5. Vide Diaria.

Ephialtes, affectus Græcis dictus, est nocturna corporis oppressio, & quadam quasi suffocatio, cum quis somni ab initio, supinus jacens, grandi se mole opprimi, atq; ab alio invadi imaginatur, cum difficili respiratione, immobilitate, ac voce præpeditâ, propè suffocari ager videatur, Græcis quoq; ἐμβολή & πνυγέλιον, Latine verò Incubus, vel Incubonus dicitur; fortè quia ex Veteribus quidam Dæmo-

Dæmonem, alii Cupidinem, alii Incubantem vertulam, aut externam quandam vim, quæ quiescentes invaderet & pondere oppressos gravaret, esse voluerunt, quamvis tota mali causa, intra corpus esset. in libello de utilitate respirationis.

Ephidrosis, ἐφιδρωσις, duo significat, vel sudoris circa thoracem, & caput exortum, vel in universo corpore sudoris proventum, tum paucum, tum inutilem.

Epialus. Vide Febris Hepiala.

Epicauma, est velut ex igne facta crustulosa ulceratio, quæ oculi nigro advenit, nec permanet. lib. finit. med. Id morbi ἐπίκαυμα & ἐπύκαυμα vocant Græci, Latini verò ulationem, sive exustionem.

Epiceraistica, ἐπιεραistica medicamenta sunt, quæ & temperata dicuntur, quæ si valentiora evaserint, humorem mordicantium morsum, retundunt. 2. simpl. 12.

Epicrasis, ἐπικρασις, est vitiosi succi (cum indicationes sibi adversantur) paulatim facta vacuatio, & paulatina ejus, quod salubre est, pro vitiosis repositio. 9. meth. 10.

Epicrasis, i.e. adjudicatio. ad Thrasib. cap. 6.

Epicrasis, certa quadam est percussio, quæ mangones puerorum succurrunt iis, quibus à natali die, gracilia sunt membra. 14. meth. cap. 16.

Epicyma, ἐπικύμα, est secundus fœtus, conceptus gravidâ jam existente muliere: id quod fit, ut scripsit Hippoc., cum fœtû jam concepto non clauditur exactè uterus, sed semen aliud, etiam postea intro admittit; Arabibus Superimprægnatio dicitur, & Superfœtatio.

Epidemus. Vide Endemus, & Communis.

Epidermis, summa cutis corporis, seu Cuticula, 3. meth. 4. solâ sensatione, à verâ cute differt; hæc enim à ner-

vorum extremitatibus dilatatis sit, Epidermis verò à cutis excremento vaporoso, ambientis aëris à frigiditate, provenit: itaq; vel sensu caret, vel exigui sensus est; & proinde citra dolorem, facile à subiecta cute separatur.

Epidesmus, sive Hypodesmidas, i.e. fascias, subfasciaciones, & subligamina, sine ullâ distinctione Veteres vocaverunt: at Hippoc. fascias, quæ ipsi corpori circumdantur, subligamina, seu subfasciaciones appellat, quæ plagulis extrinsecus superligantur. 3. de his, quæ in medic. fiunt. 6. Vide Plagulæ.

Epidesis, genus ligationis est, ad sanguinis profluvium compescendum, sanguinem fundentibus vasis injecta, & vulnerati membri labra disidentia continens, eamq; ob rem merito inter claudetia remedia numeratur. 5. meth. 3.

Epididymis, ἑπιδιδυμῖς, i.e. supergeminæ tunica, & parvus quidam quasi testis, testium involucrum simul est, & appendix: est enim pars quadam animalis gemini, h.e. testis capiti superimposita: id quod nomen ipsum præ se fert, ex qua multa fistula, seroso quodam humore plena, ad testem permeant. 1. de semin. cap. 15.

Epigastrium. Vide Abdomen.

Epigenema, ἐπιγενεμα, ὁπὸ τῆς ἐπιγενέσεως, quasi superveniens, vel supergenitum, idem est ac symptoma. de sympt. diff. cap. 1. Vide Symptoma.

Epiglottis, ἐπιγλωττίς, i.e. superlingula, est membrana cartilaginosa, rotunda, hedera folio analoga, in interiori gutturis parte collocata, 1. de loc. aff. 1. quæ à radice linguæ exoritur, lib. de vocal. instrum. diff. cap. 4. quæ & Glottis dicitur. 7. de usu part. cap. 13. quin etiam lingula, ligula, i.e. laryngis lingua; est enim corpus quoddam simile linguæ alicujus fistulæ, ubi arteria & larynx inter se cōnectuntur.

7. de

7. de usu part. c. 13. velut operculum omni tempore, quo animal respirat, apertum stans, quæ autem transglutit, laryngi accumbens. Ibid. cap. 17. Cujus ligula nisi tanta esset magnitudo, figura, substantia, & situs, quem nunc habet, vomentibus nobis non pauca in asperam arteriam deferrentur, ad laryngis cavitatem coacervata. Ibid. Estq; hæc proprium vocis instrumentum. 1. de loc. aff. 6.

Epigonatis. Vide Patella.

Epilampies. Vide Effulgescentiæ.

Epilepsia, (quæ & Epilepsis dicitur) i.e. morbus Comitialis, de diff. morb. cap. 5. estq; totius corporis convulsio. 2. de sympt. caus. cap. 2. Vide Comitialis.

Epilogismus, communis est quadam ratio, omnium assensu comprobata. 1. prorrh. 6.

Epiludes, Parulides, Thymi, tumores sunt præter naturam, in glande penis, nihil selectum habentes, præterquam quod sunt carnosæ germina. lib. de tumor. cap. 17.

Epinyctides. Vide Efflorescences.

Epiparoxineste, i.e. superacui, & superexacerbari dicimus, cum paroxysmus plures habet insultus: sicut & pulsuum Thlipsis, i.e. compressio, quando incipiente accessione, satis parvi atque inæquales pulsus sunt. lib. 1. de diff. febr. cap. 7.

Epiphora, ἐπιφορὰ, tum inflammationis magnæ, universo illata corpori, tum largorum fluorum, & fluxionum, commune nomen est; propriè verò de oculis profertur, ubi cum maxima inflammatione, etiam humoris copia, in illos, influxerit. lib. Introd. cap. 15.

Epiphysis, ἐπιφύσις, est ossium quasi adnata appendix. lib. de ossib. in proæm. Differt autem ab Apophysi, ut idem Galenus annotat, quod Apophysis sit totius ossis ex-

trema pars; Epiphysis verò non est osis pars, sed ali-
quid osi adnatum.

Epiphysis vermiformis, ἐπιφύσις σκουανοειδής, idem
est ac Conarium, sive Conoides corpus, & Turbinatum.
Vide Conoides.

Epiplasma, idem est ac Cataplasma: ut cum tritici
farina, ex hydrelao decoquitur, ac vulneribus imponitur.
3. de compos. med. per gen. cap. 2.

Epiplocele. Vide Celas. *ruptura*

Epiplocomistæ, pleriq; homines pingues & obesi
dicuntur, quasi dicas Omenti gestores, dum in magnam
molem, omentum isdem excreverit. 6. de anat. adm. cap. 5.

Ruptura
Epiploomphalon, omenti est in umbilicum prolapsus.
lib. finit. med.

Epiploon. Vide Omentum.

Episarcidium. Vide Anasarca.

Episemasia, est ipsum principium, sive insultus acces-
sionis febrilis, in quo agri solent horrere, refrigerari, oscita-
re, pandiculari, dormire, aut aliud quid simile pati: dici-
tur Græcis ἐπισημασία, significatio, alias ἐπὶ τοῦ ἀπογενομένου,
i.e. annotatio paroxysmi. Vide Annotatio.

Epision. Vide Aquaticulus, sive Aqualiculus.

Epispasthon. Vide Attrahens. Est medicamen avi-
dum inspersile, ad malignorum ulcerum curationem, non
inefficax. 4. de compos. med. loc. cap. 5.

Epithemata, ἐπιθέματα, pharmaca sunt, ceratis valen-
tiora, quæ tum ex unguentis, tum ex iis, quæ similem vim
obrinent, medicamentis componuntur. 7. meth. 4. Epithe-
ma quoq; operculum est. 2. de usu part. cap. 9.

Epneumatosis. Vide Physis.

Epoeche, est suspensa sententia, nihilq; definiens: ut cum
quam-

quandiu humores sunt in motu, de nullâ re pronuncia-
mus nec asseveramus cerò quidquam. lib. de optimo do-
cendi gen.

Epomida, i.e. superhumeralem, superiorem humeri
partem dicunt. 1. de anat. adm. cap. 11. Vide Ala.

Epulis, ἐπύλῃς, est tuberculum & carnis excrecentia
in gingivis proveniens, & ad intimos molares dentes sese
extendens, aded ut ager aliquando os aperire nequeat. 5. de
compos. med. loc.

Epulotica, ἐπυλωτική φάρμακα, medicamenta sunt,
quæ non detrahare, neq; liquare carnem, sed indurare, de-
ficcare, & cicatricem inducere apta sunt, ut alumen, galla
omphacium, æs combustum, præsertim lotum. 5. simpl. c. 15.

Equus, (qui Græce ἵππος dicitur, lib. finit. med.) oculo-
rum affectus est, insitus quibusdam, quibus oculi nullo tem-
pore manere possunt requieti, sed tremuli subinde nictant,
& instabiles. 1. progn. 21.

Erratica febris, sive inordinata, est, quæ extra horas
consuetas, vel tardius, vel celerius invadit, & inordinatè
tum movetur, tum consistit. lib. de Typis, cap. 4. Sunt enim
(ait) in erraticis, inordinata principia.

Errhina, medicamenta sunt, quæ naribus, quas Græci
Rhinas vocant, capitis purgandi gratiâ insuntuntur, aut
induntur. 5. simplic. c. 20.

Erythroide, est intima testiculorum tunica. 1. de caus.
morb. cap. 10. Vide Elythroide.

Eruptionum, sive, ut Græci dicunt, Exanthematum
nomen, quidam in genere usurpant, de affectionibus videli-
cet cutaneis, ulcerosis, & asperis, in mento & corporis uni-
versi ambitu suâ sponte provenientibus. 5. de compos. med.
loc. cap. 6.

Erysi-

Erysipelas, est tumor præter naturam, non altè descendens, sed in cute consistens, à bilioso humore obortus, colore pallido. 14. meth. 1. Si verò ipsius color non sit omnino pallidus, sed mistus ex pallido, & rubro, erit etiam mista affectio, ex phlegmone (in qua sanguis peccat, coloris rubei) & ex Erysipelate, utiq; ab eo, quod in mistura superat, nomen ipsi inditur, ac dicitur vel Phlegmone erysipelatosa vel Erysipelas phlegmonosum. 14. meth. 1. & 2. Nominant autem Erysipelas, Vicinitrahā, vel Vicinirubiam, quod incensum quidem atque inflammatum est semper, cum tumore & rubore partium circumpositarum. 1. 3. de his, quæ in med. fiunt. 30. & 2. ad Glau. 1. Exactum autem Erysipelas est, quod à biliosa fluxione ortum dicit. 7. simpl.

Eschāra, crusta est, quæ ulceribus veluti septum, vel suā sponte, vel arte pyroticorum medicaminum usu adnascitur. 5. meth. cap. 3. Vide Caustica.

Escharoticum medicamentum est, quod perinde ut causticū, in crassā essentiā est, & cuiusq; inhaerit parti, stipitis ritu infixū, eam ex cruciat, cōdurit, & c. 5. simpl. 15.

Esthiomenos herpes, est inflammatio ex sincerā flavā bile ad cutem decumbente acriori, & mordaciori quā ea est, à qua oritur herpes miliaris, in hoc enim fluor, pituitā mistus videtur, in illo autem exacta bilis totam exulcerans, & corrodens cutem. lib. de tumor. cap. 9. Vide Herpes, Phagedæna, Nomæ.

Ethmyodes platysma, i.e. latus ille musculus, sive musculoſa dilatatio, quæ cuti subnascens, Gnaton, i.e. buccam sive maxillam movet. lib. de nervorum diss. cap. 6.

Evacuationem omnem, sive fiat inediā, sive sanguinis missione, sive purgante medicamento, solitus est vocare Hipp.

Hipp. vasorum Inanitionem. Evacuatio autem præstis dicta, est humorum, qui suā quantitate molestant, purgatio: ut purgatio est humorum, qui suā qualitate molestant, evacuatio. 1. aph. 2.

Euchymia, i.e. succorum in corpore bonitas. 2. simpl. 13. Unde Euchymon nutrimentum est boni succi. 6. de san. tuend. cap. 7.

Eucrasia, est medium omnium temperamentorum, 1. de sanit. tuend. cap. 4. ex optima & convenienti cuiq; natura corporis mixto, mistura quatuor primarum qualitarum consurgens. Unde ejus magna est latitudo, quam qui adeptus est, εὐκρασία, sive Eucraton corpus, i.e. optimè temperatum corpus nactum esse diceretur: secus Dyscraton, sive intemperatum. 2. de temper. 1.

Euectica, Medicina pars, quam alii Gymnasticam vocant, est, quæ optimum habitum corpori inducere studet. de part. art. med. cap. 5.

Euexia, est bona corporis habitudo. 1. de sanit. tuend. cap. 8. Ut huic opposita Cachexia, est pravus corporis habitus: κακὰ ἔκαστα, illam complent, bona omnium partium temperies, actionum robor, Euchymia, sanguinis, carnis, totiusq; corporeæ molis symmetria.

Evidentes causæ. Vide Continentes.

Euoxon, vinculum vocat Hipp., quod benè gestat, continet & sustinet, ἡ ἐ. firmiter & sinè ulla compressione continet. 3. de artic. 22.

Eupathia, i.e. patiendi promptitudo. 4. de usu part. 14.

Euphyian, vocat Galenus bonam habitudinem. 1. de usu part. 9.

Eupnoea, εὐπνοία, proba spiratio, quæ secundum naturā sit: opposita dyspnoea, quæ est difficilis spiratio. apud Hipp. Eurhy-

Eurhythmus pulsus, est cuiq; ætati, loco, tēpori, temperamento, naturalis & cōveniēns pulsus, cū item suū rhythmum in diastole pariter & systole servat. 1. diff. puls. 9.

Eufarcon. Vide Quadratum.

Eusema crisis, quæ cum bonis signis, à sua indicatoria die fuit indicata, ut quæ undecimo die, coctionem in urina, noctem gravem, quæ accessionem præcedit, insultus, cum concussione pulsuum, decretoriam commotionem, & sudores bonos, citra horrenda pericula habuit. 1. diē. decret. c. 7.

Eustomachus, cibus est gratus stomacho, ventremq; roborans. 6. de san. tuend. cap. 9.

Euthyporos, i.e. in rectum procedens, alterum ex instrumentis & organis est, quæ fractis, vel luxatis cruribus supponuntur, (ὀρθοίπους Greci vocant:) quod quidem Euthyporos per unicum axem, qui in fine machinæ ad infernam ejus partem est collocatus, contrarium nixum toti membro, geminâ tensione efficit; quod verò prius sursum, mox deorsum, illud Metalepticum dicitur, quasi translativum dixeris. 6. meth. cap. 5.

Eutrophia, i.e. bona & uberior nutritio. 3. de sanit. tuend. cap. 8.

Exanastomosis. Vide Osculorum apertio.

Exangues corporis partes sunt, ut ossa, & cartilagine, quæ mucoso quodam humore natura sua analogo aluntur, lentore quodam & albedine prædito. 3. de artic. 65.

Exanthematum nomen, quidam in communi usurpant, de affectionibus videlicet ulcerosis, & asperis in aliqua corporis parte provenientes, quæ & Pustulæ, & Borbor dicuntur. 5. de compos. med. loc. cap. 6. Sunt autem ἐξανθήματα, sive papulæ, quedam leves eruptiones humorum per cutem efflorescentium; rubræ, pallidæ, flavæ, nunquam

nunquam & nigra, & livida, pro humorum ratione, nunc indolentes, nunc prurientes cum scalpitu, interdum sine pruritu, nunc ulcerosæ, nunc ad ulcus non devenientes: harum generum sunt φωνίαι, ὑδαταία, ἐκνύκτες, λέχθες, Variola, Morbilli, quæq; in lue Venerea etiam gignuntur, & quæ in febris pestilentibus. Vide Pustulæ, Eruptiones.

Exarthrema, luxatio est, non omnis, sed ea tantum, in quâ totus articulus, à sua sede naturali excidit; nam parvam luxationem, non ἐξάρθρωμα, sed παραρθρῶμα vocant. 2. meth. 2.

Exarticulatio, est alicujus membri luxatio. lib. de morb. diff. cap. 13. Exarticulationes interdum vocat exarticulata, i.e. osium è propria sede excessus, sine fractione. comm. 1. in 1. de fract. 1. Vide Luxationes.

Ex ægritudine senectus, sive Ex morbo senium, (quod & Tabes, seu Marasmus, & Marcor, & Febris tabida, vel Marasmodos dicitur) est extinctio summæve imminutio nativi caloris, ad quam totum corpus contabescit, instar arboris cujusdam supra modum arefactæ, aut ob longitudinem temporis, aut flammæ viciniam, aut vehementem atq; immoderatum squalorem. Et sicut hac qualitas, senibus, annorum multitudinis ratione comparatur, ita tabidis à febrili caliditate. 5. de sanit. tuend. cap. 9. & 1. de differ. febr. cap. 8. Fitq; ex defectu nutrimentis, ubi quis vel ex electione famem tolerat, vel præ ciborum inopia, fame conficitur. lib. de marcore, cap. 1. Vide Marasmus.

Excavatio. Vide Lordosis.

Excidentia, apud Hippoc. nunc sine adjectione luxationes osium à propria sede, 1. de fract. 1. nunc articularum tantum

tantum luxationes sunt & dicuntur. comm. 3. de iis, quæ in medic. fiunt. 31. Vide Luxationes.

Excrementum, id omne dicitur, quod in alendo corpore nec confici, nec assimilari potuit; cumq; corpori non adnascatur, nec ad crescat, propterea per ipsius laxiora intrus spatia, supervacaneum errat, unde nomen quoq; recte à Majoribus ei rei περιττωμα, i.e. pererrans est inditum. 1. de sanit. tuend. cap. 3. Vide Attractrix, & Lotium.

Excutiones, i.e. osium extra cutem ejectiones; de osibus enim extantibus est sermo. 4. de artic. 34.

Exelcismus, est osis, vel osium deductio à superficie in profundum. lib. finit. med.

Exercitatio acuta, cujus celeres motus sunt, est, quæ corpus extenuat & consumit: contraria crassum reddit; multa corpus siccant; mediocris obæsum præstat. 5. de sanit. tuend. 3.

Exipotica, digerentia sunt medicamenta. 7. de comp. med. per gen. 9.

Exomphalos dicitur, cui umbilicus foras prominet; quod malum alii rupturam vocant, alii egressionem umbilici: quod accidit, vel Peritoneo rupto. aut procidente Omento, aut intestino, vel humore ibidem collecto, vel carne subnatâ, vel sanguine in loca hæc irrumpente, per Diapedesin, vel aneurysina, vel solo aliquando spiritu irruente. Vide Bubonocle.

Exostoses. Vide Elephas.

Expansa, ἐκτετακται. Vide Abscedentia.

Experientia, est ejus, quod sapius & eodem modo visum est, observatio, atq; memoria. ad Thrasib. cap. 11.

Expiratio, est motus thoracis, & pulmonum, quo spiritus per respirationem ad interiora latus, ad exteriora cum fuligi-

fuliginosis excrementis repellitur. 4. aph. 68. inquit, Morio est, quâ, in cordis compressionibus, id, quod fuliginosum est, ac humidum, per leves arterias, extrâ pellitur. 7. de usu part. 9. Vide Inspiratio.

Expultrix faculcas. Vide Attractrix.

Exquisita tertiana. Vide Terciana simpliciter.

Exspiratus, species quadam est Respirationis, ex convulsione proveniens, quæ muscularum, qui expiratum efficiunt, convulsionem sequitur, quam appellat Hippocr. spiritum inter exeundum offendentem. 2. de sympt. caus. cap. 2. & 4. aph. 68.

Extasis, i.e. mentis amorio, seu abolitio, insania est, quæ brevè finitur. lib. finit. med.

Extensum intestinum. Vide Rectum.

Extergentia. Vide Rhyptica.

Externa causa. Vide Procathartica.

Extuberatio, est vertebrae alicujus, ab interiori, ad exteriorem regionem facta luxatio. 9. de placit. 4.

Exuccatio, i.e. sugillatio. 2. de fract. 24. Vide Contusio.

Exudare, est circa frontem & clavículas parùm sudare. comm. 2. in 1. de morb. vulg. 75.

Exufflatio, est multi spiritus, ex thorace, per guttur affatim facta emissio, agentibus ad id intercostalibus musculis, contractoq; thorace. 1. de loc. aff. 6. Duplex est, altera circa sonitum & strepitum, cum ex utroq; thoracis partibus nihil omnino expirat animal; altera, cum una tantum thoracis parte respirat animal, ita ut semispirans, vel semivocale reddatur, diciturq; exufflatio strepens, vel cum sonitu: illa hiantibus, hæc constrictis sit faucibus. 4. de loc. aff. 6.

Exustio, quæ & Deustio dicitur, vel ipsa Solis ope-

ratio, vel is, qui ab eadem hac Solis exustione oritur in corpore affectus, sive ille jam effectus sit sive adhuc fiat: ubi sapius adest calor quidam praternaturalis, nondum tamen febris, nisi Cor quoque simul sit ultra modum calefactum. lib. 1. de differ. febr. cap. 2. 3.

F

FACIES, Gracè πρόσωπον, est quicquid in antica capitis parte, sub tota fronte, auribus, oculis, naso, & ore ad mentum usque, à superciliis incipiens, circumscribitur. lib. Introd. cap. 10.

Facies Hippocratica, verè mortifera est, cujus nasus acutus, cavi oculi, adstricta tempora, aures frigidae & contractae, & fibra earum versa, cutis circa frontem dura, intenta, arida, color totius vultus viridis aut niger est. 1. prognost. 7.

Fames. Vide Sensus indigentia.

Fatuitas, (Gracè νώστωσις, stultitia & stoliditas dicitur) symptoma est citra delirium, aegros naturalibus suis similes reddens; quales etiam ex iis, qui consenescent, nonnullos fieri novimus. Simile vitium est ἀνοία, amentia, ignorantia, de qua Thucydides scripsit, in his, qui ex peste servati sunt, hoc pacto, ignoraverunt, tum seipsos, tum familiares. com. 2. in 1. prorrh. 60.

Fauces, sunt interna oris locus, in quo simul conveniunt & gula, & gutturis partes extremae. 4. de loc. aff. cap. 3. Graci fauces Pharynga vocant, i.e. praejacentem gulæ & gutturis sedem, quâ apertâ videmus evidentem amplitudinem, in qua gemina ostiola visuntur, tum gulæ, tum etiâ gutturis. 3. progn. 16. Vide Isthmus, & Pharynx.

Favus, Gracè μύκωσις, & μεδιμύκωσις dicitur. Vide Achores, & Cerion.

Febr-

Febrere existimamus, non eum modò, qui in cute corporis exteriori igneam habet caliditatem, verùm eum cum primis, quieam, in corporis imo, & visceribus continet. com. 1. in 1. prorrh. 7.

Febris, secundum communem omnium hominum consensum, est caliditas præter naturam, maximè quidem in totum animal effusa; sin minus, at omnino vel in plurimis partibus, vel in nobilissimis accensa, com. 1. in 6. de morb. vulg. 29. cum is calor adeò auctus est, ut & hominem offendat, & actionem cordis ledat, 8. meth. 1. sive idem calor, ipsum Cordis corpus occupaverit sive eos, qui in ejus ventriculis continentur humores. 1. de diff. febr. c. 1. & 3. & de cur. per sang. cap. 5. Febrem autem dicit Hipp. à fervore & igne dictum; uti nomen πυρετός dicitur ἀπὸ τοῦ πυρός, i.e. ab igne, siquidem febris essentia calorem igneum habeat. 3. de pract. & de caus. morb. cap. 2.

Febris ab apostemate, aliàs Febris phlegmonodes, 14. meth. 9. est, cum aliqui, vel ob inflammationem, obortum abscessum, dolorem, vel erysipelas, lateris, pulmonis, vel alterius partis, febricitant; licet Veteres eos non simpliciter febricitare, sed vel pleuriticos, peripneumonicos, lenasos, simpliciter dicant. 4. aph. 73. Eadem etiam Febris accidens dicitur, si post sensibilem alicujus membri adveniret affectum; alioquin agritudo & affasio censenda est. de differ. morb. cap. 5. & com. 1. in 6. de morb. vulg. 29.

Febris accidens. Vide Febris ab apostemate.

Febris Acmaistica, Anabatica, Epacmaistica, Paracmaistica, Homotona, Caufon, ardens, deurens, continua, ἀνμαγμὴς ἢ ἀνοτόνως, ἀνάβαξις ἢ ἀπακμαγμὴς, παραμαγμὴς, ἀούρος, ἢ ἀουχῆς Graci vocant. Vide Continua febris.

Febris Amphimerina, ἀμφιμέρινη. Vide Amphimerina febris.

Febris Cathemerina. Vide Cathemerina febris.

Febris Colliquativa, αὐτὸνυσίνος πυρετός, ex genere est februm, quas marasmodos vocant; hoc solo excepto, quod quæ partes in his colliquantur, vaporis vice digeruntur, adeoque evaporant, in illis aut in ventrem influunt: in ardentissimis enim febribus carnes humidæ, molles & adipe copioso pollentes, liquari deprehendimus, unde postea in marasmodos febres transiunt, in quibus sicciores carnes redduntur, & corii ritu durantur, nec in ventrem defluunt, nulla ex his sensibilis liquatio. 10. meth. 11. Idque fit, cum corporis humores tenues fuerint, & febris calor acris; nam evaporantur, qui ita extenuantur, per insensibilem evacuationem. 2. de rat. vict. 47.

Februm confusio. Vide Cōplexio febrū, ἐντροπὴ.

Febris Diaria. Vide Diaria febris.

Febris diurna & nocturna, quam Greci Cathemerinam & Mathemerinā vocant, est febris quotidiana, quæ nocte vel die remittit quidem, sed non intermittit; quæ verò remittit, & ad infestitatem venit, Amphimerina dicitur. comm. 3. in 1. de morb. vulg. 2. & 9. Vide Amphimerina.

Febris Ephemera. Vide Ephemera febris.

Febris facta & fiens. Vide Febris schetica.

Febris focus, est ea animalis particula, quæ prima solidā suā in substantiā immodicè fuerit calefacta, quod in Ethicā febre primum est Cor, tum Jecur, tum Venter, tandem quæcumque alie in consensum Cor abripiunt. lib. de marcore. c. 7. Focus febris, est particula, quam vel obstructio, vel putredo, vel phlegmone obsederit. 11. meth. 20.

Febres

Febres Hecticas appellant, quæ solidas animalis partes occupant; sic dictæ, vel quoniam firmæ ac solutæ difficiles sunt, (quemadmodum habitus) vel quoniam ipsum corporis habitum comprehendunt. 1. de differ. febr. cap. 7.

Febris exquisitè Hectica est, quæ nullum particulæ accessionis, aut principium, aut incrementum, aut vigorem, aut denique remissionem habet: à solo autem cibo assumpto, hectica febres effervescent; aliæ ex toto æquales semper perseverant. lib. de marcor. cap. 8.

Febris Helodes, quæ & Typhodes, & humida dicitur, est, cum à prima statim die agrotantes sudant, sudoreque ipso parum, aut nihil levantur: E contra sicca, in quâ sitis urget vehemens, ac scabra visitur lingua, indurataque ad instar corii cutis, plurimusque, adest in corpore squalor. Adversus Lycum, cap. 2.

Febris Hemitritæus. Vide Febris Semitertiana.

Febris Hepiala, ἡπαλός, ex genere est quotidiana, quando ægri rigent simul, & æstuant, atque eodem tempore in toto corpore utrumque sentiunt affectum. 2. de differ. febr. cap. 6. quæ & Epialus appellatur. lib. de inæq. intemp. c. 8.

Febris homotona. Vide Continua.

Febris horrida est, in qua magna accessionis pars horrore consumitur. 2. de differ. febr. cap. 8.

Febris humida. Vide Febris Helodes.

Febris Hyemalis, ea est apud aliquos, quæ hyeme fit; apud alios autem ea, quæ hyemis tempore est peculiaris. 4. de rat. vict. 61.

Febres lividæ, à colore cognomen adeptæ sunt, quippe in quibus ægri cutis tota livida, & labia, qualia exes moris esse solent; ad hæc oculorum album livescit; sanguineum succum desicere, cum ipso itidem ingentum calidum, sum-

mè exhaustum quatenus nunciant, mortifera sunt, ex quibus nonnulla syncopas etiam efficiunt. com. i. in 6. de morb. vulg. 29.

Febris lipyria, λεπυρία, est, in qua intus in ipsis visceribus calor sentitur urens, aded ut neque valde subtilium vestimentorum, neque linteolorum velamenta, neque aliud quicquam, prater nuditatem ferre possint; in externis autem partibus, frigus adest. lib. de inaequali intemp. cap. 8.

Febrem magnam, aut parvam, consueverunt Medici appellare, non proprie quidem rei quali, nomen quanti accommodantes; hoc tamen facere assueti, non in febribus tantum, sed in mille aliis rebus, quae licet in qualitate subsistant, magna tamen ac parva dicuntur. i. de differ. febr. c. 1.

Febris marasmodies, sive febris marcida est, in qua omnes corporis partes, aequaliter marcescunt. lib. de marcor. cap. 5. Vide Marasmus.

Febris marcida, apud Philippum idem est, ac ex morbo senium; quamquam eam Galenus non vult febrem dici, cum in ea frigidius, quam natura postulat, Cor sit factum: ostendunt id, pulsus parvus & rarus redditus, respiratio parva, tarda ac per longa intervalla, quae & ipsa Cordis & parvum ad Cor pertinentium frigiditatem indicat. lib. de marcor. cap. 5. Senium igitur ex morbo, quoniam in illo frigiditas siccitati adjuncta est, febris non est; sed is tantum febris dici potest marcor, qui & torridus dicitur, & marcor syncopiticus; his enim ambobus est pulsus frequens & parvus, aegritudo dum oscitant, spiritum efflant calidum, ut jure ipsum ardori & aestui assimilare possis, qui marcor torridus, ex caliditate, ardentissimisque febribus, praesertim in sicciori corporis habitu, fit; frigidus autem marcor senilis, fit ex permutatione febrium, quae, tum per aqua

aqua frigida potionem, tum per ea auxilia, quae refrigerandi gratia hypochondriis, ac thoraci imponi solent, fuerint secus, ac oportet, refrigerata. lib. de marcor. cap. 5. Vide Ex aegritudine senectus.

Febris Mathemerina. Vide Febris diurna.

Febris mitis est, quae Medici manum non mordicat, neque exurit aut ferit admodum, vaporem aded minimè mordacem exhalat; hujusmodi est Diaria febris. Mitis autem dicitur, non simpliciter quidem, sed per comparationem cum febribus ardentibus; siquidem omnis febrilis calor sit igneus, acer & mordax, sed hic magis, ille minus. Vide Febris simplex.

Febris modos, nonnunquam mores vocant, nonnunquam differentias, vel essentias: cum e.g. dicimus, Febrim boni vel mali moris, esse benignam, vel malignam. i. de morb. vulg. 10.

Febris Pemphigodes, πεμφιγώδης, est, quae per caloris intensionem, pustulas in ore, Graecis Phlyctides dictas, generat. lib. finit. med. Insuper, Pemphigodes febres, per spirituum effluvium evanescentes interpretantur; sentimus enim plerumque, per febricitantium cutes, aërium quendam halitum effluentem. Dicitur quoque Pemphigodes, febris statulenta, vel statulosa; sed hanc plerumque vario modo interpretati sunt. Quidam diariam febrem intelligunt, natam ex spiritibus accensis: alii febrem madentem & humidam, ab effluvio quodam vaporoso, per cutem erumpente: alii eam febrem sic vocant, quod veluti exilientium, & manui occurrentium scintillarum opinionem praebet; vel ita appellatur pestilens, si uetè πεμφιγών, i.e. quae cum pustulis efflorescit. Quamquam possit etiam per Pemphigodé febrim intelligi Synochus non pu-

tris, quam ob id inflativam vulgus Medicorum vocat, quod calore febrili fervente, venæ omnes plurimum sint inflatæ, & sanguine flatuoso, & bulliente, plena. Verum Galenus in eam sententiam inclinat, ut Diaria intelligatur, quæ in spiritibus accensis, rarenter putrentibus, subsistit. com. 1. in 6. de morb. vulg. 29.

Febris pestilens est, quæ à calidiori ambientis aeris constitutione, (qualis maximè circa Canis ortum contingit) vel à putrescibili vaporatione, manifestè Cor calefaciente, excitatur. In Febris omnibus simul Cor affici est necessarium, & cum supra modum incaluerit, ipsum primum atq; potissimum febrilem calorem suscipere, atq; ad universum corpus transmittere. 1. de differ. febr. cap. 4. Vide Endemus.

Febres putridæ sunt, quæ ex humorum putredine accenduntur, cum rigore extremorum, frigore, vel horrore incipientes, inæqualitatem pulsuum habent, & calorem, sive in principio sive in augmento, acrè & mordacè: systole est velocior ipsâ diastole, urina cruda, ejusdem febris declinationem, integra non subsequitur quies. 1. de diff. febr. cap. 7. Generantur autem à præcedentibus causis, non à præincipientibus. Quæcunq; enim in ipso animali sunt vel dispositiones, vel motus præter naturam, ægritudinum præcedentes causas nominant; quæ verò extrinsecus adveniunt, & alterant corpus, atq; transmutant naturam vehementer, præincipientes appellant. de caus. morb. c. 2.

Febris putrida intermittens est, quæcunq; ad sensibilem infebrecitationem pervenit, ortum habet ab humore putrido, qui per omnes corporis partes, expultrice vi defertur. 2. de differ. febr. cap. 1. Cujus tres sunt omnino differentie, quotidiana, tertiana, quartana. Quotidiana, quæ

quæ ex pituita putredine est; ex urriusq; verò bilis, flavæ quidem, tertiana; nigra autem, quartana. 2. de differ. febr. cap. 2.

Febris quartana. Vide Febris putrida.

Febris quintana, sextana, septimana, est, cum ægri non prorsus ab affectione morbosa sunt liberati, sed semen aliquod retinuerunt; his usu venit, ut victum convenientem negligentibus, sæpè sexto die à principio febricitare, sæpè septimo, non raro octavo, vel alio; & cum febris statim periodi emanserint, ac cessaverint, ægris putantibus, se prorsus esse liberatos, eodemq; omnino victu utentibus, ex semine morbi reliquo, totidem diebus affectio febrilis prima redit. Non igitur ex vi morbi hic circuitus datur, sed ex residuo affectionis, & inordinato infirmorum victu. com. 2. in 1. de morb. vulg. 7.

Febris quotidiana. Vide Febris putrida intermittens.

Febris remissio sive Infebrecitatio, totum illud tempus est, quod accessionem sequitur: id ipsum tempus alii intervallum, alii declinationem, submisionem, vel ablationem nominant. de morb. temp. cap. 6.

Febris reversiva est, non acuta, sed diuturna, imperfectas habens solutiones, quæ postea rursum exoriuntur.

Febris sanguinis, est febris simplex, Synochus non putris dicta, in qua sanguis secundum naturam se habens, accenditur quidem, sed non putrescit, febris similis ephemeris, & quæ ex inflammationibus inguinum accidit; nam & inguinis inflammatio, ex bono sanguine, sed accenso, fit. 2. de cris. 12. Putrescit quidem interdum sanguis, sed ex eo simpliciores fiunt febres, quàm ex aliis humoribus; similem verò accessionum proportionem assumunt, qualem

tertiana febres ostendunt. Quod si sanguis supra modum affetur, pars ejus subtilior, ac pinguior, in flavam omnino convertitur bilem, quæ autem crassior, in atram, ut in carbunculis contingit, in quibus sanguine supra modum effervescente, ad melancholicum humorem fit transmutatio. 2. de differ. febr. cap. 9. Presentem itaq; febrem videtur reponere in ordinem febrium Synocharum non putidarum, quo etiam numerat febres diarias. 9. meth. 2.

Febris sçhetica, quæ faciliè discutitur, opposita est febrì hæcticæ, quæ difficulter solvitur: ut enim illa fit, ita hæc facta est. 8. meth. 1.

Febris semitertiana, sive Hemitritæus, *ἡμιτρίαις*, est, quæ ex quoridianâ continuâ, & tertianâ intermittente, complicatis confunditur, 2. de diff. febr. cap. 7. fit ex pituita, & flava bile sibi proportionem respondentibus & equipotentibus. Ibid. cap. 8.

Febris significatio, Græcis ἐννοῦσσις, est primus insultus, accessionis tempus indivisibile, exactè jam primum, lib. de morbor. temp. cap. 6. quæ & Annotatio dicitur, 2. aph. 1. Vide Insultus.

Febris simplex dicitur, quæ à primo statim die, acuta fit licet, non tamen supremè, sed simplicissima & cum tutissimis signis, invadit, quam Hippoc. ἀνέλεν, mitem nominat seu, boni moris. 1. de cris. cap. 16.

Febris singultuosa est, in qua ægri singultiendo, rodetem, acerrimumq; humorem evomunt, nec à singultu, donec febris in totum soluta sit, vel propè, liberatur. 4. acutor. 69.

Febres spirituofas quidam nominant, (quas Pernphigodes aliter appellant) ob difficile anhelitum, in quibus siquidem magnus creberq; spiritus redditur. comm. 1. in 6. de morb. vulg. 29.

Febris

Febris syncopalis, *συνκοπὴς*, est, ubi propter maximam crudorum succorum copiam, adeoq; oris ventriculi propter offensionem, præcordia instantur, totum corpus ampliore mole, quàm pro naturæ modo, cernitur, tum color ad albidius, vel lividius, vel nigrius, seu plumbei coloris tendit, pulsus minores, obscuri, & inæuales, & syncope etiam solet apprehendere ægros stomachica. 12. meth. 3. Est & aliud syncopalis febris genus, quod non ex crasorum & crudorum succorum copia fit, sed ex tenuibus succis, qui ocysimè exhalant, in quâ ægri syncope similiter opprimuntur. 12. meth. 6. Priorem vocat Avic. syncopalem humorosam; posteriorem, syncopalem minutam.

Febrem Synochon Græci Medici appellant, in qua una similisq; ferè accessio ab initio ad finem perpetuò manet; cum enim accessionis remissio ex ferventium humorum transpiratione contingere soleat, & verò in Synocho, ob vehementem stipationem, illi non transpirent, febrilem proin neceffe est multorum dierum fieri accessionem. 9. meth. 2. Vel ea est Febris synochus, quæ omni magnâ mutatione usq; ad judicationem caret; hæc Latinis Contingens dici potest. Caterum, etsi una sit idea hujusmodi febrium, à qua Synochos eas nominant; natura tamen earundem minimè simplex, unaq; est; quædam namq; earum manifestam habent putredinis notam, quædam verò prorsus non habent; quæ ex diariarum febrium genere sunt, illas vocamus Synochos putridas; hæc Synochos non putridas: Barbari hanc vocant Synocham, illam Synochum. Galenus 9. meth. & 2. de differ. febr. indiscriminatim utrâq; voce utitur, & Synochi & Synocha, utrâq; sub Synochi nomine comprehendens. Atqui Synochus febris,

bris, & Synoche, *Græcè συνοχὴ, & συνεχὴς, h.e. Continens, & Continua differunt, quòd in Synocho nulla sit febris remissio, in Synochis autem singulis, accessiones in remissionem sensibilem terminentur, neutra tamen ad infirmitatem pervenit. 2. de cris. 6. Vide Synocha.*

Febris tabida. *Vide Marasmus.*

Febris tertiana exquisita, est ea, quæ tertiâ quoque die, accessionem faciens brevem, cum frigore invadens, sudore, bilis vomitu, & biliosa dejectione terminatur in infirmitatem. Eadem sit à bile putrescente, cui si aliquid dictorum deficit, non exquisita, sed simpliciter tertiana dicitur, quòd si intermissio sit minor, & accessio longior, dicitur tertiana extensa. 2. de differ. feb. 8. & com. 2. in 6. de morb. vulg. 25. *Vide Febris putrida intermittens.*

Febres Tritæophyes, *τρίταοφύες, h.e. tertianarum naturam referentes, sunt, quæ tertio die invalescunt. 2. de diff. febr. cap. 2. Vide Tritæophyes febres.*

Febris Typhodes, *τυφώδης. Vide Febris Helodes.*

Fellis folliculus, est vesica fellis. 5. de loc. aff. 7. *Vide Cystis, & Choledocos.*

Femen. *Vide Interfemineum, & Perinæon.*

Femur, à ferendo, quòd totius corporis reliquum ferat, & sustineat veluti onus, idem ferè quòd crus, os, magnitudine cunctis animantis ossibus præstat, supra ex coxendicis, infra tibie ossi alligatur, cuius cervicis duo sunt exigui processus, quos Trochanteres vocant, quorum exteriorem, qui longè major est, Gluton, h.e. Natem appellant. lib. de ossib. cap. 21.

Fermentatio. *Vide Fervor.*

Ferina desipientia. *Vide Desipientia ferina.*

Fervor, sive fermentatio, affectus est, ab atra bile proveniens,

veniens, ubi amplius incaluerit aut propter putredinem, aut febrem phlegmonodem, quam nullum animal, ne ipsi quidem mures gustaverint; terra quoque raditur ab ea; ac partes, quæ ab atra bile raduntur, omnes in altum attolluntur. 14. meth. 9.

Fibræ, seu Villi, sunt tenues quædam & subtilissima nervorum, & ligamentorum propagines, filamenta, aponeuroses, & denervationes, quibus opitulantibus (perinde ut manus digitis) nervi & musculi actiones suas obeunt. 9. de usu part. 2. & 1. de placit. cap. 10.

Fibula. *Vide Cnemi.*

Ficationes. *Vide Sycosis.*

Ficarum, i.e. Jecur, sic dictum est, quòd omnium animalium partium compactissimum, ad coquendum difficile, tardèq; permeet, propterea mactandi animalis jecur, multarum siccicarum esu, præparatur, ut evadat se ipso melius, cum animal ipsum, caricas affatim comederit; quæ solâ ratione factum est, ut hanc appellationem sortiretur. 3. de aliment. facult. cap. 12.

Ficosus tumor, est tumor in mento natus, ex crassiori humore, & serosiori tenuitate, quam Varus. 5. de compos. med. loc. cap. 4.

Ficus in oculo, est tuberculum quoddam, à crassiori humore oculi partibus affectis adhaerente, com. 3. in 3. de morb. vulg. 48. *Græcis σῖνα & σῖναρος, eruptiones ulcerose sunt, rotundæ, subduræ, rubicundæ, quas dolor comitatur: sit hoc malum, magnâ ex parte, in capite, sed & reliquo etiam corpore: sit etiam in ano, & Marisca dicitur: in palpebris adhuc sit, & dicitur etiam σῖναρος, quòd scilicet sicut granorum referat similitudinem, undè ficosam appellant palpebram.*

Fistula,

Fistula, *ὄρυξ*, est angustus & longus sinus, lib. de tum. mor. cap. 5. per similitudinem dictus à musicis instrumentis, quæ oblonga obtinent cava, fistulæ nominari solita. 2. progn. 64.

Fistula urinaria, Urethra, Græcis est meatus in peæne, per quem urina redditur & ex corpore excernitur. 4. aph. 76.

Fistulosus, seu flatuosus nervus. Vide **Cavernosus**.
Flatuosus morbus. Vide **Hypochondriacus**.

Flatuosus spiritus, qui & **Flatus** dicitur, tumorem excitans flatuosum, crassus ac vaporosus est vapor, neutiquam tenuis; ille enim aëri austrino, hic verò aquilonari aëri assimilatur: hic in nobis secundum naturam est, & proin conservandus; ille verò seu crassus extenuandus ac corrigendus. 2. ad Glau. 6.

Flava bilis. Vide **Amara**.

Flexus variciformis, est plexus ille venarum, & articularum in testibus, in cuius primis flexuum partibus sanguis sincerus continetur, qui in ultimis ejusdem flexus vasibus, ad ipsos testiculos, non amplius ruber planè, sed quodammodo albitans exiguum adhuc requirit, ad perfectam substantiæ seminis generationem, quod ei à testiculis ipsis accedit. 1. 9. de usu part. cap. 4. Vide **Glandulosi** alsistentes.

Fluctuatio cum sonitu, Græcè *ἀόλαιν*, symptoma est facultatis concoctricis & retentricis, nec arctè satis, nec sufficienti tempore complectentis, eamq; ob rem insufficienter etiam concoquentis alimentum: unde eò diutius in ventre gravitas ex alimento manet, quò tardiùs concoquitur, præsertim cum nihil in eo continetur, quod verti in flatum possit, ventriculo vehemèter perfrigerato existent. Flu-

Fluxio, quedam est inflammationum causa, nempe quæ perinde ut inflammationes, non admodum occulta, tamen si quandoq; nullâ sensibili fluxione præcedente, membrum cõfestim patitur inflammationē. **Affectio**, inflammationem quæ generat, **Rheuma**, i. e. fluxio vocatur, ipsa verò passio, dispositio Rheumatica. 2. ad Glau. 2. **Fluxio** insuper dicitur pilorum defluxium, quod tabescentibus magnâ ex parte, atq; ex diuturno morbo convalescentibus, evenit. lib. finit. med.

Fluxiones ventris vocat Hippoc. cum semper & assidue, humida dejiciuntur excrementa, sine tenesmo, & lienteria. 1. de morb. vulg. 36.

Fluxus hepaticus est, in quo ob imbecillitatem hepatis, ab intemperie frigida inductam, alvi sedimina, aquæ, in quâ nuper mactata caro abluta est, redduntur similima. 5. de loc. aff. 7.

Fluxus muliebris, est sanguinis albi saniosi ex utero profluvium. 9. simplic.

Focile majus & minus. Vide **Cubitus**.

Focus febris. Vide **Febris focus**.

Fœrus (quo tempore in utero, semen, seminis speciem refert, ut in abortu & dissectione visum est) ab Hippoc. vocatur, ubi semen in uterum injectum, sanguine repletum fuerit, & Cor, & Cerebrum, & Jecur indistinctam quidem adhuc & informem, quandam tamen coagulationem, & magnitudinem alicujus momenti præ se tulerint, carneaq; appareat fortis substantia, nec amplius seminalis; unde neque genituram amplius, talem formam appellat Hipp. sed fœtum. 1. de semin. cap. 9.

Folliculus fellis. Vide **Fellis folliculus**.

Fomenta, & **forus**, sunt, qui per spongiæ, calidâ aquâ deco-

decoctionis alicujus simplicis imbutas, & expressas, alicui corporis parti fiunt. 2. de loc. aff. 1.

Foramen cœcum, idem est quod auditorius meatus. Vide Auditorius meatus, & Cœcum foramen. Cœcum dicitur, non quod reverà cœcum sit, sed ob flexuosam meatus auditorii obliquitatem: quæ causa est, cur funiculum, aut setam porcinam in hoc ipsum foramen immissam, transmittere non possis. 9. & 11. de usu part.

Foraminulenta ossa. Vide Cavernosa.

Foratio, est idem quod Perforatio sive Trepanatio, quâ utimur in fracturis Capitis, cum usque ad Cerebri membranas, Calvariam dividimus. 6. de compos. med. per gen. cap. 2.

Formatrix virtus, ex semine in uterum coniecto, statim temporibus, universas & singulas conflat partes, ejus, quod gignitur, herclè optima & summa ars, quæ omnia alicujus gratiâ molitur, sic ut nihil otiosum sit, aut supervacaneum. 1. de natur. fac. cap. 6.

Formica, aliàs Myrmecia, & selsilis Verruca dicitur. 2. meth. 2. Vide Myrmecia.

Formicans pullus. Vide Vermiculans.

Fornices seu testudines, quas Græci Psallidas, Latini *locadææ* vocant, est forma & figura concava, figurarum omnium ad patiendum difficilima, quâ formâ multa adificia configurantur, ad cujus similitudinem, pars Cerebri intrinseca quedam efformata, Fornix nuncupatur. 11. de usu part. cap. 15. Vide Camarion.

Foveola, est cavum ulcus, sed parvum, in nigro oculi, lib. finit. med.

Fractura. Vide Unionis solutio, & Rhegma.

Fractura caulatim sive ad instar disruptorum caulium

caulium, & in medio perfracti raphani facta. Vide Abductio.

Frictio (*τρίψις*) sicca est, cum corpus universum solis manibus vel linteolo, nullo admisto humido, aut pingui corpore, fricatur; cui opponitur frictio humida, quæ fit per aqua & olei admisionem: ubi enim, cum oleo aqua confunditur, haud facîle solubili misione coit, ita ut, quibus corporibus ita inungitur oleum, necesse sit, & plusculum inharere aquam; sola enim aqua, quæ foris circumfunditur, facîle defluit, & quæ in poros ingressa corporis, nullam habens ansam, promptè effluit, nisi oleum admisceatur. 3. simplic. cap. 25.

Frigus, non eodem modo in sanis, & ægris sumitur: in ægrotantibus enim aliud est, rigere, aliud, horrere, aliud, algere; Accessionis etenim insultus aliis cum rigore, alteri cum horrore, alteri cum sola frigiditate oritur. Quod si quis, cum nulla concussionè & agitatione corporis perfrigescit, nec corpus, nec omnino cutis inæqualitèr, & præter voluntatem eidem moveatur, perfrictio dicitur: non tamen hic riget, nisi motum concussionis inæqualem, & cutis, & totius corporis sentiat, usq; Rigor, *ῥίγος* dicitur; si verò cutem quidem perturbet, & per quosdam insultus quariat, corpus autem totum non commoveat, Horror, & Horripilatio, Græcè *ὀρῶς* nominatur. Et proin Horror, affectus solius cutis talis existit, qualis totius corporis passio, existit Rigor. lib. de trem. & palp. cap. 6.

Frons, *μετωπὸν*, est pars faciei supra oculos sita, & ad tempora usq; protensa, substantiâ musculosâ, & osse subiecto (quod Coronale vocant) constans, superposita superciliis, pilis nuda, inter utramque aurem sita. lib. Introduct. cap. 10.

Fugaces fructus, alias Horarii, & Horæi dicuntur, sunt, qui nascuntur eo tempore, quod Horam vocant. Est autem Hora, Græcis id anni tempus, in cuius medio Caniculam exoriri contingit. Tempus porro hoc, est dierum quadraginta, quo tempore horarii fructus constant, nonnulli jam declinantes, alii incipientes, alii in suo vigore, aut ultra vigorem, aut citra consistentes. Vocant autem ipsos horarios, non solum quoddam dicto fiant tempore, sed (ut mea fert opinio) ut ita ab his, qui ad reponendum sunt idonei, distinguantur, quando & triticum & hordeum, semina verealia, & omnia, æstivam quidem atq; anniversariam habent generationem, sed non citò corruptuntur sicuti propriissime horarii dicti fructus, ut cucurbita, mora, pepones, melopepones, persica, & alia id genus, quæ si quis in hyemem servare volens, exsiccata reposuerit, eo etiam modo veterem naturam, in contrarium imitabuntur. 2. de aliment. facult. cap. 2.

Fuliginosus vapor est, qui ex deustione assarorum elevatur. lib. de usu puls. 7.

Fuligo. Vide Fumus.

Fumus & Fuligo, vapores sunt, qui elewantur, ille quidem ex materiis semiustis, hic verò ex immodicè assis, ustisq;. Est namq; fuligo, vapor terrestris, fumus, mistio quædam ex terrestri, aqueaq; substantia. 8. meth. 5. utrumq; materie, ex qua oritur, adustum excrementum, quod in sublimè fertur significat, non secùs ac in febribus fuliginosum excrementum, expiratione & contractione arteriarum, natura, ex corpore expellit. 3. de præfag. ex puls. cap. 7.

Fulva. Vide Dichroma.

Funis brachii vena, est pars vena humeralis, quæ protenditur secundum diversas adjutorii (i.e. osis humeri) partes.

Partes. lib. de anat. viv. & de ratione cur. per sang. cap. 16.

Fungos, vocant crassas palpebrarum eminentias, item ex capitis vulneribus quæ nascuntur, πῦμα, ὥς ἔχειτο. Gal. com. 3. in 3. de morb. vulg. 49.

Furcula superior, & inferior. Vide Claves.

Furfuratio, quæ & furfur, & πύρρον appellatur, est, cum quibusdam se scalpentibus furfuribus similia, ex capitis cute decidunt, à vitiatæ succis nutritis provenientia. 1. de compos. med. loc. 6. ubi affectus hic Pityriasis dicitur.

Furor. Vide Melancholia.

Furor æρωσμός, amatorius, qui ex amore fit; perinde atq; is, qui ex Musis, μεδονένος dicitur.

Furunculi, Dorthienæ, ὁδὸν Græcis dicti, tumores sunt præter naturam, ex genere phlegmonum, ex similibus humoribus, quibus & Vari geniti, exerentes sese per universum corpus. Duplices sunt, aliqui, ut ita dixerim, variosi, duri, & ægrè concoctiles; aliqui inflammatorii, adnexas habent febres, ubi tumor in magnitudinem excrescit, & in pus transmutatur. 5. de compos. med. loc. c. 7. Estq; furunculus mitis quidem, cum in ipsa sola cute constituitur; malignus verò, cum alrè exoritur, Phymati, i.e. tuberculo similis, à quo solà duritie differt. 1. de tumorib. c. 15.

Fusaneus morbus est, qui omni loco & tempore fit. Gal. lib. finit. med.

G

GALIANCONAS. Vide Ancos.
Ganglia, γάγγλιον, Avicenna & Paulus vocant glandulas, apostemata sunt glādulosa, sicut avellana, & nux accidunt, super manus & frontem, compressa digitos effugiunt, & mox redeunt, & aliquando multiplicantur, quandoq; impositione, & sorti alligatione lamina plumbea

curantur & discutiuntur: passionis has etiam Contractiones vocat Gal. 5. de compos. med. per gen. cap. 7. Paulus lib. 4. cap. 16. Vocantur etiam & Ganglia, quasi concrectiones, & contortiones quadam, ex lentis & mucoso humore a. crescente & conglomerato, quod proprium nervorum alimentum est. 2. de artic. 56.

Gangrena, γάγγραινα, est alicujus membri mortificatio, ex magnitudine inflammationis, quæ adhuc fit, non autem, quæ jam facta est. 2. ad Glauc. 9. Nam cum omnino membrum effectum est demortuum, ita ut punctum, vel sectum, vel ustum, non sentiat, quæ patitur, statim id ipsum rescindere oportet, quæ sanam partem vicinam attingit, sed quod ita affectum est, denigratur; quod verò in medio est constitutum, ita ut tendat ad mortificationem, Gangræna nominatur. Ibid. Vide Syderario. Hippocrates Gangrænas quoque, emortuarum venarum torporem, nominat, qui ex nimia inflammatione consequatur. 2. de fract. 24.

Gargareon, sive Gurgulio, Cion, Columna, Curgulio, est ea gutturis pars, quæ faucibus adjacet, cum secundum naturam se habet; cum autem morbo afficitur, ita ut ejus extremitas phlegmone laborans, sit similis acinuro, dicitur Uva: quando tota hæc pars afficitur, Cion, Columna. Dicitur & Himás, Græcis γάργαραν, γάργαραν, novis, iad. 4. de loc. aff. cap. 3. Id ipsum Gargareon quia ad vocis modulationem fit, ideo a quibusdam plectrum, πλῆκτρον, i. e. vocis refractorium appellatur. 7. de usu part. cap. 5. Hanc eandem partem, Columellam, Staphylem, & carnosam particulam summo ore dependentem vocant, 6. de compos. med. loc. cap. 3. Vide Columella, Pharynx, Staphyle, Epiglottis.

Gastrocnemion, est posterior tibiæ pars carnosæ, seu tibiæ

tibiæ venter, (ut anterior tibiæ pars carnis expers, dicitur Anticnemion, ἀντινῆμιον,) Græcè γαστρονῆμιον ἢ γαστρονῆμια, Sura appellatur. lib. de muscul. diff. cap. 32. & 2. de anat. adm. cap. 4. Vide Sura.

Gastrophia, i. e. abdominis sutura. 5. de anat. adm. cap. 6.

Gemelli. Vide Nares Cerebri.

Genæ, alias Malæ, γένυς, faciei pars sunt, quæ inter nasum & aures sitæ sunt, quæ benè coloratis & ingenuis, pudore suffusis, rubent. lib. Introd. cap. 10.

Genion. Vide Mentum. lib. de muscul. dissect. cap. 2. Vide Mentum.

Genitalis meatus, quem varicosum assistentem vocant, maxima illa via est, quæ genituram, à testibus haustam, ad Colis radicem desert. 1. de semin. cap. 15.

Genituram, appellat Hippoc. illud, quod in abortu reiectum, vel dissecto utero exiens, seminis speciem representat, non autem animal constitutum; id quod primis duobus mensibus solet accidere, quo tempore neque fœtum, neque embryon vocat, sed genituram. 1. de sem. cap. 9. Genituram etiam aliquando appellat, membra genitalia, & in feminis quidem uterum, in maribus verò, seminaria vasa quæ nuncupantur. 3. de art. 41. Vide Cyema. Frequentius autem genitura sumitur, pro semine recenter emisso, vel in suis vasis adhuc contento, Græcè γόνι. Hipp. lib. de natura pueri.

Genu, Græcè γόνυ, est femoris & tibiæ dearticulatio, & artificiosissima connexio, & talis quidem, in quâ sinus quidam prominens, alterius caput excipit, quod anteriori parte, quò firmitus fieret, rotulâ seu patellâ munivit, quam ῥοτὴλη, & ἐμπόδιον vocant, quæ prohibet, ne femur cur-

vatis, aut per declivia currentibus loco excidat, & dilabatur. lib. de osib. cap. 21. 22. & lib. Introd. cap. 10.

Gerocomica, γερωνικὴ, est ea Medicina pars, quæ senes regit, iisdemq; convenientem vitam ac victus rationem præscribit: de part. art. medic. cap. 5. De qua incertum, an ad γερωνικὴν, an ad ὑγιαίνουσαν pertineat, cum senum corpus neutrum sit, plures tamen eam salubris Medicinæ partem esse statuunt.

Gibba Hepatis. Vide Sima.

Gibborositas, quæ Græcis γίββωσις dicitur, est distortio spinæ, in posteriore parte. 3. de artic. 2. Vide Cyphosis, & Incurvatio.

Gibbus est, ubi inter distractas vertebrae, vel una, vel plures illæ permanserint; sit, ubi unica duntaxat vertebra, aut etiam duæ, aut tres, sese deinceps consequentes distrahuntur, eâ parte, quatenus spinam cavari contingit. 4. de loc. aff. 5.

Gilva emplastra. Vide Dichroma.

Gingivæ, γλῶσσαι, carnes sunt, quæ sunt circa dentes, 9. de usu part. cap. 15. ubi primum è locellis suis & alveolis emergunt. 5. de compos. med. loc. cap. 8.

Ginglymos, species est Diarthroseos, quæ ossa, sese invicem ingredientia, conjunguntur, ita ut unum idemq; os excipiat simul & excipiat: sic ergo connectuntur, e. g. ut vertebrae inter se, ac cubitus, humerusq; colligantur. lib. de osib. in proem.

Glabrities. Vide Madarosis.

Glacialis humor. Vide Crytallinus.

Glandium. Vide Thymus.

Glans, est finis, & extrema totius Colis pars; cutis, quæ eam vestit, præputium dicitur. 5. meth. cap. 13. Quæquam Aristot.

Aristoteles 1. de hist. animal. cap. 13 dicat, cutem, quæ Glandem integit, carere nomine, & totum, quod ex ea cute, glandeq; constat, præputium appellat. Dicitur alio significato etiam glans, suppositorium, quod clysteris loco sedi inditur. 6. de compos. med. loc. cap. 3.

Glandula, corpus quoddam carnisforme est, laxum & fungosum. Glandula (inquit Gal.) utiq; velut cunei quidam, vasorum divisionibus incumbentes, fulcimentum ipsis suggerunt, ut à nullo violento casu afficiantur. 4. de usu part. cap. 20. Glandulam etiam suppositorium vocat, com. 2. in 1. prorrh. 6. Glandulam etiam Thymum dicunt, 3. de aliment. facult. cap. 6. Sunt autem propriè sic dictæ glandulae, (quas Adenes vocant,) imbecilliores corporis partes, ad quas valentiores corporis partes, supervacuæ & sibi tùm quantitate, tùm qualitate adversâ transmittunt; quippe valentius est arteriarum, venarum, nervorum, musculorum robur; imbecillius autem, aut prorsus nullum, quam corporum glandulosoformis natura. 13. meth. 5.

Glandulae laryngis, sunt corpora laxiora, & fungosiora cæteris glandulis, laryngi utrinq; adjacentes, facta à natura, ut partes omnes, quæ tùm ad laryngem, tùm ad fauces pertinent, humore ad ipsas largiter decumbente persunderent. 7. de usu part. cap. 17.

Glandulosi assidentes, vel astites, vel parastatæ, vasorum seminariorū plexus, seu flexus variciformis, plexus Capreolaris, & Hæderarius, 1. de sem. cap. 12. homonyma sunt, significantia duo vasa, venam scilicet, eiq; subjacentem arteriam, flexus multos numero æquales, instar capreolorum quorundam, variè complexorum efficientia, quo in implexu, sanguis & spiritus, qui ad

testes feruntur, diutissime coquantur, ipsumq; semen elaboratur, iidem flexus postremi in testes terminantur, qui testes, laxi & cavernosi, chymum, qui in vasis incepit concoqui, excipientes, exactius percoquunt, & perfectam seminis formam ubi adeptus est, id ipsum per aliud vas, quod ad pudendum porrigitur, semen ejaculantur: quod vas spermaticum maribus latum & longum, seminis angustum & breve natura concessit. 14. de usu part. 10. & 11. Varicosum alsistentem vulgus Vasa deferentia appellat, uti vasa sepe priora, præparantia. 1. 1. de semin. c. 15.

Glandulosa corpora, primus Herophilus, αλυσσίδες νεφροτάς, quasi glandulosos præfides, aut prostates appellavit: sunt illa, utraq; parte colli vesica, locata; in iisdem humor quidam, spermati similis, crassus, viscosus, verum longè tenuior continetur, qui in coitu simul unà cum semine elabitur, reliquo autem tempore omni paulatim congeritur: cujus usus est, ut ad Venereum coitum excitet, & in coitu delectet; deniq; ut ad instar olei meatum urinarium humectet, & inungat adversus urinæ rofionem, & ne exsiccatus confideat, prohibeatq; quod minus per se lorium ac semen facile feratur; in masculis glandes hæc (alias vesiculæ seminariæ dictæ) notabilis magnitudinis sunt. 14. de usu part. & 1. de semin.

Glaucosis, γλαυκώσις, Glaucedo, est oculorum affectus, ex immodica siccitate, vel concretionem humoris crystallini, vel ex largiori ejus evacuatione (qua in computationibus accidit) progigni solitus, cæcitatem præ omnibus aliis, qui oculis accidunt, morbis maximè inferens. 10. de usu part. cap. 6. Glaucoma verò (γλαυκωμα) est naturalium humorum, in glaucum colorem mutatio. lib. finit. med. Diciturq; id oculi vitium, quod ortà suffusione, ex humo-

humore circa pupillam valdè concreto, & resiccato contrahitur, & oritur: undè Glaucedo à siccitate est, ut Glaucoma ab humiditate: & propterea Gal. 3. aph. 31. dicit, Glaucoma speciem esse *σφοδρῶς*, i.e. Suffusionis; non tamen docet esse eundem morbum: differt enim suffusio, tum à Glaucedine, tum à Glaucoma; quod suffusio extranei humoris, & aliunde influentis concretio; glaucedo verò ipsius humoris crystallini est densatio, & resiccario. Nec omnes suffusiones tantæ sunt, ut toti pupilla prætendantur, & visum ex toto adimant; Glaucoma verò crystallini universi est, atq; siccitas, per ipsum totum ex aquo diffusa, & ex siccitate concreto. Ad hæc, pleraque suffusiones curationem recipiunt, cum tamen nullum glaucoma curetur: uti nullus alius morbus, ab immodica siccitate proveniens, facile & plenè curatur.

Glaucedo. Vide Glaucosis.

Glaucoma. Vide Glaucosis.

Glene est, quod in superficie extremi ossis, tum caput, tum sinuum, situm est, ab ocularis sinus similitudine sic dicta. lib. de ossib. in proem. Vide Articulus.

Glenoides, sunt duo sinus leniter cavi, in inferiore summa verrebbe parte, (quos ab ocularis sinus similitudine sic appellant) similes superioribus: quanquam sinus superiores, (cum caput ipsum excipiant) non abs re sunt majores; infrià verò minores sunt, qui verbram secundam admittunt. lib. de ossib. cap. 8.

Glossocomion, aut Glottocomion, machina quædam est, in qua extenduntur & vincuntur fracta membra laqueis, ad justam eorundè distentionem. 7. de usu part. c. 14.

Glutia, Græcis γλῦττα; i.e. parvæ nates Cerebri, sunt tenues ac prælongæ Cerebri eminentiæ, ex utraq; parte

illius meatus, qui spiritum ex medio Cerebri ventriculo, in Parencephalidis ventriculum transmittit, quarum concursus, hominum conjunctis inter se femoribus, sive nati-
bus, rectissime comparaveris. Sunt autem, qui Didymis, h.e. testiculis, ea assimilantes, malunt vocare Didymia, sive testes; quæ verò his proxima, glutia. 9. de usu part. cap. 14.

Glutinatorium medicamentum, quod & sanguinarium, cruentis opitulans, & enæmon dicitur, est, quod vulneris oras committere & glutinare molitur. 3. de compos. med. per gen. cap. 2.

Gluton, h.e. Natem, appellant alterum ex duobus processibus cervicis, ossis femoris, qui major, & exterior, & gibbus est. lib. de ossib. cap. 21. Vide Femur.

Glycea medicamenta sunt, quæ vel purgant, & vel acres humores indulcant quasi & alterant. lib. de Dynamid. in proem.

Gnaton. Vide Echmyodes platysma.

Gomphos, Latinis Clavus, affectus oculi est, in quo pupilla egrediens, pelliculas Uveæ, superficie tenus operit, undè ejus forma sit quasi clavus. lib. de ocul. cap. 11. Vide Clavus.

Gomphosis, Synarthroseos species est, cum ad instar clavi, os, ossi, infixitur: vel tum os unum, alteri penitus est infixum, ita ut ne tantillum quidem (veluti dentes suis alveolis) moveatur. lib. de ossib. in proem.

Gonorrhœa, est seminis invita & assidua excretio colore non extenso. Gonorrhœæ autem nomen planè compositum est, ὄντος & ῥέειν, ὁρῶν γόνιμα, quasi seminis genitalis fluoris, ob imbecillitatem retentricem continentium ipsum corpus. 6. de loc. aff. 6.

Gracilis sive tenuis pulsus est, in quo longitudinis dimensio,

dimensio, quodammodo duabus reliquis dimensionibus præstat; in quo autem duæ reliquæ superant longitudinem, pulsus hujusmodi turgidus, sive crassus appellatur. 1. de differ. puls. cap. 5.

Grando, est tumor crassus, in partibus interioribus palpebrarum coagulatus, grandini haud ab similis. 1. de ocul. c. 9.

Graphioides, aut Belenoides processus, graphio, seu stylo, & acui similes, eamq; ob rem styloides dicuntur, a columna specie, quæ partibus hujusmodi sese offert, tenues ossium capitis processus appellant. 10. de usu part. cap. 4. Præterea, Graphioides & styloides processus, est cubiti processus, quem è directo parvi digiti porrectum, à graphii seu styli modo, Græci distectores sic vocant. 1. de anat. adm. cap. 10.

Gravativus dolor. Vide Dolor tristis.

Gravedo, sive Coryza, est tenuis & incoctus humor, qui per nares secernitur. 2. progn. 49. Hunc Gal. docet non esse pituitæ speciem, ut quidam falsò asserunt, sed excrementum, à Cerebro destillans, tenue, aut crassum, quod tum in senibus, tum in iis, qui ratione quavis sunt perfrigerati, plurimum acervatur. 2. de natural. fac. c. 9. Vide Coryza.

Graveolentia. Vide Beneolentia.

Gravis, seu gravativus dolor. Vide Dolor tristis.

Gressuram, γρηξάρα, vocat Hippocr. eorum id, quod inter inguina utriusque cruris est, cujus mediam partem πειναιον nuncupat, Latinis interfemineum, eò quod duobus feminibus interjacet. Est intestinum, seu intercapedo, quæ ab exortu pudendi, usq; ad anum pertingit ubi etiam vesicæ collum collocatum est. 4. de artic. 45.

Grumus, Græcè θρόμβος, est concretus sanguis. lib. de atra bil. cap. 2. & lib. de tumor. cap. 2.

Gui-

Guidez venæ. Vide Apoplecticæ.

Gula. Vide Oesophagus.

Gurgulion. Vide Staphyle, & Gargareon.

Guttur. Vide Larynx.

Gutturulos, i.e. *ἑρῆες*, quasi gutture milos, vocat Hippocr. eos, qui prominentia in anteriorem partem guttura habent: guttur enim (*Γράς ἑρῆων*) vel totam asperam arteriā nominat, vel fauces tantum 3. de artic. 8.

Gynæciæ, *Γυναικείας*, i.e. mulierum passionēs: lib. de Gynæciis.

Gynæcomaston, i.e. muliebris mamma, & subjecta additaq; mammis pinguedinis, auctio est, præter naturam. lib. finit. med. *Γυναικωµαστόν*, muliebrum mammarum summum incrementum; τὰ δὲ γυναικεία, muliebria sunt & menstrua mulierum purgationes.

H

HABITUS, est partium nostri corporis structura, constitutio, & compositio: quā ratione dicimus, Huius corpus esse habitus solidi, compacti, rari, cuius varione etiā corpus rarum facile evaporatur, & syncopen incurrit, habitus verò densiores in morbis cunctatè diutiusq; laborant. 2. de rat. vict. 47. Præterea, Habitus nomen usurpamus, de omni re, quā cōstans est, & egrè amovetur: unde & sanitatem bonam habitudinem dicimus. lib. de bona habitudine. & 4. de rat. vict. 25.

Hæderarius flexus. Vide Glandulosi assistentes.

Hæmalopa, est cruenta suffusio, ad plagas oculi illatas oboriri solita, 4. de compos. med. loc. cap. 8. & proin suffusio in oculis, ex plaga aut ictu, aut effusio, sub contusum locum, sanguine. Unde Archigenes dicebat, Hæmalopa idem malum esse cum Hyposphagmate, nec in oculis

oculis duntaxat, sed etiam in omni alia corporis parte, posse contingere.

Hæmatosis, i.e. sanguificatio. Vide Hepar, & Sanguificatio.

Hæmodia, est affectus, dentes, gingivasq; infestans, cum quāpiam & austeros, & acidos cibos ingesserit, adeoq; dentium quidam quasi stupor, cui porulacam manducatam mederi, experientia probat. 2. de loc. aff. 6.

Hæmophobus, i.e. sanguinis mittendi timidus. 9. meth. 5.

Hæmoptoicus is est, qui sanguinem spūto ejicit. lib. 7. de compos. med. loc. cap. 4. sive vomendo, sive tussiendo, sive streando, sive simpliciter expuendo, rejiciatur. 4. de loc. aff. 5.

Hæmorrhagia, i.e. sanguinis eruptio, & abundans effusio, quā si per magnum vulnus fiat, per largum obitur fluxum; sin angustum, manat per foramen, ut in venis secandis rivulose exire solet. Differt autem Hæmorrhagia ab Hæmorrhoidē, quod illa sit abundans effusio sanguinis ex venis indifferenter qualibuscunq; hæc verò effusio sanguinis, ex ani, sedisve venis per dissultationem ac paulatim facta, ut quā ut plurimum memoratorum vasorum ob erosionem oriatur. lib. finit. med. Unde Hæmorrhoidas, sanguifluas venas, in ano existentes, appellant. 4. de art. 40.

Hæmorrhoides. Vide Hæmorrhagia.

Haliruosa, seu Vaporosa sunt, quæcunq; per cutem foras exhalare apta sunt; Humida, quæ per vesicam; Sicca, quæ per alvum, quippe à vincenti in singulis eorum substantiā, nomina ipsis imponuntur. Contraria haliruosis & diureticis, dicuntur Emplattomena, quæ exiguis meatibus cutis, & vesica inbarentia obstruunt, & ea, quæ per

per cutim, & urinas expurgantur, p.n. in corpore decimēt; quæ verò opponuntur solutivis, dicuntur stryphna, quòd valenter adstringant. 8. meth. 2.

Halituosus vapor & spiritus, ex partium humiditatibus, ad summum concoctis, in tenuem halitum, virtute insiti & validi caloris lente solutis factus, insensibili transpiratione in ambientem effluit; ubi verò calor imbecillior est, vel naturalis humor, cum semicoctus, cum crassus, cum glutinosus, atq; particula densior, ibi crassior excitatur halitus, quam ut transpirare possit. 14. meth. 7.

Harmonia in ossibus, species Synarthroseos est, in qua ossium structura, per simplicem lineam fit. E. G. Maxilla superioris, ad-hac narium & quadam etiam Capitis ossa, ad hunc modum inter se juncta. lib. de ossib. in proem.

Heberudo, & offuscatio visus, est summa offusio visionis, sine causa manifesta. lib. Introd. cap. 15. Græci vocant ἀμβλωσις, Arabes guttam serenam: differtq; ab Amblyopia (ἀμβλωπία) in eo, quòd magis in illa, quam in hac leditur visio.

Hectica febris, duplicem habet significationem; sic enim dicitur omnis febris, quæ soluta difficilis est, (sive sit pituitosa, sive melancholica, opposita tñ & ista, h.e. febris soluta facili.) Altera verò significatione, speciatim magis dicitur Hectica febris; quæ & putrida, & diariæ opposita, dicitur Hectica, quod in habitu corporis æquæ appellant, tanquam in subiecto consistat: est enim hectica febris, calor præter naturam in solidis partibus ipsius Cordis accensus. Vide Febris hectica.

Hecticus pulsus, perinde ut Febris hectica vocatur, qui nō magnoperè ullo modo varians, manet sibi in perpetuum

uum similis, coheretq; nec solvitur unquam, quòd totius corporis habitus, in ejusmodi febribus, & pulsibus, morbum induit. lib. de pulsib. ad Tyrones, cap. 8.

Hecticus spiritus, seu insitus, & naturæ partium substantia complantatus, spiritui influenti opponitur naturali, & animali, in universo corpore, cum primis solidis corporis in partibus continetur, ex quo quippe composita sunt, iisdemq; nec divisis, nec condensatis, nec è loco suo moris conservatur, resolvitur autem spiritibus influentibus intensus, ut in phreniticis, vel dissolutis, ut in lethargicis, vel iis, qui cardiaco affectu laborant. lib. Introd. cap. 13.

Hedra, sedes, anus, podex, dicitur & Græcis alio nomine ἀκρόβυλος, & ἡγεμόνιος: est autem meatus ventris inferior, continendus, & è corpore egerendis excrementis destinatus. Adhuc Hedra apud Hipp. lib. de vulnerib. Capitis, est ossis fractura species talis, ut in eo teli vestigium remaneat, atque appareat, quæ telum infederit. Hippoc. lib. de vulnerib. Capitis.

Hedysma, i. e. unguentum odoratum. 1. de compos. med. loc. cap. 2.

Hegemonica, ἡγεμονικά, i. e. principes animæ virtutes, sunt rectrices, & animales, quæ in capite collocantur, videlicet facultas imaginatrix, ratiocinatrix, & recordatrix. lib. de sympt. diff. cap. 3.

Helcydria, i. e. pustula ulcerosa, in capite genita. 1. de compos. med. loc. cap. 9.

Heliolis, ἡλιόεις, insolatio, est corporis in Sole apricatio. Remedii genus est, veteribus Medicis usurpatum variis modis: alii enim ad Solem ejusq; radios exponebantur, sive stantes sive ambulantes sive jacentes; quo remedio, pramissa per alvū evacuatione jurebatur Hydriopici, Ischiadici, Nephri-

Nephritici, Paralytici, Elephantici, Celiaci, Hysterica mulieres & albâ uteri fluxione laborantes, & Cephalalgici, ubi ex eo auxilio, corporis perspirationem uberiores, sudores, alvi adstrictionem, adipis consumptionem, tumorum laxorum, tum maxime hydropicorum detumescientiam, facilem respirationem, omnisq; superflui humoris absorptionem fuissent consequuti.

Helos, sive Clavus, est callosum tuberculum, album, rotundum, capiti clavorum simile, toto in corpore proveniens, quod pedum cumprimis in plantis, digitisq; & calcaneis, accidit, & oculis. Vide Clavus.

Helodes febris. Vide Febris Helodes.

Helosis, est curva, ac reflexa palpebræ everfio, utroq; oculi musculo convulso, partem Tarsi sibi continuam ad sese trahente; id quod in magnis morbis magnum malum significat. Ipsam hanc palpebrarum contorsionem Hipp. vocat Campylon. 10. de usu part. cap. 9.

Helminthes. Vide Elminthes.

Hemitritæos febris, ἡμιτρίτος & πυρετός, Semitertiana febris. Vide Febris semitertiana.

Hemicrania, aliàs Heterocrania, Græcis ἡμιγαστρίτις & ἡμικεφαλῖτις, affectio est dolorosa, circa dimidiam capitis partem, modò dexterâ, modò sinistram, (juxta suturam sagittalem quæ terminatur) ut plurimum per circuitum exacerbatur, plerisq; circa temporum musculos dolentibus, quibusdam in vertice capitis, quidam verò aded vehementer dolent, ut ne manuum contractum faciliè ferant, in quibus pellicula Calviam ambiens, læsa est. 2. de compos. med. loc. cap. 3. Estq; & aliud Hemicraniæ genus, quod Sphacelodes nominant, videlicet convulsorius, dimidia partis capitis dolor. 2. de loc. aff. 7.

Hemi-

Hemiplexia, ἡμιπλῆξία, i.e. Paraplegia. Vide Paraplegia.

Hepar, Latinis Jecur, est membrum princeps, quod in dextro hypochondrio collocatum, venarum omnium principium, & primum sanguificationis, sive hamatoseos officina, & instrumentum est, & nutrientis virtutis fons. 4. de usu part. cap. 12.

Hepatica vena. Vide Axillaris.

Hepaticus affectus, est jecoris imbecillitas citra phlegmonem, cum nutrimentum per vasa, quæ in mesenterio sunt, veluti per ora quadam, semicoctum attraxit, & per eadem, id ipsum semicoctum ablegat in intestina, unde oritur excretionis species, maxime similis loturæ carniū cruentarum, ac recenter enectarum, seu, quod idem est, aquosi sanguinis: atq; hoc quidè symptoma semicoctorum ciborum vomitioni, ob p.n. affectum ventriculi quæ excitatur, proportionatum est. 3. de sympt. caus. c. 2. Eos igitur, qui sic affecti sunt, & quibus visceris hujus vires fuerint imbecillæ, Hepaticos vocat, affectumq; hunc, hepaticum fluxum, alium à Dysenteria facit. 5. de loc. aff. 7. Affectio hæc, hepatica appellata, veluti etiam & Cœliaca, & Stomachica, citra rumores præter naturam, circa ipsas partes contingit, ut docet Gal. 8. de compos. med. loc. cap. 6.

Hepiala febris, ἡπιᾶλα & πυρετός. Vide Febris Hepiala.

Hepsema, i.e. Sapa. Vide Aporhermon.

Herculeus morbus. Vide Comitialis.

Hermaphroditus, complexus est masculini sexus & feminini, utroq; etiam simul genitale proprium obrinente. lib. finit. med.

M

Hernias. Vide Ramex, & Celas.

Herpes, aliàs Serpigo, est repens inflammatio, ex sincera flava bile, suam servante naturam. Quae ipsa bilis flava si cum sanguine per totum corpus deferatur, morbum facit, qui Icteros, i.e. Regius appellatur; sola verò quando ab aliis succis secreta est, & in aliquo externo membro consistit, Herpes vocatur: quæ si crassa sit, totam exulcerans cutem, usque ad subjectam carnem, Herpes exedens, sive ἐδιδούρων, sive Phagedæna; si verò tenuior fuerit, id, quod in superficie est tantum veluti deurens, generis sortitur appellationē, ac simpliciter & sine adjectione Herpes vocatur. Herpetis species altera miliaris, Græcis Cenchria vocatur, quoniam parvæ pustule ac multæ per summam cutem, similes miliis, in ea excitantur, quæ non protinus ulcus faciunt, quemadmodum alter, sed interposito tempore in ulcus abeunt. 2. ad Glau. 1. & 6. aph. 45. Est autem omnis Herpes ejusdem generis cum Erysipelate, atq; hujus quoq; magis cum eo, quod exulceratum est: differunt autem humoris tenuitate; est enim admodum tenuis, qui Herpetem excitat, aded ut non solum interiores partes, substantiâ suâ carnosas, transeat, sed etiam cutem ipsam, ad summam usq; cuticulam rûmerodat, rûmerodat, per quam si sudoris vice transiret, haudquaquam ulcus excitaret. 14. meth. 17. & 2. meth. 2.

Heterocrania. Vide Hemicrania.

Heterogeneum. Vide Dissimilare.

Heterorhythmum pulsus vocamus, qui alterius ætatis habet rhythmum. lib. finit. medic. Vide Pararhythmus.

Hexis. Vide Affectus, qui & Schefis dicitur.

Hiatuli, οὐδωδωρτες Græcis, ii sunt, quorum venter, inter-

inter comedendum in ore invenitur: quod accidit in vehementiore appetentiâ, & fame nimia, in qua, venter nonnullis animalibus sursum procurrit; aded ut nonnulli foras repere sibi ventrem dicant, aliis verò cibos, quod adhuc mandunt, necdum satis eos ore confecerunt, famelicus ventriculus eripit planè invitis. 3. de natur. fac. cap. 8.

Hydroa, pustula quedam sunt genitalium partium, summam cutem occupantes, & exulcerantes. 3. aph. 21. Oriuntur, ut ipsum nomen ostendit, ab earum partium sudore acri, bilioso & mordaci, qui persicilè iis in partibus putrescens, pruriginem movet, cutemq; velut ulceribus exasperat. Dicuntur & Intertrigines. 6. de simplic. cap. de Balauftio. Græci vocant ἰδρώα, & παρὰ τὴν ἀκρίαν. Plinius vocat Attrita. Vide Sudamina.

Hidròs, sudor, ἰδρὼς, est humidum tercia concoctionis excrementum, per cutem in aqua speciem erumpens. Vide Sudor.

Himàs, Græcis ἰμᾶς, affectus est Gurgulionis, à corrigiarum similitudine sic dictus, cum longior, gracilior, sicciorq; evaserit; (talís enim Loro, quod Græci ἰμᾶς nuncupant, non ineptè comparari potest.) Differt à Cionide, quod in hac Gurgulio non extenuatus est, sed crassitiem, ex fluxione solito majorem, ut plurimum adeptus esse videtur.

Hippocratica facies. Vide Facies Hippocratica.

Hippocraticum scamnum, est machina quedam, quam Hippocr. consulit præparandam iis, qui in aliquâ magnâ urbe curaturi sunt. 1. de artic. 4.

Hippos. Vide Equus.

Hirquæ. Vide Anguli.

Homiomeres & Homæomeres, ὁμομερές, homogeneæ, i.e. similes, elementares, & primæ corporis nostri

particula, 6. de sanit. tuend. cap. 2. quas etiam prima corpora vocat, 8. de placit. 8. quæ in ejusdem nominis & essentia portiones omnes dividuntur. l. de morb. differ. c. 3.

Homonyma duplicia sunt, aliqua quidem nullo pacto inter se communicantia, & convenientia: ut, cum Canem dicimus terrestrem & marinum, atq; hæc æquivoca dicimus, alia verò, quæ cum synonymis, i. e. univocis aliquatenus conveniunt, quatenus ab uno factam appellationem habuerint. lib. 4. de vict. rat. 13.

Homoplatæ, aut Omoplatæ, aliàs opertas scopulas vocant, partes sunt, quas ii, qui toto thorace respirant, attollunt sensibiliter & notabiliter, ex difficultate respirationis, præcordia sursum variè & inæqualiter trahentes. 10. meth. 8. Vide Omoplatæ.

Homotona. Vide Continua, & Epacmafrica.

Horam, vocat Galenus id tempus anni, in cuius medio Caniculam exoriri contingit. 2. de aliment. facult. cap. 2. Vide Fugaces.

Horarii fructus. Vide Fugaces.

Horectica medicamenta, quæ cibi fastidium aufe-
runt, & appetentiam ejusdem cient & intendunt. de Dynamid. in proem.

Hordeolus, est apostema, nascens in extremitate palpebrarum. lib. de ocul. cap. 9. Appellaturq; tubercula hæc, Crithæ, Hordeum, sive oculorum tuberculum. lib. de remed. par. fac. cap. 10. Vide Crithe.

Horrida febris, φερινός πυρετός, dicitur (apud Hippocratem lib. 1. de morb. vulg.) non simpliciter ea febris, quæ cum horrore invadit, (id enim innumerabilibus accidit febribus,) sed exquisitus hemitritæus, in quo videlicet magnam accessionis partem, horrores saviunt, eo maxime die,

die, in quo tertiana & quotidiana continua simul concurrunt. 2. de differ. febr. Vide Febris horrida.

Horror, est inæqualis concussio totius corporis, & punctio quadam quasi, seu ulceratio summa cutis, ipsiusq; carnis sensibilis, ab humore tenui & acri per illam transeunte. 3. de sanit. tuend. cap. 5. & 10. meth. 4. Vide Frigus.

Humeraria vena est, quæ in superficie brachii exteriori collocata, juxta interiorem superficiem musculi Deltoïdis ad extremum ipsius protenditur. 3. de anat. adm. cap. 5. Hanc Omieam Græci vocant. 1. de anat. adm. c. 11. Dicitur autem humeraria, vel humeralis, quodd obliquior, à clavi: ula sensim recedens, abeat ad humerum. lib. de venar. & arter. dissect. cap. 6. Eadem Vena capitis, Cephalica, & Vena cubiti externa nominatur. Vide Cephalica.

Humerus, totum illud est, quod in eâ de articulatione continetur, quâ superior humeri pars, Epomis, & superhumeralis dicta, ad Collum vergit, & à posteriori parte, ossi scapulæ; ab inferiori autem, ei ossi, quod, dum totum Brachium attollitur, manifestum fit, & Ala nuncupatur, articulatur. 1. de artic. 4. & 62.

Humilis pullus. Vide Latus.

Humor, & Succus, non idem est. Humor enim idem quod humiditas in corpore animantis est; Succus humiditas est, quæ in fructibus, quibus vescimur, continetur, & ex medicamentis vegetabilibus exprimitur. lib. de humor. com. 1.

Humor urinæ, idem quod ipsa urina est, sub quo nomine & substantia, & color urinæ continetur: præter hæc, quod in urina reliquum est, inhærens dicitur, & ejusdem contentum. lib. de urina, cap. 1.

Humorem mucosum, eum appellare consuevit Hippocrates, qui lentore quodam & albedine præditus, ad exangues partes, (ossa, & cartilagines) pro nutrimento mittitur, cum aded imbecilla illorum natura est, ut bene conficere alimentum in ipsis nequeat, sed quasi semicoctum relinquat. 3. de artic. 65.

Hyaloides humor, ὑαλοειδὲς ὕγρον, est humor oculi tertius, in posteriori illius sede collocatus, qui & Vitreus dicitur, & Hyelinus. Hic quantò crassior & albior est sanguine, tantò à crystallino humore, humiditate atq; albedine secedit. 10. de usu part. cap. 1. Vide Crystallinus.

Hyaruli. Vide Hiaruli.

Hyboma, curvamen, gibbositas, ὑβώμα, idem est ac νόστος: vox generalis est apud Hipp. significans omnem vertebrarum præter naturam factam distortionem & luxationem. 3. de artic.

Hydatis, Aquula, substrata superiori genere pinguedinis augmentum est, quâ fluunt præter naturam oculi. lib. finit. med. Sunt autem Hydatidæ, humiditates illæ, quæ circa unctiosa & pingua corpora per medium spatium, inter duas portiones tunice Periostrii, nascuntur, quæ corpora molliendarum suâ pinguedine palpebrarum gratiâ, à natura fuerunt creata. 10. de usu part. cap. 7.

Hydatodes vinum, ὑδατοειδὲς οἶνον, est, quod multâ aquâ dilutum jam, aut dilui potest. 5. de sanit. tuend. c. 12. Vinum autem Oenodes vocant, quod multam sustineat aquæ mitionem, & imbecilles vires seriat. Cui opponitur ὀλιγόποτον, i.e. aquosum vinum, quod paucam sustineat aquæ mitionem. 7. meth. 6.

Hydatoides. Vide Crystallinus.

Hyderici, qui & Hydropici, & Utricularii dicuntur.

tur, lib. de atra bile, cap. 9. est ὅς, aqua inter cutem. 5. de loc. affect. 7.

Hyderos Phlegmatia. Vide Leucophlegmatia.

Hyderos, est species Hydropis, quæ Anasarca dicitur. 3. de sympt. caus. cap. 2.

Hydragoga medicamenta sunt, quæ aquam utriculariis, & hydropicis, educunt. lib. de atra bil. c. 6. Indè Hydragogia, Latinis Aquæ ductus, sanguinis lationem per venas (nomine à similitudine fluminis, ad rivos translato) significat, quæ sit spiritu, unâ cum caliditate per ventrem exeunte, ac deinde secum contractas nutrimenti particulas deferente. Gal. in Timæum Platonis, fol. 578.

Hydrelæum, est compositio ex aqua & oleo, ὑδρέλαιον, incerta autem & multiplex mixtura ratio, ad dolores capitis ex febre, & vomitionibus cōueniens. 2. simpl. 25.

Hydrenterocele, Hernia species est composita, quando videlicet, unâ cum intestino, aquosus humor in scrotum descendit. lib. finit. med.

Hydrocele. Vide Enterocèle, Celas, & Sarcocèle.

Hydrocephalon, est tumor p.n. ab humore aquoso, collecto in parte aliquâ corporum eorum, quæ caput cōcinnant. lib. finit. med. Is humor porro tribus in locis colligitur, aut inter Cutem & Pericranium, aut inter Cranium & Pericranium, aut inter Cranium & Cerebri membranas; aliqui addunt, ex Aërio, quartum locum, inter Cerebrum & ejus Membranas, sed tunc nullam recipit curationem, puerulis maximè familiaris morbus est.

Hydromphalon, Græcis ὑδρομφάλλον, coitio & concremento est lenti humoris, in umbilico, qui sub tunica ibidem congeritur, & continetur. lib. finit. med.

Hydrophobus, i.e. aquæ timidus: ὑδροφόβος dicitur

proprie is, qui ex morsu canis rabidi, aquam reformidat. 9. meth. 5. Indè Hydrophobia, i.e. aqua timor, ex rabidi animæ mordicatione prognatus. Vide Psychrophobus.

Hydropici. Vide Hyderici.

Hydrops, ὕδρωψ. Aqua inter cutem, in quo per cutem extentam, sive aër & flatus, sive humor aliquis in profundo conclusus continetur: si igitur in membrana abdominis interiore, Peritonæo Græcè dictâ, aër recludatur, fit Hydrops species, quæ sicca ab Hippocr. vocatur; si verò humor, fit Ascites, qui & Hydrops aquosus ab eodem dicitur. 4. aph. 11. Hydropis tres sunt species: prima, Ascites, ἀσцитς, quæ fit, cum inter membranam Peritonæum, & intestina, plurimus aquosus humor coacervatur, qui locus, aquosus humore, urris ad modum impletus, facit, ut hanc speciem Asciten, i.e. utricularē appellant; Barbari corrupti à voce, Ascitrim. Altera, Tympania, τυμπανία, ἢ τυμπαίτις dicitur, qui fit, ubi flatus ac spiritus copiosus, in iisdem ventris locis congregatur: hoc nomine à tympano, omnibus notissimo instrumento, appellata est; si enim pulsatur venter inferior, instar tympani sonum edit. Tertia, Anasarca, ἀνασάρκς, ἀσάρκς, ἢ ἀσυνόρδης, quæ dicta, fit, quoties per totum corpus humor pituitosus diffunditur, adeo ut instar spongiarum, aut papyri, universa caro permadida appareat, ideoq; in Anasarca, totum corpus intumescit, ex albedo pallet, &c.

Hydrops aquosus & siccus. Vide Hydrops.

Hydrops matellæ. Vide Diabete.

Hydrops in vas urinale. Vide Diabete.

Hyelinos. Vide CrySTALLINUS.

Hygia, ὕγιαι, i.e. sanitas, est affectio, constitutioq; partium, cujus ope functiones secundum naturam edimus. 1. meth.

1. meth. 9. Indè Hygiene, ὕγιειν, salubris Medicina pars est, quæ sanitatem tuetur, & imminentes morbos præcaver. lib. Introd. cap. 7.

Hygrocyrfocele, i.e. aquosus simul, & varicosus ramex, est dilatatio vasorum, testem nutrientium, & lenti humoris copiosissimi, in Scroti aliquâ parte, collectio. lib. finit. med.

Hymen, Hymenæon. Vide Colliculum.

Hyoides, sive Hypsiloides, sive Lambdoides, à similitudine, quam cum Υ & Λ, Græcis literis obtrinet, dictum, est os gutturis capiti incumbens, rectum & leniter cavum, lingua basis, & fulcrum velut firmissimum. lib. de muscul. diss. cap. 13. Id ipsum & Pharyngætron vocant. lib. de vocal. instrum. diss. cap. 6.

Hypelata, Catoherica, sive dejectionia medicamentata sunt, quæ renes, vesicam & gibbam jecinoris partem, cum multo vitioso succo refertam, expurgant. 7. meth. 13.

Hyperbolica figura corporis est, quoties quatuor membra, Græcis ὀδὼα dicta, nempe crura ac manus aut summè extenduntur, aut immodicè inflectuntur, ipsa item spina, cujus partes vertebrae quoque in cervice existunt, cum plus nimium incurvatur aut extenditur. 1. progn. 13.

Hypercatharsis, ὑπερκαθάρσις, superpurgatio, immodica est, violentiori epoto ex medicamento facta, purgatio: in causa ergo est vis nimia medicamenti, quod vasa ad ventrem attrinentia mordens, aperiens, & continenter irritans atq; cōvellens, corpora tota, eorundemq; vires omnes, naturales cumprimis, enervat & dissolvit. In ὑπερκαθάρσει porro primum flava bilis, deinde pituita, demum atra

bilis, postremò sanguis (quippè quem sanguinem naturæ habet familiarissimum) excernitur, initio tenuissimus, demùm crassissimus. Vide Superpurgatio. Si verò humoris vel sanguinis evacuatio sponte fiat, à naturâ, vel sanguinis, vel humorum multitudine aggravatâ, & ad eorum, quæ onerosa sunt, evacuationem excitatâ, & modum obtinere nequeunte, Hypercrisis dicitur, seu Supervacuatio. 3. prorrh. 53.

Hypercrisis. Vide Hypercatharsis.

Hyperoia, ὑπεροία, est pars oris superior, modicè concava, foraminulis pertusa, per quæ, à Cerebro pituita ad os descendit. Latine Palatum, & basis Cerebri, osse sphænoide firmata.

Hyperfarcion ulcus est, cui caro supercrescit; veluti Hyperfarcosis, ὑπερφάρσις, carnis excrementitia. 2. meth. 2. & 3. meth. 6.

Hypezochotes membranæ, sive subcingentes, sunt, quæ tela araneorum similes, naturâ simplices, internam utramq; thoracis regionem subcingunt; quæ verò rectè ad jugulum usq; perferuntur, Diaphragmatones, i.e. interceptantes, sive intersepientes; ubi autem pulmone cohaerescunt, hujus operimentum dicuntur. 5. de anat. adm. cap. 8. Has ipsas pleurae tunicas, omnium spirationis instrumentorum communes esse, communemq; iis largiri tunicam, scribit Gal. 7. de anat. adm. c. 2. Vide Cingentes.

Hypnoticum medicamentum, ὑπνῶτικόν, est, quod somnum conciliat, soporemq; & Cataphoram eorum, molitur; refrigerat enim corpus, & sensum eò usq; stupefacit, ut si paulò liberalius ebibatur, mortem etiam inducat. 5. simpl. cap. 19. Vide Narcoticum.

Hypocaumata, caloris nostri fomites, alimenta

nomi-

nominant, juxta dogma eorum, qui animalium vitæ causam, censent ignem esse, qui rursus suis pabulis, tanquam alimentis, alatur, ut lucerna flammâ, oleo. 1. aph. 14.

Hypochoemenes, i.e. suffusi. 6. de sanit. tuend. cap. 9.

Hypochondria, i.e. subcartilaginea, aut quasi dicas, sub cartilaginibus posita, sunt partes illæ, quæ sub ventriculi ore, ad partem exteriorem apparent: cujusmodi sunt muscoli, qui expansi, membrana prætenui, veluti araneæ, quam Peritonæon vocant, incumbunt, extrinsecus verò cute cõteguntur. Aequivoco autem cum his vocabulo, etiam interiora viscera vocamus hypochondria, quoniam & ipsa sub cartilaginibus notharum costarum ab interiori parte existunt. lib. Introd. cap. 10. In priori significato, dictum, Febres ab Hypochondriis moderatæ, i.e. omnium febrium acutarum, quæ ab Hypochondriis proficiuntur, sunt mitissima: in posteriori significato, quando nomine Hypochondriorum complectimur ventrem, jecur, lienem, & seprum transversum, quædam malignæ, quædam mites sunt. comm. 2. in 3. de morb. vulg.

Hypochondriacus, sive flatuosus affectus, qui & simpliciter Melancholia dicitur hypochondriaca, morbus est ex tertio Melancholia genere, à ventriculo & finitimarum partium ex affectu p.n. ortum duens, prævis symptomatibus stipatus, inprimis metu & mæstitiâ. Eundem alvi dejectiones, vomitiones, proba concoctio, & ructus levant. 3. de loc. aff. cap. 7. Græcis ὑποχονδριακὴ μελαγχολία.

Hypochyma, (aliàs Hypochylis,) est crassi humoris coalitio, in corneæ membrana, vel inter corneam tunicam, & crystallinum humorem, juxta pupillam concretio. Quæ in re Hypochyma à Glaucomate differt, quod

τὸ ὁχρὸν sit humor illic concretus; γλαύωμα autem alteratio humoris crystallini, in glaucum colorem ab humiditate quadam intra ipsum congesta: Veteribus Medicis item sunt uterq; ille affectus: differunt interim tūm eo, quo dictum, modo; tūm quod suffusione laborantes, lucem videant multam, aut paucam: qui verò γλαύωμα & ἀσθένεια patiuntur, lucem omnino nullam cernant. Est autem suffusio duplex, una propriè dicta, quæ est oculorum per se suffusorum morbus, ab humore crasso pupillam obscurante; altera verò per sympathiam in ventriculo, in quâ oculi non primò, & per se patiuntur, sed visa quadam, visis propriè suffusorum similia, iis obversantur, quæ, ut dictum, est per consensum suffusio, (ut illa per essentiam,) sive à ventriculo sursum ad oculos ascendendo, sive à Cerebro deorsum, sive à toto corpore, ut in febris. Vide Glaucofis.

Hypogastrion. Vide Abdomen.

Hypoglossis, medicamentum est, leniens, levigans, & corrigens asperitatem asperæ arteriæ; quin & omne, quod in visis spiritalibus inflammationis reliquum est, concoquit & persanat: sic dictum, quia linguae subditur, eoq; paulatim liquecente, asperæ arteriæ summū madescit & irrigat: de quibus sublinguaribus præidiis Gal. fusè 7. de compos. med. loc. Vide Arteriæ. Hypoglossis etiam dicitur inferior linguae pars, quæ subjectam attingit maxillam.

Hypophoræ, sunt fistulae & vitia profunda, quæ debiscunt, ut sinus, ulcera, aliaq; huiusmodi omnia, quæ ex defectu, repletionem desiderant. lib. Introd. cap. 3.

Hypophysis, seu Hypochylis, i.e. suffusio. 3. meth. 2.

Hypopyos, Græci ὑπὸ οὖρον, ἢ ὑποὸ οὖρον vocant, quibus pus in oculis congregatum est, quod vacuari solet, divi-

sā tū

sā tunicā corneā paulò supra locum, quo committuntur inter se tunica oculi universa, quem alii Irim, alii Stephanon, alii Coronam vocant; differtq; ab Hypochymate, quippè in quo non pus, sed levis quadam nebula, tunicis oculi interponitur. 14. meth. 19. Quod autem Hypopyon sub oculis fiat, nomen ipsum indicat, idem enim est, veluti si quis Hypophthalmiam dicat, quod ipsum sub oculis sonat. Est autè ex genere effusionum, & Ecchymomatum appellatarum; quales appellat Hipp. & alii, affectionem circa cutem, cum tenuibus ipsius venis contusis, sanguis per fissuras effunditur, non uno loco acervatim, nec statim ita excretus, in grumos coit, sed postquam per Diapedesin effusio ista est facta: tunc enim, temporis progressu, cōtingit livescere & denigrari oculum, parvis nimirū grumulis, ex disperso in multas cutis partes sanguine, coactis. 5. de comp. med. loc. cap. 1. & lib. de virtute Centauræ, c. 4.

Hypophthalmia, & Hypophthalmium. Vide Hypopyos.

Hypofarca, aliàs Hypofarcidium, & Epifarcidium, species Hydropis est, in qua habitus totius corporis, piritu a plenus redditur. 4. de rat. vict. iii. Vide Anafarca.

Hyposphagmata, plagas oculi illatas, & obortas ex eis cruentas suffusiones, appellant, τὰς ἐν οὖρον species. 4. de compos. med. loc. cap. 8.

Hypospadiæ, ὑποσπᾶδιον, ii sunt, quibus ob vinculum, quod ad finem virgæ habent, meatus seminalis est contortus, & ob laesa genitalia steriles sunt, non quòd semen fecundum non habeant, sed quòd in virgæ flexibus, semen hærens, ejaculari prorsus nequeat: quam rem curatio ipsa comprobat, vinculo enim abscisso generant. 15. de usu part. cap. 3.

Hypo-

Hypostasis, sive sedimentum, est id, quod in urina residet, tanquam crassior urina portio, & in sano quidem tertie concoctionis excrementorum, in aegris vero morbidi succi pars, ab urina liquore secreta & in fundo subsident, lib. de urinis, cap. 16. Licet generaliter, quicquid subsidet, atque in imo cuiusque liquidioris excrementi subsistit, hypostasis dici queat. Ipsa hac crassior urina pars, si ad supremam superficiem terminatur, dicitur Nubecula; si ad mediam regionem, Suspensum; si profundiorē parte inferiorem locum occupet, dicitur Hypostasis. Ibid. cap. 21. Quae si divulsa non sit, sed continua, apud Hippocratem dicitur plana; quod si per omne tempus sui similis est, ita ut, quemadmodum primo die, ita & insequentibus in diebus sit cocta, insuper quae sedimentum & humorem urinarium habet non distantem a se, sed totum sibi aequalem, & quae continuè sibi similis perseverat, æqualis apud Hippocratem dicitur. Ibid. cap. 38.

Hypsiloides. Vide Hyoides os.

Hypothenar, i.e. subvola, pars ea manus est, quae opponitur volæ manus, quae Thenar dicitur. lib. Introd. cap. 10.

Hysteria, i.e. Uterus, Vulva, Matrix, fetus gestandi sive generationis organum, foris nervosum, intus carnosius, dicitur, ὕστερα, quoddam postrema sit partium omnium lib. finit. med. Unde Hysterica mulier, i.e. ab utero suffocata; & affectus, Uteri suffocatio, sive spirationis ob uterum ablatio vocatur, quo interdum mulieres, sine sensu immobiles jacent, cum nullo aut parvo, & quam obscurissimo pulsu; interdum mitiori existente malo, sentientes & moveri potentes, atque integrè ratione; tamen animi defectione, & difficili spiratione laborantes, crura etiam &

brachia

brachia contracta habet. 5. de loc. aff. 5. Præfocatas etiam uterarias vocant, i.e. utero laborantes. com. 1. in 6. de morb. vulg. 2. Hinc etiam Hysteralgia, uteri dolor: Hystericus Typus, & morbus, Accessionis est retardatio, cum posterior accessio serius invaserit, quam præcedens.

I

IANITOR. Vide Pyloros.

Ianitrix vena, i.e. vena Porta. 6. de placit. cap. 5.

Ichor, est tenue excrementum ulceris, ut sordes crassum. 3. meth. 3. Vocat etiam Ichores Hipp. tenues, acres, aquosas & mordaces sanguinis humiditates, sanguinis veluti vehicula. 4. de rat. vict. 2. Appellat insuper Ichores, superfluas sanies, quas corpus coacervat, ex quarum evaporatione, non solum capitis dolores oboriuntur, sed etiam suffusorum symptomata, aliquibus vero & Comitialis convulsio concitatur. 6. de sanit. tuend. cap. 9. Dicuntur adhuc Ichores, aquosæ humiditates in Coryza & Catarrhis, quales destillant a capite in nares. 2. de rat. vict. 4. 4. Græcum nomen ἰχὼρ Latini quidam vertunt serosum humorem, quidam aquosum, quidam tenuem, alii vero saniem interpretantur. Ichoroides autem sanguis non simpliciter tenuis & aquosus ab Hippoc. vocatur, sed qui venenosus aliquali & malignæ facultate infectus sit. Galenus ex Platone: Ichor autem, sanguinis quidem, mitis; nigrae vero bilis, acris & ferus. Ichoroides quoque sanguis vocatur, in se ipso pravam ac tenuem humiditatem continens, mordacem & erodentem, non aqueam & morsu carentem. comm. 2. in 6. de morb. vulg. 38. Vide Sordes.

Icteros, est discoloratio ex flava bile, sui servante naturam, una cum sanguine per totum corpus delata. 2. ad Glauc. 1. Sic dictum hoc malum, vel ab ave, quæ Græcis

Icteros,

Icteros, Latinis verò Galbula dicitur, hac enim fiffectetur, sanari malum dicunt, & avem mori: vel ab ave, quæ Ictinos, *ἰκτίνος* & Græcis, Milvus Latinis appellatur, oculi siquidem, hoc vitio laborantium, milvinis oculis similes, aurei coloris videntur: vel à mustella sylvestri, quæ auricoldores oculos habet, & Græcis *ἰκτίς*, Latinis Viverra nominatur. Dicitur etiam Regius morbus, quoniam mulso (quod genus porionis in Regum deliciis erat) curabatur, rebusq; omnibus hominis mentem ex hilarantibus. Aurigo quoq; nominatur à Celso, ab auri colore, quem bilis, per universum diffusa corpus, refert. Arquatus deniq; nuncupatur, quod ejusdem coloris respectu, cœlestis arcus similitudinem habeat.

Ictus, est arteria motus, tactui occurrens. Intervallū autem, est tempus interpositum, inter duos ictus, quo distenditur, contrahiturq; arteria. de pulsib. ad Tyrones, c. 4.

Idea morbi, i.e. morbi essentia. 3. de cris. 4.

Idiopathia, *ἰδιοπάθεια*, proprius affectus est, qui & *πρωτοπάθεια*, i.e. primarius affectus dicitur, ex adverso distinctus ab affectu per consensum, *δευτεροπάθεια* vel *ἀντιπαθία* factum, quem aliàs vocant secundarium, seu posteriorem. 1. de loc. affect. 3. Per consensum autem affici tribus modis membrum aliquod dicitur: vel propter viciniam; vel propter familiaritatem generis, vel operis. Propter generis societatem quidem, & affectarum partium substantia propter similitudinem, E.g. ubi nervosum nervoso, venosum venoso consentit operis, cum mamma & thorax, partibus genitalibus con- dolet. com. 3. in 3. de morb. vulg. 4. Vide Sympathia.

Idiosyncrasia, i.e. temperamenti corporum proprietatē & convenientia. 3. meth. 2. & 7.

Jecur.

Jecur. Vide Hepar.

Jecoraria vena. Vide Cava vena.

Jecoris vena. Vide Choledocos.

Jejunum intestinum, secundum est intestinum in ordine, quod à Duodeno (quod vocat) intestino multifariam in orbes convolvitur, vasorum complurium serie cōtextos. Dicitur autem jejunum, *ἵκτισ*, vel *ἵκτις*, quod semper inane maneat & cibo vacuum reperiatur. 6. de anat. adm. c. 9. & 5. de usu part. cap. 3.

Ignem, suo more Hippocr. febrem vehementissimam appellat. comm. 3. in 1. de morb. vulg. 19. Unde etiam Græcis *ἰκτὶς πυρὸς πυρῆς* nominatur.

Ignis facer, i.e. Erysipelas. 8. de placit. 4. & lib. de purg. med. fac. cap. 5. Vide Sacer ignis.

Ile, aliàs *νεφὸν*, locus appellatur, qui est inter thoracem, & os coxæ, propterea quod *νεφὸν*, i.e. cavum, & vacuum, depressumq; est. 2. de his, quæ in medic. 16. Eundem locum etiam Græci *λαπαφῶν* appellant, qui inter thoracis, & iliorum ossa subsidet, propterea quod eo loco, cingulum circumdatur; unde & *λαγὼνας ἱζῶν* etiam nominant. 2. de fract. 70.

Ileon, *εἰλεὼν*, intestinum est, ordine à vetriculo tertium, quod incipit, ubi jejunum desinit: diciturq; *εἰλεὼν*, à multis anfractibus, & circumvolutionibus. Idem verò & *λεπτὸν*, h.e. tenue, simpliciter dicitur, nomine duobus etiā superioribus communi. A qua parte obstructa, & inflammata nomen desumpsit morbus peracutus, qui Ileos, Græcè *εἰλεὼς* appellatur: sed nihil vetat in crassiori intestino colo, eundem affectum progigni, mitiorē interim, minūsq; mortiferum. com. 2. in 3. de morb. vulg. Licet aliqui eundem in plenore intestino factum vocent *εἰλεὼν*, in tenuiori *εἰλεὼς*,

N

(cum prius $\chi\epsilon\gamma\delta\alpha\epsilon\lambda$ & diceretur) quod per eum intestina convolvi videantur: unde quidam Latine Ileosin, Volvulum dixere; Chordapsum autem, quod qui manum loco dolenti admovent, ex tensione, chordam attingere videatur. 3. aph. 22. & 5. aph. 44.

Ilingus, est tenebrosa vertigo, quæ fit, cum humores crudi, cum flatuoso crasso spiritu, in capite moventur; multoties præcedit Epilepsiam, & Apoplexiam. 3. aph. 17.

Illegitimæ costæ, alias Nothæ, spuria, & mendosæ dicuntur, 5. de anat. adm. cap. 1. cartilagineæ admodum, sunt quatuor ultima costæ, quæ ad pectoris os non pertingunt. 8. de anat. adm. cap. 1.

Illisio. Vide Collisio.

Illofis, & Strabismus, seu Strabilismus, sunt invicta, musculorum palpebras moventium, concussiones, 2. de sympt. caus. cap. 2.

Ilium, $\lambda\alpha\gamma\theta\epsilon\alpha\upsilon\ \delta\gamma\theta\upsilon\omega$, est apophysis, ossis sacri superna, & ampla, continens intus ventris imi partem plurimam, tangensq; ilia. Os enim sacrum, tres habet apophyses rectas, nec deorsum, nec sursum repentes, videlicet in specie sic dictum Ilium, coxæ & pubis os: tamen os totum, sæpe os Ilium vocamus, quod id magnitudine & crassitie præpolleat reliquis.

Imas. Vide Gargareon.

Imbecilla corporis pars est, vel quæ à primo ortu suo & naturâ est intemperantior, vel quæ ex precedente aliquo morbo intemperiem contraxit, vel quæ ex præsentia affectu intemperata reddita, promptius vero in iis partibus imbecillis supervacaneum, qualecunq; id sit, & morbidum congeritur & suscipitur, quam in membris fortioribus, 11. meth. 20.

Immu-

Immutatus morbus est, cuius longior est accessio, & minor satis remissio; quo genere antiqui Typum quotidianarum, & semitertianarum, reponbant. 1. de Typis. c. 3.

Impetigo, $\lambda\epsilon\chi\lambda\upsilon$, est summa cutis asperitas, cum multa prurigine, squamis & furfuribus. lib. finit. med. Agrestes vero impetigines nominant, quæ à medicamentis imbecilliter siccantibus nihil juvantur, à validis irritantur. 6. de compos. med. per gen. cap. 2. Ea autem impetigo, quæ cum pruritu fit, etsi non aspera, sed lenior, quam vel Psora, vel Lepra est, adeo ut, si solâ salivâ quotidie defricetur, sanescat; ubi increverit, extremam cutem in furfures resolvens, in Psoram transit, atq; deinde in Lepram, ubi pro furfuribus, piscium quasi squamula concrevunt, & per frictionem decedunt. 5. de compos. med. loc. cap. 5. & cap. 7. Nec tamen est is morbus, quem Gallicum, seu Neapolitanum, seu Hispanam scabië vocant, ut alibi mihi sortè ostendendum erit. Cæterum, $\lambda\epsilon\chi\lambda\upsilon$, Lichenis nomine etiam Impetiginosum affectum, Mentagram Romanis appellatam, multò magis serum & agrestem, Plinius comprehendit, non squamis, ut Lepra; sed fædo cutis fursure, totos primùm vultus, deinde verò & collum pectusq; & manus occupans, oculis tantum immunibus. Celsus Lichenem, non Impetiginem interpretatur, sed Papulam; cuius iridem dicitur, sicut Lichen, differentias statuit, feram & mitiorem. Nam quæ ab eo describitur Impetigo, Lepra est.

Impetum facientia. Vide Continentia.

Implicatus affectus est, in quo multa sunt affectus partes: nam potest idem homo, non solum laborare ex thorace, sed etiam ex pulmone, capite, ventre, jecmore. com. 2. in 3. de morb. vulg.

Imum ventrem, vocat Hipp. regionem ventris iniam, quæ umbilicum ac pudenda interjacet; ita ut in hæc tria rotum Abdomen dividatur, in Hypochondrium, & loca ad umbilicum attinentia, & imum ventrem: 2. aph. 35. aut, sicuti Anatomici faciunt, in Epigastrium, Regionem umbilicalem, & Hypogastrium.

Inæqualis, & inordinatus pulsus est, qui nec ordinem, nec periodum circuitusve rationem ullam servat. Est autem pulsus equalis & ordinatus, quando, pari numero, pulsum equalium intercurrit pulsus unus impar, qui equalitatem corrumpit, proportionem circuituum observat. lib. de puls. ad Tyron. cap. 6. Inæqualis autem deficiens pulsus est, in quo nulla servatur equalitas, motusq; ipso semper deficit. 1. de differ. puls. cap. 12.

Inanes corporis partes vocantur, quæcumq; inter extremam thoracis costam, & femoris ῥαγόν & ossa habentur; inanis siquidem videtur omnis talis sedes, si eam cum supernis, infernisq; partibus, utruq; ossis conferas. 1. progn. 1.

Incentiones, idem est quod inflammationes. 3. de huius quæ in medic. 30.

Incidentes dies. Vide Decretorios.

Incisio. Vide Unionis solutio.

Incisorii dentes. Vide Dentes, & Tomi dentes.

Incoctionem, vocat Galenus, coctionis, haud in ventriculo tantum, sed in vasis quoq; & jecore, & universo corporis habitu, factam frustrationem. lib. de med. art. const. cap. 15.

Incrementum morbi. Vide Ascensus morbi.

Increscens. Vide Continua.

Incubus. Vide Ephialtes.

Incurvatio, alias Gibborositas, est distortio spinæ in

in posteriorem partem, ex Panis & Tuberculis immaturis in spinâ exortis magnis, & duris, & diuturnis. 3. de art. 2.

Index digitus, est proximus à Pollice, nomen suum ab usu sortitus. lib. Introd. cap. 10. Dicitur & Index, dies contemplatorius, qui eam habet naturam, ut qualisnam dies, cujus est index, sit futurus decretorius, prænunciat velut & indicat. 1. prorrh. 1. & 2. aph. 24.

Indicatio, est juvenis comprehensio, simul cum comprehensione nocentis eveniens, sine observatione & rationatione, lib. ad Thrasib. cap. 1. quippe ipsam sequentis, si ve agendi, & ejus, quod fieri debet, Indicationem dicimus. Ergo, Ex ipsâ rei naturâ exordiri, atq; ita, quod sequens sit, citra experientiam invenire, idem est quod indicatione invenire. Ut si quærat, de sanitate quid sentiendum sit? primum perpendere oportet sanitatis naturam, quæ, quia bona omnibus mortalibus videtur, facit, ut judicemus, eam à nobis servandam esse; quamobrem sui custodia, sanitatis indicatio est. Idem verò & in morbo agendum, qui, quoniam totus præter naturam est, & toto genere malus, indicat & ostendit, se tollendum esse. Ibid. & lib. 3. meth. med. cap. 6.

Indicatoria. Vide Prognostica.

Indices, & Spectabiles dies, consueto more appellat Hippoc., in quibus signum aliquod judicationis appareret, alio quopiam ex diebus decretoriis futura, quos ipse 3. progn. 4. per quaterniones digestis singulis septimanis bipartito sectis. 2. aph. 24. Græcis ἐνιδυνοί, & θεωρητικοί, h. e. indices & contemplabiles nuncupantur, quod majorem vim & potestatem habeant, ad præagiendam, contemplandamq; futuram crisin, quàm ad judicandos mor-

bos; licet in eis aliquando perfecta crisis possit accidere, ut dies quarta, undecima, decima-septima.

Indicia, & signa certa, Prognostica, illa sola nominantur, ex quibus licet certo colligere aliquid de salute & interiectione infirmi, quæ comprehendens uno capite, dicit esse significationes virium gubernantium corpus, quo pacto robore valeant, aut deficiant, in quibus interim etiam cruditis & coctionis signa continentur. 3. progn. 39.

Inflammationis nomen propriissime dicitur de tumore partium carnosarum, conjuncto cum renitentia, tensione, febris, calore, dolore, & rubore. lib. de tumor. cap. 2. Fit phlegmone vel propter coincidentiam, vel propter impactionem, obstructionemq; omnium vasorum, sive ob circumstantes quasdam moles, vicinarumq; partium molestias, quæ meatus occupant. Tandem etiam ex abundantia sanguinis oboritur inflammatio multoties. lib. de totius morbi temp. c. 3. Dicitur verò Inflammatio, Phlegmone, multoties esse aliud nihil, quam Phlogosis sive Inflammen. Est igitur inflammatio omnis, genus si spectes, immoderata caliditas; in specie autem, est cum sanguine optimo, ac mediocrem crassitudinem obrinente, ad particulam aliquam universim fluente, atq; ob multitudinem edomari nequeunte, vehemens dolor arripit hominem, (nisi membrum sensum omnino hebetem habuerit,) pulsus in profundo molestus accidit, tendiq; omnino ac contundi membrum apparet, & vehementem calorem persentit, adeo ut comburi videatur, & refrigerari desideret, talisq; molestia in summa accidit, qualis ex balneis oritur, aut ex igne, aut quovis alio modo calefactis. Multaq; sunt hujus species, nam aut affluente sanguine, aut flavâ bile altera, ambobusq; simul humoribus alia tertia oritur phlegmone. 2. Glauc. 1.

In-

Inflammen. Vide Inflammatio.

Inflammata lassisitudo, & Lassisitudo contusiva phlegmonodes, musculorum est affectio, quæ manibus, cruribus, lumbis, spina, musculis, &c. ubi plurimum labore pertulerint, accidit, usq; qui ex vehementi clamore, organa vocis, i.e. arteriæ aspera caput, laryngem, & fauces oblasas habent, vocemq; raucam effecerunt. 7. de comp. med. loc. cap. 1.

Inflatio. Vide Phylis. 14. meth. 7.

Infundibulum. Vide Choana.

Infractiones oculorum, affectus est, in quo palpebræ inverruntur. com. 5. in 6. de morb. vulg. 2.

Inion, est ea capitis pars, quæ Occiput dicitur, principium medullæ spinalis, ad spiritus modum in multos ramos divisa, ex qua sexaginta fere proveniunt nervi: Gracis τὸ ἰνὼν, terminatur futura quarta. l. 2. de comp. med. loc. cap. 1.

Initiatrix. Vide Antegressa.

Innominatus morbus, qui medio loco, inter Letargum & Phrenitidem consistit, aliàs dicitur Coma pervigil: est, in quo agri convivent oculis, somnolenti stertunt, oculis fixis intuentur, difficiles & tardi ad respondendum, stultè loquuntur, & temerè nugantur: lib. de puls. ad Tyron. cap. 11. quem affectum, cum longo tempore perduraverit, Typhomaniā vocant. 1. prorrh. 1.

Innominata cartilago. Vide Cricoides.

Innuens, circumnuens pulsus est, qui inequalis est in unâ distentione. 1. de differ. puls. cap. 20. & 4. de caus. puls. cap. 10.

Inordinata febris est, quæ omni periodo, & certo circuitu caret. 5. de placit. cap. 2. Aliàs Erratica dicitur. 8. de placit. cap. 6. Vide Erraticæ.

Insanire, est desipere citra febre.

Inspiratio, est externi aeris intra thoracem facta attractio, 4. de loc. aff. 7. ad nativi caloris conservationem, & spiritus animalis nutritionem, 7. de usu part. cap. 9. Duplex est, lenis, & coacta. Lenem, & non coactam appellant, quæ in bene valentibus, nullâq; vehementi agitatione motus cernitur, ac solo peragitur Diaphragmatis motu. Coactam verò, quæ tum in morbis nonnullis, (inprimis in Apoplexiâ forti) tum in exercitationibus paulò vehementioribus accidit, in quâ protinus omnes etiam scapularum partes simul attolli conspiciuntur. 2. de placit. c. 4. Inspiratio, & exspiratio, εἰσπνοὴ καὶ ἐκπνοὴ, oppositi motus sunt: ille est, quo distensus thorax per asperam arteriam, necessario in pulmones aërem exteriorē attrahit, tribus de causis, ut refrigeret, ut ventilet calorem nativum, & ut spiritum animale gignat; hic est, quo thorax contractus, eundem aërem exprimit, ut, quicquid in ipso fuliginosum, fumosumq; ex humoribus genitum fuerit, id exprimendo elidat. Utriq; nomen Respiratio, & Respiratus, εἰσπνοὴ, 4. de loc. aff. 7. Per inspirationem autem, attrahit in se homo exteriorē aërem, per os, in pulmonem; per raritatem autem cutis, & carnis, in arterias. Horum motuum uterq;, tam ille, quo per os, quàm is, quo per cutim fit aeris attractio, uno nomine Inspiratio appellatur. Per expirationem verò, per eosdem meatus, per quos aërem recipit, eundem remittit; qui cum per os remittitur, Exspiratio; cum per cutis meatus, Transpiratio, Perspiratio, Diffusio, Transpiratus, Perspiratus, Diffusus, Δυσπνοὴ dicitur. 8. de placit. cap. 8.

Instrumenta prima cēsentur, quacumq; ex similaribus partibus, simplicis alicujus operationis gratiâ facta sunt, quæ

quæcumq; verò rursus ex his componuntur, etsi unitotius instrumenti actui quàm maxime inserviant, inter secundæ connumerantur: musculus enim & vena, & arteria, inter primæ instrumenta numerantur; digitus verò inter secundæ, atque hoc magis pes, & pede magis crus. lib. de morb. temp. cap. 4. Unde instrumentales corporis partes sunt, Cerebrum, Cor, Pulmo, Hepar, Venter, Splen, Oculi, Renes. Ibid. cap. 3. Instrumentales autem morbi fiunt, vel naturali harum partium formatione permutatâ, vel non serrato numero partium ea componentium opportuno, aut utriusq; parti convenienti magnitudine sublatâ, vel quoddam neutiquam, ut naturalis positus expetebat, ipse cohereant. Ibid. cap. 6. Vide Similare.

Insultus accessionis, est indivisibile illud tempus, quo accessio primum invadit: quod alii febris significationem, accessionem, & Epilepsiam vocant. lib. de morb. temp. 6.

Intemperis morbofa, Græcis νοσώδης Δυσκρασία, partium similiarum morbus est: sit, ubi qualitates primæ, seu elementa ipsa, à naturali symmetria, & commoderatione, deflectunt. Non autem citra rationem adjectum est, Morbofa; duplex enim existit intemperies, ex Gal. 2. de temperam. Aia enim est naturalis, seu sanitatis, & alia morbida. Sanitatis sive naturalis est, quæ à media temperie paululū abest, citra evidentem interim functionis noxam; vel in quâ nulla functio animalis adhuc manifestè leditur, licet imbecillior reddatur, tunc equidem intemperior sanè est, sed non aegrotabit homo. Quod si quis hoc denegaverit, hunc alterū fateatur necesse est, vel omnes homines agroare semper, vel unam esse omnium intemperiem: quod utrumq; absurdum est. Morbofa verò intemperies

est, cum animal ob naturalis temperamenti vitium aegrotat: quæ si omnibus corporis partibus equaliter insit, ut in Hæctica febre, equalis intemperies appellatur, & dolorem non efficit; secus verò dolorem efficit, & inæqualis dicitur, ut docet Gal. de inæquali intemp. 1. de sanit. tuend. lib. de constit. art. & cap. 8. artis parvæ.

Interceptiones venarum, Græcis dicuntur ἀπολήψεις τῶν φλεβῶν τε καὶ ἀρτηριῶν: sunt oppletiones vāorum, à copiā sanguinis; vene enim cum supra modum oppleta fuerint, premi virtutem, gravariq; est necesse, atq; in extinctionis agi periculum nativam caliditatem; quippe quæ ob multitudinem, & copiam, suffocationi quidpiam simile patitur. 4. aph. 23. Ubi verò interceptiuntur, quæ sunt in animali, arteriæ, & ita oppleta sanguine fierint, ut nullus in ipsis vacuus relinquatur locus, in quem, dum attolluntur, aërem externum attrahere possint, tunc strangulatur atq; extinguitur calor innatus: & qui ita affecti sunt, subito sensum & motum totius corporis amittunt, lib. de caus. morb. cap. 3. nequeuntibus spiritibus naturales pertransire meatus, atq; ob id ab Hipp. interceptiones spirituum nuncupantur. 4. de rat. vict. 27.

Intercidentia. Vide Coincidētia, & Paremptosis.

Intercidentes. Vide Decretorius. Intercidens autem pulsus est, cum inter duos ictus, ordinem elegantem servantes, ictus medius intercurrit, lib. finit. aed.

Intercipientes membranæ. Vide Cingentes, & Hypezochoræ.

Intercostales muscoli, μεσοσθελῆες μῦες, sunt musculi, inter medias costas sitī, quorum bini sunt in singulis costarum intervallis, alter externam partem spectans, alter interiorem. Extremi thoracem dilatant, à inspiratione;

nem; Interni contrahunt ad expirationem. 5. de caus. respir. 8. de anat. adm. & 7. de usu part.

Intercurrens pulsus est, qui inæqualis est, inæqualitate crebritatis. 1. de diff. puls. cap. 12.

Interfœmineum, quod Perinæon Græci vocant, est media illa pars corporis, quæ inter totum id, quod inter inguina utriusq; cruris est, (quod gressuram solet Hipp. appellare) interjacet, quod duabus feminibus sit interpositum. Sive est intercapedo, quæ ab exortu pudendi usq; ad anum pertinet, ubi etiam vesica collum collocatum est. 4. de artic. 45. & 2. de fract. 43.

Intermissionem febris vocat Gal., cum febris in quietem desierit, 1. de cris. cap. 3. & ad infebrecitationem devenerit. Græcis ἀναψύξις. 3. de cris. cap. 4.

Intermittens pulsus est, qui inæqualitate constat raritatis & parvitatī, alio atq; alio utrobq; modo. Habet raritatis inæqualitatem, quod quies sit longissime producta; parvitatī autem anomaliā, quod distentio minimum dilatata. 1. de differ. puls. 12.

Internodia. Vide Phalanx, & Digniti.

Intersepientes. Vide Hypezochotes.

Interseptum, ea est pars narium, quæ alas, seu pinnulas narium nominatas, internamq; illam cavitatem, in duas partes discriminat. lib. Introd. cap. 10.

Interstitium, est duodecim horarum spatium, in quo febris terminatur. 2. de cris. 9.

Intertrigines. Vide Hydroa.

Intervallum. Vide Ictus, Ablatio.

Intestinum. Vide Entera.

Intestinum cœcum, τοπλὸν, est intestinum à ventriculo, ordine quartum, parvus velut venter quidam, & proin

proin figurâ à reliquis differt; nec enim, ut reliqua, oblongum est, sed in modum ventriculi rotundius: ex qua figurâ efficitur, ut unâ tantum parte pertusum, & uno foramine, tanquam oculo, præditum esse videatur; pervium tamen est, quodq; ad ipsum ex tenui intestino, ileo, descendit, facile in Colon delabitur.

Intestinatorum difficultas, est velox exitus eorum, quæ comeduntur, & bibuntur, quæ talia deficiuntur, qualia fuerunt devorata. 4. aph. 12. Propriè Lienteria dicitur, 6. de loc. aff. 2. & duabus porissimum notis à Cœliacâ dispositione discernitur, siquidem hentericis alimenta prorsus cruda, qualia sumpta sunt, infernè prodeunt, tantâ tamq; manifestâ cruditate, ut alimenti assumpti genus aperte dignoscatur; verum in Cœliacis, jam adepta sunt aliquam coctionem, & diutius in ventriculo morantur, neq; tam citò per alvum descendunt. Cruda tamen sunt & aliquando fetida, non mordacia, sed quod sæpius excreta, animi deliquium inducunt.

Intumescencias, quas οἰσμήνη Græci vocant, Hippocrates omnes tumores præter naturam vocat, quos inflammationes, & durities, & intumescencias, distinguunt. 3. de his, quæ in medic. fiunt. 30.

Inviolata membrana. Vide Membrana dura.

Inviscatio oculi, est quadam viscositas, quæ in illius albedine, aut nigredine hærens, ex vulneribus ejusdem oborta, palpebram cum pupilla, vel utraq; palpebras simul jungit. lib. de ocul. cap. 9.

Involucrum cordis. Vide Membrana Pericardios. lib. de ven. & art. diss. cap. 2.

Involutum intestinum, quod & Ileon, & Tenue dicitur. Vide Ilion, & Tenue.

In-

Inustio in ventre, oritur, propter acrem eorum, quæ ingesta sunt, caliditatem, ob quam & febrile contingit: Colliquatio verò sit febrili à caliditate, absumptâ pinguedine, colliquatq; molli carne. 4. acut. 112.

Ionthos Græcè, Latine Varus, tumor parvus & durus, in faciei cute ortus, à crasso videlicet succo congregatus. 5. de comp. med. loc. cap. 3.

Iris oculi, aliis Stephanon, & Corona, est medius ille oculi locus, quo committuntur inter se tunicæ universæ. 14. meth. 19. Sive, Iris est oculi tunica mollissima, alba, desinens in circulo, ubi & aliæ omnes subjectæ sunt tunicæ, & album nigro conjungitur. 10. de usu part. cap. 2. Inditum ei fuit nomen, ab arcus cœlestis similitudine.

Isarodes bilis. Vide Bilis pallida.

Ischias, & Ischion. Vide Coxa, & Arthritis. 2. meth. 2. & 15. de usu part. cap. 8.

Ischiadica vena est, quæ supernè descendens, ad partem cruris intimam tendit, & occultatur, quod usq; ad malleolum veniat exteriorem. lib. de anat. viv. Eadem hæc vena, externa malleoli dicitur, & Ischiadica, quod secta Ischiadicis conferat.

Ischæma, medicamentum est, ad sanguinem fluentem continendum, supprimendumq; 5. de compos. med. loc. c. 14. Græcè ἰσχμα, pauld diversum ἀπὸ τῆς ἰσχυρῆς & ἰσχυρῆς: hoc enim non sanguinem modò supprimit, sed & inflammationem arcer; illud verò tantum sistendi sanguinis causâ usurpatur.

Ischuria, ἰσχρία, est urina suppressio & retentio: Dysuria, in quâ urina redditur cum difficultate: Straguria, cum guttatim destillat, quam & Urinæ stillicidium appellant, de constit. art. 6. & 8. de placit. 6. Fit autem urina sup-

suppressio, vesica, vel externere non valente, vel ejus collo conclusio: duplex est: proprie aut improprie dicta; illa jam definita est, hæc est illud symptoma, cum urina in vesicam omnino non venit, deperditur scilicet renum actione. Cololum porro vesica clauditur, vel propter obstructionem à sanguine concreto, tum crasso pure, tum calculo, tum topho, tum aliquo germine carneo, ibidem enato, vel propter conniventiam, ab aliquo tumore præter naturam, aut cum immodicè est repleta. 3. de sympt. caus. cap. 2.

Ilis emplastrum, est Cephalicum emplastrum. 2. de comp. med. per gen. cap. 18.

Isthmus, est regio communis gula & gutturi angusta & longa, in qua utriusq; osculum ascendit: Corpus vero hunc locum ambiens, Pharynga, i.e. fauces vocant. lib. de musc. diss. cap. 15. Isthmus ea pars corporis est, ait Gal., quæ os & gulam interjacet; per metaphoram ita nominatur, deductam ab iis, qui proprie dicuntur Isthmi; cujusmodi sunt angusti; quidam terræ processus, inter duo maria siti. Unde Paristhmia, i.e. Tonsillæ, sunt inflammationes locorum, & parvium, ad hunc Isthmum pertinentium; 2. aph. 26. quæ ratione id quod $\rho\alpha\sigma\tau\epsilon\varsigma$ idem erunt, h.e. latitudo & capacitas, quæ inter stomachum, & laryngem, i.e. guttur, interjacet.

Ichmoidea ossa. Vide Cavernosa.

Judicium, sive Judicatio, Vide Crisis.

Judicatoria signa, ab Hippoc. vocata sunt, sudores, rigores, sanguinis fluxus, multum alvi profluvium, similiter vomitus, dolor capitis repente invadens, vehemens spirandi difficultas præter rationem, cordis morsus, quedam in Hypochondriis citra insignem dolorem iensus, vigilie vehementes, delirium, nox absq; ratione molesta, accessio

anti-

anticipans, lacryma involuntaria, nihil patientibus oculis, neq; ex tristitia provenientes, rubor faciei, labrum inferius agitarum, livida vel obscura & tenebrosa quedam ante oculos observantia, hallucinationes quedam male, vel nasus repente rubescens, parorides, aut omnino aliquis in articulum decubitus generatio, & similia, quatenus subitam mutationem in morbis in melius pejusq; fieri ostendunt, Judicatoria signa appellantur: ita enim morbum judicant, ut cocto morbo, futuram sanitatem; crudo autem, vel perniciem, vel morbi longitudinem decernant. 1. aph. 12. Vide Decretorius.

Jugale os. Vide Zygoma.

Jugulares venæ, $\phi\alpha\delta\tau\epsilon\varsigma \phi\lambda\epsilon\tau\epsilon\varsigma$, sunt duo rami magni & insignes, vena cave à gibbis Hepatis exorta, qui postquam ad dextram Cordis aurem sanguinem tulerint, ab eo, tanquam ab initio, progressi, ad collum recto tramite festinant; in quo sunt duæ magnæ & insignes venæ, quæ ob id Jugulares vocantur. 2. acut. 10. & lib. de ven. & art. diss. cap. 7. Dicuntur etiam externæ, superficiariæ, Apoplecticæ, Guidez, manifestæ, à quibus quippe superficiariæ serè omnes colli, & capitis partes nutriuntur. 2. acut. 10.

Jugulum. Vide Claves.

Juleb. Vide Zulapium.

Juxtagingina, i.e. Cynanche. 1. aph. 12.

Ixiæ, Varices, sic dicuntur ab Aristotele $\iota\omicron\iota \nu\epsilon\gamma\omicron\omicron\iota$: sunt tamen, qui differre putant, vocantes $\nu\epsilon\gamma\omicron\omicron\iota$ s, venas omnes dilatatas, in quacumq; corporis parte; isias vero eas modò, quæ in cruribus habentur: sed discrimen nullum censendum est.

LABOR, ab Hipp. sæpius consuevit sumi pro exerta citatione, interdum pro dolore, deniq; etiam pro quâlibet noxâ & læsione. com. 5. in 6. de morb. vulg. 10.

Labrum, sive Labium, χαλθ, est oris extremitas musculosa, id ipsum alternatim claudens, & aperiens; unde quod in labiis prominet & quasi propendet, πρὸ χαλθον dicitur. 11. de usu part.

Labyrinthus. Vide Cœcum foramen.

Lactes, apud Hermolaum barbarum, & Plinium significant & sunt molliora intestina, potissimum in homine & ove, per quæ cibus & chylus labitur; sed apud Aristotelem, Gazam, Budaum, & Galenum 5. de loc. aff. cap. 7. Lactes sunt & significant omentum, reti aucupario simile, seu pingue illud, quod intestina superiora ambit. Id ipsum Nostrates in piscibus lactantiâs, & lactumas vocant.

Lacuna. Vide Choana.

Lævæ arteriæ, Arteriæ venosæ, & Venæ arteriosæ, per pulmonum substantiam propagatæ & dispersæ propagines sunt, quas omnes natura per anastomofin, ad unum principium applicuit, sinistro Cordis ventriculo, in quo siquidem caloris est principium, ut per eas refrigeratio continua, Cordi compareretur. 7. de usu part. cap. 9. Vide Arteria.

Lævitas intestinorum, Græcis λαγνεία dicitur, est velox, & sine ullâ omnino præcedenti transmutatione, ciborum dejectio, eveniens aut propter exulcerationem superficialiâem ventriculi & intestinorum, aut propter potentia repentris eorundem imbecillitatem; quorum primum ex mordacibus substantiam tenuem habentibus humoribus

bus fit, qui in pueris etiam Aphthæ, i.e. oris ulcera concitat; alterum verò ex magna ventriculi atq; intestinorum provenit intemperie. 3. aph. 22. Vide Intestinorum difficultas.

Lagochilos. Vide Lagophthalmos.

Lagonas. Vide Ile.

Lagophthalmos, i.e. leporinus oculus, est, cum superior gena adeo retrahitur, ut oculum, dum clauditur, totum non contegat, estq; affectus in partibus instrumentalibus, non in magnitudine, sed in defectu, non ut supervacaneum, sed veluti deficiens, cujusmodi mutila, & curta omnia, sicut in labris, sic & in oculis, cernitur. Hinc etiam Lagochilos dicitur, qui leporina habet labia. lib. Introd. cap. 3. & lib. finit. med.

Lambdoides, sutura capitis posterior est, & transversa, quâ occiput incipit, à Λ litera Græcæ similitudine ita nominatur. lib. de ossib. cap. 1.

Lambdoides os. Vide Hyoides.

Laminas, communi vocabulo Anatomici appellare consueverunt instrumenta, ad secanda corpora accommodata; cujusmodi etiam sunt, scalpella, spathomela, amphimela, spicilla, oricularia, melorida, quæ & ex ligno densiori, & aliquando ex buxo, confici solent. 6. de anat. adm. cap. 10.

Lana succida, i.e. non lota, quæ & œsyperon dicitur. 14. meth. cap. 7.

Laparon, Græcis molle & vacuum, Hypolaparon autem, subvacuum & submolle significat. 3. de diffic. respir. c. 12. Sumitur & pro ventris dolore. com. 3. in 6. de morb. vulg. 32. Vide Ile.

Lapideum os. Vide Lithoides.

Lapis specularis. Vide Diaphanes.

Lapis in vesica. propria passio est ferè puerorum, qui ob edacitatem non paucos crudos humores coacervant; ex quibus pars crassior, unà cum urinis ad vesicam perveniens, fit lapidum generationis materia: acervatur verò hic crudus humor, sæpe ob edacitatem & ingluviem, ut in pueris; sæpe etiam ob potentia concoquentis imbecillitatem, ut in senibus. 3. aph. 26.

Larynx sive guttur, est suprema bronchii pars, seu bronchii caput, prima aspera arteria pars, summo ori continua, primum vocis instrumentum, lib. de vocal. instr. diff. cap. 2. ex cartilaginibus, musculis, nervis, & substratâ membranâ constans, c. 4. quæ larynx in collo extare apparet, ad sensum, tangentibusq; dura sentitur, & sursum nobis transglutientibus fertur. 7. de usu part. c. 5. Λάρυγξ Græcè.

Lassitudines, νόσος, Græci vocant affectus, ex multo vehementi motu corporibus vel totis, vel partibus, quæ amplius laborarunt, oboriri soliti: unde Acopa medicamenta, quæ lassitudinem tollunt, appellatur, 7. de compos. medic. per gen. c. 11. Lassitudinis species tres sunt, ἐκπόα, τὸν πόα, & λειψόα, Ulcerosa, Tensiva, Inflammatoria: quæ notis & signis propriis distinguuntur; in Ulcerosa enim Lassitudine, ulceris sensus, cum moventur partes, se exhibet: in Tensiva, incendi tendiq; sibi videntur, qui laborant: in Inflammatoria, accensa, inflammata confusaq; apparent membra.

Lateralis morbus. Vide Pleuritis.

Latum os. Vide Dorsum.

Latus musculus, μυοειδὲς ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ, apud Gal. lib. de muscul. diff. c. 1. est latus ille musculus, qui sub cute in collo habetur. Incipit, in priori quidem parte, ex labrorum

ac

at buccarum; in posteriori verò, ex spinæ regionibus, toti curi, quæ circa collum est, in orbem subtensus & membranofus, ut interdum membrana potius, quam musculus videatur.

Latus pulsus est, qui pulsus naturali, in latitudine major est; Longus, qui in longitudine; Altus, qui in profunditate. Econtrâ Angustus, Brevis, Humilis. l. de puls. ad Tyron. cap. 2.

Laxius intestinum, i. e. Colon. 2. aph. 40.

Lea, seu lenia medicamenta sunt, quæ partes asperas leniunt. l. de Dynam. in proem.

Lemmata, sunt propositiones per se credibiles, quas vocare consuevit Aristoteles dignitates, vel proloquia, vel postulata. 2. acut. 20.

Leno, sive Linon, Græcè ληνός, est regio in summo vertice Cerebri, ubi duæ venæ invicem congregiuntur à torculari similitudine, propter tenuem membranâ. Vide Torcular.

Leporinus. Vide Lagophthalmos.

Lepidoides sutura, λεπιδόειδος, vel conglutinationes, Galenus futuras juxta aures vocat, quæ in ossibus, ad squamæ similitudinem structis, habentur. Fiunt hæ duobus inter se ossibus coherentibus, non per suturam quidem, sicuti Coronalis & Lambdoides, sed paulatim syncipitis os, instar squamæ attenuatum descendit, atq; in id os, quod infra ab auribus ascendit, subintrat. lib. de ossib. cap. 1. Squamosæ agglutinationes nuncupantur, 9. de usu part. c. 18. Mendosæ adhuc & temporales dicuntur. Ibid.

Lepra, λέπρα, est cutis mutatio in habitum præternaturalem, cum asperitate, & pruritis, & doloribus, nunquam & squamis decidentibus plures corporis partes depascuntur. lib. finit. med. Lepra, & Psora, seu Scabies,

affectus sunt valde affines & congeneres: ita ut Psora nihil aliud sit, quàm mitior Lepra; est enim Psora ad Lepram quedam quasi via, ut Lepra ad Elephantiasin, si magis humor uratur, malignior evadat, & morbus diutius protrahatur. Uterq; affectus pruritus habet inseparabilem, sed in Lepra tantus est, ut ager etiam vehementissimè scalpendo, nullo modo juvetur, sed omnis potius generis ulcera & phlegmonas accersat, quod cutem exasperet, & subiectam illi carnem, multò quàm in Psora profundius depascatur. Unde & squamulas procreat, quales in Psora non generantur, quæ sursuracea tantum corpora ex se remittit, ut quæ à minori gignatur intemperie, & humore minus crasso, terrestri, assato, & maligno. Ab iisdem illis squamis dicitur λεπροι, quasi λεπιδά, i.e. squamosa; ab Avicenna dicitur Albaras nigra, & Impetigo excortiva, quod cutis in cortices quasi squamasq; resolvatur. Lepram hanc Celsus lib. 5. vocat Impetiginem, quam in quatuor species distinguit, quæ à superiori Impetigine plurimum distat.

Lethargus, Græcè λήθαργος & ληθαργία, passio est Phrenitidi contraria, siquidem in ea inexpugnabilis dormiendi necessitas adest, perinde ut perennes vigiliæ Phreneticos infestant. Dicta autem Lethargus, quod eo corruptis, omnium rerum oblivio accadat. Somnus siquidem, si longius producatur, difficilemque habuerit expergesfactionem, Coma dicitur; si verò solo tempore naturæ modum convenientem exceßerit, & non habuerit difficilem expergesfactionem, somnus longus rectè nominatur, qui sit refrigerato primo sensorio, Cerebro ipso: quæ refrigeratio cum fortis fuerit, mista quidem humiditatis facit lethargicas passiones; cum siccitate verò,

Cata-

Cataleptæ, i.e. deprehensiones vocatas, 2. aphorism. 3.

Leuce, λεύκη, i.e. alba Vitiligo, 2. meth. 2. seu corporis & pilorum in album colorem mutatio, præter naturam. lib. finit. med. & 1. de compos. med. loc. c. 1. Neq; verò ad solam cutem, sed & ad subditam quoq; ejus carnem, vitium hoc pertinet. Fit porro cutis & caro alba, & pituitosa, qualem Polypodes & locusta, ceteraq; crustacea, exangui & albâ carne prædita obtinent. Id ipsumq; malum videtur esse, quod Nostrates Lepram albam, Avicenna Albaras album nuncupavit. Differt à Lepra, & Elephantiasi, quod hæc sint cum asperitate cutis, rosione, pruritu, & squamulis, Leuce verò cutem habeat lenem sine ulla aspredine & rosione.

Leucoma, λεύκωμα, i.e. oculorum albugo, 1. de remed. par. fac. est cicatrix oculorum altior, magisq; profunda; sicuti quæ superficiali est, vsφελος dicitur.

Leucophlegmatia, i.e. alba pituita, Aqua inter cutem; sic dicta, quod sui quidem ratione semper sit alba, sed propter misionem quorundam aliorum humorum, verum mutet colorem. 7. aph. 29. Eadem est cum ea Hydropsis specie, quæ Hypofarcidium, sive Anasarca dicitur, vsφελος & φλεγματίας. lib. Introd. cap. 13.

Lichene affectio. Vide Imperigo.

Lien. Vide Splen.

Lienteria. Vide Intestinorum difficultas.

Ligamentum, Græcis συνδεσµος, est corpus nervosum, quod ex osse omnino ortum habens, inseritur in os, aut in musculus. Nomen ipsi ab usu est inditum: 1. de motu musc. cap. 1. quod & Copula dicitur. lib. Tigni, cap. 9.

Ligatio, dicitur de obstrictis articulis & difficilibus artuum motibus, quos Græci Ancylas vocant. 7. de compos.

med. per gen. cap. 6. Est & affectus, qui interdum naturaliter accidit, membranis linguam continentibus durioribus & brevioribus statim à primo ortu factis; interdum ex acquisitio, ob cicarricem quampiam duriores ex ulcere contractam; quam Græci *κυσθηδον* vocant: qui hoc malo laborant, tardè sermonem explicare incipiunt: atq; ob id, hoc virii genus, Latinis ligatio linguæ dici potest.

Lingula. Vide Epiglottis.

Linon. Vide Leno, & Torcular.

Linospemon, i.e. semen lini. i. de aliment. fac. 32.

Lipodermus, defectus est pellicula tegentis glandem Colis, adeo ut distrahi amplius non possit. lib. finit. med.

Lipopsychia, i.e. animi deliquium, idem quod Lipothymia, *λεποψυχία*, *ψυχολογία*, solis differunt gradibus, quod ex ipso liquet nominis etymo: Lipothymia vitalis facultatis defectum, Lipopsychia animalis facultatis exolutionem significat; attamen utriusq; facultatis defectu, omnium virtutum exolutio contingit, ut sensu motuq; destituantur agri, non minus quam animo: quale advenit iis, qui, nisi frequentius nutriantur, resolvuntur. 12. meth. cap. 5.

Lipothymia. Vide Lipopsychia.

Lippitudo oculi est, cum horum album rubescit, & palpebra attolluntur, cum dolore connivent, & agere minus admodum ferunt. lib. Introd. cap. 15. Vide Ophthalmia.

Lippitudo dura. Vide Sclerophthalmia.

Liquabilia medicamenta vocantur, tum quæ ignis contactu colliquantur, tum quæ ex humidis quibusdam, velut aqua, aceto, vino constant. Igne liquescit propolis, cera, resina, ladanum, serum, chalbanum: Aceto solo liquecunt cura ignem, gummi, ammoniacum.

cum, sagapenum, opopanaxum. 3. de comp. med. per gen. c. 5.

Liquida alvus, in qua liquida dejiciuntur. comm. 2. in 2. prorrh. 3.

Lithiasis, i.e. calculi morbus, renibus & vesica familiaris, in quibus quippè partibus calculi ut plurimum generantur. lib. de renum aff. dign. cap. 2. Dicitur & *λιθιασμός*, oculi morbus, in exteriori parte palpebrarum, in quâ alba quedam & crassa, callis aut lapillis similia apparent, oculum pungentia.

Lithoides os, *λιθοειδής*, i.e. lapideum, 9. de usu part. cap. 10. est, quod utring, ad aures positum, petreæ speciem referens, lambdoides sutura sinibus terminatur, in quo inest processus columna similis, ad acus stylivæ similitudinem: undè Styloides, Belenoides, & Graphioides, *στυλοειδής*, *βελονοειδής* & *γραφονοειδής* appellatur, sub quo auditorius meatus continetur. lib. de osib. cap. 1.

Lobi, i.e. fibra, quibus, tanquam digitis, Hepar, ventriculum, & Pulmo, Cor ad unguem complectitur. 4. de usu part. cap. 8. & lib. 7. cap. 10. & 7. de anat. adm. cap. 11. Dicitur & lobus, ima & carnosæ aurium pars.

Localia medicamenta, quæ Topica dicuntur, medicamenta sunt, quæ extrinsecus applicantur corporis partibus, quibus herclè non prius utendum, quam totum corpus purgaveris, venamve incideris, si redundantia in toto corpore subest; alioquin implebis potius corpus, quam vacuabis. 13. meth. 22.

Lochia, *λοχία*, dicuntur omnia, quæ à puerperâ post exclusum foetum & secundas exeunt, Aristoteles vocat purgamenta: sunt autem reverà τὰ καθαρτικά, à quibus etiam solâ ratione differunt, quod hæc ante partum, illa post partum, sic appellantur. lib. de atra bile, cap. 8.

Locus, à recentioribus Medicis, corporis particula quæ libet p. n. affecta appellatur. 1. de loc. aff. 1.

Longaon, sive Longanon intestinum. Vide Rectum.

Longitudinalis sutura est, quæ à medio posterioris Calvaria, per capitis longitudinem, ad mediam usq. anteriorem extenditur, unde Græcis ὀρθαία, i. e. recta, vulgò sagittalis, & longitudinalis appellatur, à lambdoide ad Coronalem finiens. lib. de ossib. cap. 1.

Longus pulsus. Vide Latus.

Lapidoides sururæ, quæ & Lepidoides dicuntur. Vide Lepidoides.

Lordosis, i. e. excavatio, per vertebrarum luxationem, ad internas corporis partes facta. 4. de loc. aff. 3. Vide Cyphosis.

Lotium est, cum renes serosum sanguinis excrementum attraxerint, utilem, qui in eo est, sanguinem retinent, & ex eo nutriuntur, excrementum verò ipsum serosum, à facultate segregatrice, seu inutile expellitur per ureteres in vesicam, sed quamdiu in venis atq. arteriis hoc cum sanguine currit, excrementum serosum, serositas dicitur: ut cum segregatum est, lotium & urina vocatur. lib. de ren. aff. dign. cap. 1.

Luctuosa respiratio, est inspiratio interrupta & quasi duplicata, geminataq. aëris revocatio, stante interim thorace, deinde rursus id, quod deest, adjiciente, qualis infantibus velut superinspirantibus accidit, quo tempore plorant. 6. aph. 4.

Lumbrici. Vide Elminthes.

Lumbi, ὀσφύς, propriè pars est totius spinæ infra dorsum, sive thoracem, quinq. vertebris omnium crassissimis, maximisq.

rimisq. compacta, inter dorsum, & os sacrum mediis. Brevis alii ajunt, Lumbi sunt dorso ea pars, quæ cingimur. Vide Dorsum.

Lupus, seu Strangulator, Græcis λυνοεδὺς, est affectus, is eveniens, qui sperma diu præter naturam retineant; quod veneni naturam induens, in venis & arteriis, dum nequivit ejaculari, anginosam generat passionem in faucibus, & quandam quasi suffocationem. lib. de spermat. fol. 36.

Lusciosus dicitur, qui eo affectu, quem Nyctalopiam vocant, vexatur. 10. simplic. Νύκτωρ is dicitur, qui à primo ortu, non nisi oculis admota maximèq. vicina videri, eademq. propè oculis contingit, & limis semiclusisq. oculis aspicit, etiamsi parva sint; remota verò, quamvis magna, videre non potest. Vitium oculorum est, congenitum ab imbecillitate visiva virtutis animalis, spiritusq. visivi, eamq. ob causam incurabile: differt à Nyctalope, quippe qui non naturâ, sed ex morbo, talis evasit. Νύκτωρ Græci, Latini Lusciosos, & Nusciosos vocant; ipsa verò affectio νύκτωρ, & νύκτωρῶς appellatur.

Lutea bilis, i. e. vitellina. 8. de placit. 4. Vide Bilis pallida.

Luxationes, quas ossium ex cavitatibus suis exidentias, exarticulationes, & exarticulata interdum vocat Hippoc. sunt ossium à propria sede excessus, sine fractione eorundem facti. 1. de fract. 1.

Lycanthropia, Græcè λυκανθρώπια, λυκανθρώπων, λυκανθρώπια, λυκανθρώπων, λυκάνω: Arabicè Catrab, Curubut; Latine Lupina, vel Canina infania: species est Melancholia, ut testantur Aërius & Paulus, quæ agri inprimis mense Februario, quo humor melancholicus re-

dundat, noctu domo egressi, urbem circumcunt, quadrupedum more incedentes, lupos imitantur ululantes, donec dies illucescat, defunctorum monimenta quarant, adaperiunt, cadaverum frustra arripiunt, secumq; collo gestantes, fugiunt die vivos homines, nocte insequentes mortuos.

Lycoides. Vide Lupus.

Lyparia febris. Vide Febris lyparia.

Lytheria, i.e. solutoria signa, quæ magni & vehementis morbi solutionem firmam solent præcedere. i. de dieb. decret. cap. 1.

M

MADAROSIS, *μαδαρώσις ἢ μαδαρώσις*, i.e. Glabrities, Calvitium, capillorum destitutum est, à cacochymia & vitiosis humoribus proveniens, quales affectus sunt Ophialis & Alopecia, quæ omnes passionis sanabiles sunt, vitiosis humoribus, qui ad radices capillorum herebant, vel resolutis, vel aliò translatis & vacuatis. 6. aph. 34.

Madorem & Pladorem, i.e. superfluentes humiditates, appellare consuevit Hippocrates, siue tenues, siue crassiores, cuiusmodi & pus est. 3. de fract. 19.

Magma, in specie mirobalanorum facem vocant, 7. de compos. med. per gen. cap. 7. Aliqui verò omnem unguentum facem, quæ expressa liquidiori materia utili relinquitur, & in fundo subsidet, *μαζύμα* vocant. Extenditur quoq; nomen hoc ad omne unguentum spissum pauco liquore subactum.

Magna arteria. Vide Arteria aorta.

Magna febris. Vide Febris magna.

Magnus morbus. Vide Affectus gravis.

Magnus pulsus est, qui naturalem pulsum omnibus tribus dimensionibus superat; qui verò isdem dimensionibus,

bus, à naturali pulsu superatur, parvus dicitur. 1. de puls. ad Tyron. cap. 2.

Malæ, carneæ partes sunt, quæ inter nasum & aures jacent, priscis Genæ dicuntur, lib. Introd. cap. 10. sic dictæ, quod rubentes ad mali similitudinem sub oculis leniter rotunda prominent. 1. de artic. 3.

Malactica medicamenta sunt, quæ induratorum solvunt duritiem: quemadmodum relaxantia, quæ tensioni medentur, nuncupantur. 7. de compos. med. per gen. cap. 9. Malacticum autem emolliens dicitur eorum corporum, quæ induruerunt, ac in quibus contentus est humor præter naturam, velut partes sunt scirrhusæ; quod verò à siccitate induratum est, humectari postulat: quod à congelatione, calefieri. Græcè *μαλακτικὰ φάρμακα*. 5. simpl. 5.

Malagmata, aliàs Cataplasmata, vocant omnia pharmaca, quæ forinsecus imponuntur, siue adstringendo condensent, siue indurent, siue emolliant. 8. de compos. med. loc. 5. Propriè autem Malagmata vocantur, quæ partes præter naturam induratas emolliunt, moderate sunt calida, nec tamen exsiccant, aut humectant insigniter. Nam, cum exactè mollientia, medium quodammodo ordinem inter humectantia siccantiaq; sortiantur, proin moderato suo calore, indurescentium substantia, veluti fusionem quandam molliuntur; ubi verò diutius diffusa fuerint, digerentium medicamentorum loco esse possunt. 7. de compos. med. loc. cap. 1. Undè quidam nullum discrimen constituunt inter *μαλαγµατα*, *ἐμπλάσµατα*, & *τροχισµατα*. Porro, Malagmata aut mediis corporis regionibus, (quæ propriè *ἐντρίµια* Paulus appellat) ut Ventriculo, Fecinori, Lien, Cordi, imponuntur; aut extremis partibus, ut Capiti, & articulis, admoventur.

Ma-

Maligna. Vide Cacoëthe.

Malleoli, sunt ima ab utroq; latere tibiae, sura, partes gibbae, ex parte exteriori, intrinsecus cavae, carne carentes, extra alia prominentes, sub quibus utring; talus continetur. lib. de ossib. cap. 22.

Malleoli vena duplex est, altera interna, ad interiorem tibiae partem (Cream Latini vocant) procedens, ac inde ad malleolum, ad ipsum tibiae extremum, pervenit. Hac & Saphena corrupto vocabulo, pro Saphena, i.e. manifesta, dicitur. Altera externa, & superficialiaria, per exteriorem alterius ossis tibiae, quod περὶον vocant Graeci, producitur, ad pedis pertingens articulum; unde Externa malleoli, & Ischiadica vena aliquibus dicitur.

Malthacode emplastrum, i.e. mollicinum, quo genere Hippocrates omne medicamen vocat, quod connatam humiditatem habet, qualis in pinguius est & oleosis medicamentis, & quidem in ipso oleo, aqua, resina, & cera. 4. de compos. med. per gen. cap. 9.

Malum granatum, & Malum punicum. Vide Cartilago ensiformis.

Mammæ, (μαστός ἢ τῆτος Græcis) est carnosae in pectore, ad utrumq; latus, eminentia glandulosa, semicircularis, in cuius medio papilla (Græcè θῆλη) extuberat, quam ambit circulus quidam subniger, qui φῶς dicitur, gignendi lactis vim à natura habens. 1. de sanit. tuend.

Mammillaris, μαστοειδής, est apophysis ossis temporalis, papillis mammarum, praesertim vaccinarum, similis: Extuberat, & cavus est, quo aer in ampla & anfractuosa ejus cavitate conclusus, magis resonet auribus. Dicuntur etiam quibusdam Uteri cornua, νεφῶδες dicta, μαστοειδῆς ἀνοφῶδες, propter similitudinem, quam habent cum mammis. Man-

Mancum, & Mancinitatem, aliàs Cyllon, & Cyllosin nonnulli, de omni membrorum distortionem dicunt: alii eam tantummodo distortionem significant, in qua, in interiorem partem, membrum inclinatur, quod cum accidit, necessum sit, ut summum ejus, E. G. pes intro contortus, quasi mancus & mutilus appareat. 3. de artic. 87. Vide Cyllum.

Mandibularii, Manducatorii, Manforii, Masseteres musculi, Græcè μαστοῦγες ὄντες, à mandendo sic dicti, alii sunt à temporalibus, quos Crotaphitas vocant; nam Anatomici, eos temporales, seu temporinos nominant, qui ex ossibus temporum capitis exoriuntur, quos, cum intenduntur, committere ac claudere os manifeste conspicimus; alios vero, qui latis, inferioris maxilla partibus, utring; alter, superjecti sunt, propterea quod in manducando, maxillam circumagunt, manducatorios vocant, cum illi, qui è superiori parte deferuntur, efficere id minimè valeant; attrahunt enim sursum eam tantummodo, non traducere etiam hanc illac queunt: unde in committendo quoque ore, ipsorum auxilio indigemus. 2. de artic. 5. & 4. de anat. adm. cap. 2. & cap. 4.

Mania, Furor, Insania, μανία, species delirii vehementioris, 2. de caus. sympt. cum agri citra febrem insaniant, & mente alienati sunt; cui insania si adjungatur magnitudo & vehementia symptomatum, (ut, cum agri calcitrant, mordicis impetunt vel ingredienti, vel quoscunque obvios, ferarum more, diserpunt) Mania dicitur ex assata, vel atra, vel flava bile procedens. 3. de loc. aff. cap. 7. Quod si à sanguinis copia non purente originem ducat, erit quidem Mania, sed cum risu, hilaris vultu, & perpetuo cantu. Aliquando Hippocrati Mania

nia idem quod Melancholia propriè dicta. Gal. 6. aph. 21.

Manifesta vena, ramus est vene à Corde ad furculas ascendens, quæ per faciem, oculos, caput & nares dividitur, ut omnia membra nutriat, quæ inde manifesta vocatur. lib. de anat. viv.

Maniodes paraphrosynæ, sunt vehementes insania, propter attractibilis malignitatem, cum flava bilis Cerebrum apprehenderit, febriq; vehementia assarum hunc succum melancholicum reddiderit. com. 1. in 1. prorrh. 10.

Manna, mel roridum, vel ærium: Mellis species est, non ignota veteribus, Galeno, Plinio, Dioscoridi; sed mellis nomine, & titulo comprehensa, ne quis eam ab Arabibus primum cognitam, proditamq; putet: sic enim de ea scriptum reliquit Galenus; In foliis, inquit, stirpium adnascitur quidpiam, quod nec eorum succus, nec fructus, nec pars existimari possit, sed roridum quiddam, nectamen continenter, neque copiosè pronasce soleat. Nec me præterit, per ætatem, in arborum, fruticum, herbarumq; foliis plurimum fuisse inventum, sic ut à ludentibus rusticis, Jupiter diceretur melle pluuisse: præcesserat tùm nox frigidior, pridè calida, siccaq; cœli constitutio diluxerat; quapropter inter rerum Naturæ peritos conveniebat, halitus, quos terra vel aqua exspirasset extenuatos & excoctos, nocturni frigoris beneficio coaluisse. Id in regione nostra rariùs evenit, in Libano monte quotannis, adèd ut extensis pellibus arbores succutiant, & reciprocè quod profluit, olas, & scitilia compleant: privatoq; nomine vocant *ἀγοσμήν*, i.e. roscedum mel, & etiam *ἀἰρούνη*, i.e. mel ærium. Hæc Galenus 3. de alim. facult. cap. 39. de Melle.

Melle. Cuiq; igitur patere debet, notam Galeno Mannam, quæ gustu prorsus mellea sentitur. Dicitur item & Manna thuris, (quæ & succussio, & Pollen nuncupatur, 2. de artic. 44.) i.e. thuris micæ, concussu elisa corticis parum participes, adstringendi vim totam & qualitatem possidentes. 5. de compos. med. per gen. cap. 2. Videtur aliquibus Mannam thuris nihil à thure trito ac lævigato differre; Mannam enim propriè appellant id, quod excussum est à thure, circa magna onera confrecto; auferuntur enim ab ipso fragmenta quadam parva corticis thuris. 4. de compos. med. loc. cap. 4. & 13. meth. 5.

Manus, (quas homo armorum loco obtinuit) sunt iuxta Aristotelem, organum ante omnia organa; cum quolibet organum aliud particulare possint recipere, 1. de usu part. c. 4. Manus autem, nunc totum artum superiorem, brachium scilicet, cubitum & manum significat; nunc extremam manum tantum. 2. de usu part. cap. 2.

Manus dolor, Græcis *χεῖρας*, Arthritidis species est, quæ manuum articulos occupat: ut Gonagra, quæ genu: & Podagra, quæ pedes.

Manforii musculi. Vide Mandibularii.

Marasmus, sive Ex morbo senium, est frigidum, & siccum corporis temperamentum, non naturæ, vel annorum multitudinis ratione comparatum, sed febrili morbo: quod non in animalibus modò, verum etiam in stirpibus supra modum arefactis, visitur. 5. de sanit. tuend. cap. 9. Marasmus itaq; idem est quod Tabes, quæ non idem est ac febris tabida sive marasmodes; Marasmus enim absq; febre in decrepita aetate solet accidere, extincto nativo calore, & superveniente morte, quæ sine sensu doloris secundum naturam ex siccitate contingit: sicuti his, qui præ-

præter naturam tabescunt, altera advenit species, quæ Ex ægritudine senectus vocatur, in quam non solum senes, sed etiam pueros vidimus incidisse quamplurimos. Tabida verò febris non tantum sicca, sed calida est. i. de diff. febr. cap. 8.

Marcor, Marcor frigidus, torridus. Vide Febris marcida, & Ex ægritudine senectus.

Mariscæ, venule sedis sunt, quæ aliquando foris extuberant ex ore hiantes, stato tempore sanguinem melancholicum excernunt: alias hæmorrhoides dicuntur, quibus plus justo fluentibus, aqua inter cutem subsequitur; interdum delinescunt, & cœcæ œmorrhoides appellantur. Vide Sycofis.

Marmarygas, i.e. oculorum hallucinationes. 3. de crisi. ii. & cap. 7.

Masseteres. Vide Mandibularii.

Mater dura, & pia. Vide Membrana dura.

Matrix, i.e. vulva, foris nervosa, intus carnosior, vas foetus gestandi, à Græcis Hystera, quod omnium partium sit postrema, appellatur. lib. finit. med.

Maxillares dentes. Vide Dentes, Tomi, Incisorii.

Maxillæ, sunt illæ faciei partes, quæ genis subjectæ admentum usq. descendunt, & hac in mucronem desinunt. lib. Introd.

Meatum, sive Porum simpliciter Herophilus appellat nerrum opticum, qui à Cerebro ad oculum pertinet, sensibilibus spiritibus via, quod ejus solius foramen clarè cervitur. i. de sympt. caus. cap. 2.

Meatus auditorius est, qui in osse lapidoso est, satis involutus & anfractuosus, ne quid eorum, quæ extrinsecus incidunt, ipsi noceret, ipsasq. aures facile offenderet, proin

in medio situs, extrinsecus quidem convexarum, intrinsecus autem cavarum. ii. de usu part. cap. 12. Constituitur autem in medio nervi quinta conjugationis, qui una cum duræ cerebri membrana, involucre velut suo, in auditus foramen incidit. Dicitur autem & hic meatus cœcum foramen, propterea quod anfractum illum, per quem nervus foras post aures excidit, haud possunt dissectiones perfecte perforare. lib. de nerv. diff. cap. 6. Vide Cœcum foramen.

Meatus genitalis est, qui genituram à testibus haustam, ad Colis radicem defert, qui juxta radicem vesicæ, varicosior conspicitur; unde ei nomen inditum est Vari-cosus alsiltens. i. de sem. cap. 15.

Meatus varicosus. Vide Meatus genitalis.

Meconium, excrementum est, ex toto foetus nutrimento, in utero, in urinaculo congeri solitum, toto uteri gestationis tempore. lib. Quod animal sit id. cap. 5. Est quoq. unguis, papaveris succus concretus, Græcis ὀνιον dictus. 3. simpl. 20.

Media, seu Mediana cubiti vena est, quæ communis est ei, quæ humeralis nominatur, & ei, quæ per axillam fertur. 3. de loc. aff. cap. 7. Dicitur alias purpurea, & nigra. lib. de anat. viv. Vide Communis vena.

Medianum, seu Mediastinum, sunt duæ membranae, utraq. parte, singula, totum thoracem διαφραγματος, i.e. intersepientes, quæ posteriore parte spinæ, vertebri, anteriore verò, ossi medio pectoris infiguntur, sursumq. ad Claves, & deorsum ad ensiformem cartilaginem porriguntur, in duas partes totum thoracem dividentes; unde vulgè Mediastinum sive Medianum vocant; his enim mediis thorax dirimitur, 6. de usu part. & 5. de anat. admin.

quæ membrana non aliter differunt, nisi quod in costis
transversis, i.e. succingentes appellantur; ubi verò rectæ
ad Claves feruntur, διαγχεῖσθες, i.e. intersepientes.
5. de anat. adm. Vide Diaphragmatones.

Medicari, generaliter loquendo idem est, quod me-
deri; propriè est idem quod purgare: neq. de omnis me-
dicamenti exhibitione, sed de eorum tantum, quæ purgant,
usu debito intelligitur. 2. de fract. 29.

Medicamentum, omne id dicimus, quod nostram na-
turam alterare potest. 1. simplic. 1.

Medulla spinalis, (sive Dorsi medulla, & Rachi-
tis, Græcè μῆλα, & vulgò Nucha nominatur) omni-
bus & singulis vertebris inexistens. 8. de usu part. cap. 4.
Cerebro, velut principio suo, continua, ejusdemq. cum eo
generis & naturæ, nisi quod ipso multò est durior & com-
pactior, potissimum in infernis spinæ finibus: eam tamen
perperam Medullam appellantur; cum medulla ipsa,
non modò spinali hac, verum etiam Cerebro ipso sit humi-
dior, mollior, & pinguior; quod verò in spinæ osibus conti-
neatur, coloremq. habeat medulla asimilem, ob id ipsam
medullam nominant; quo modo etiam quidam ipsum
Cerebrum vocitantur. 3. de alim. facult. cap. 10. Communi-
ter eam spinalem vocant medullam, additâ scilicet
medullæ appellatione, interdum verò sine additione
simpliciter spinam nuncupant. 3. de loc. aff. cap. 10. Vide
Myelon.

Megalosphachnos, vocat Hippocrates non eos dun-
taxat, quibus ab ortu primo, magna & supra modum
aucta ipsa sunt viscera, sed quibus ea, ex affectu aliquo, in-
tumuerunt, sive scirrhum, sive phlegmonem, sive œdemā,
nacta sint. 3. acut. 9.

Me-

Melancholia morbus, est delirii species, ab humore
melancholico, (à quo etiam nomen sortitus est) in ipso Ce-
rebrī corpore p. n. contento, atq. id ipsum p. n. alterante,
concitata, qui ipse humor, si asserur, Maniam facit, & su-
rorem. 3. de loc. aff. 7.

Melancholia flatuosa, sive hypochondriaca af-
fectio, morbus est, ex tertiâ melancholia specie, indican-
te nomine humorem, qui ipsius causa est. Cum circa
ventriculum prima inciperint accidentia, ipsisq. auctis
melancholica sequetur affectio, deinde alvi dejectione, vo-
mitu, probâ coctione, ructibusq. levatur is, qui laborat,
Hypochondriacum, flatuosumq. morbum ipsum nomina-
bimus. 3. de loc. aff. 7.

Melancholicam ecstasin, vocat Hippocrates mo-
tionem mentis, aberrationemq. vehementem & ferinam,
quæ irrigante Cerebrum flavâ bile exusta & in nigram
permutatâ exoritur. 1. prorrh. 14.

Melancholicus humor duplex, alter propriè me-
lancholicus succus & sanguis dicitur, sex sanguinis cras-
sior, facibus vini haud absimilis, qui in terram effusus non
inducit fermentationem, nisi fortè in ardenti febre asserur,
neq. ullius acidæ qualitatis est particeps, qui in meatibus
Cerebrī contentus, Comitialem morbum, in Corpore Ce-
rebrī, Melancholiam morbum generat. Vide Nigra bilis.
Altera Melancholia est tenuior, gustu acidâ, terram ra-
dit, attollit, fermentat; ampullasq. excitat, in specie atra-
bilis dicitur, quâ præassata nascuntur, ferina deliramen-
ta cum & sine febre. 3. de loc. aff. cap. 7. & 2. de diff. febr. 9.

Meliceris, *μυλκίς*, est apostematis species, humorem
melli similem membranâ conclusum habens, perinde ut
ἀποσπασμα, & *φλέγμα*, hoc quidem ab adipe, illud verò à

pulcrulâ intra membranam conclusâ nomen habet. Meliceride dissectâ, inibi contentus humor non aliter, quàm mel è favis, diffluit. Vide Atheromata.

Meliceratum, sive Aqua mulsa, aut Hydromel, est mellis & aqua compositio, vel ex aqua utriusq; portione, (ut viam urinæ paret, & ad distributionem agat,) vel alterâ alteram superante facta. 3. acut. 13. Licet quidam velint, *μελικράτον* τὸ τῆς ἀλκοουμένης, verustate differre, quod meliceratum sit Aqua mulsa subita & recens, h.e. ex tempore comparata, Hydromel autem inveterata, & recondita.

Melon, est tertius modus egresionis uveæ oculi, cùm tantum egreditur, ut palpebra minùs prævaleant, & pilis palpebrarum pungentes, clausis oculis, dolorem inferant. lib. de ocul. part. 4. cap. 11.

Membranam, Græci nunc *μυοβα*, nunc *χρτώνα*, nunc *αὐτόρυα* vocant. Vide Tunica.

Membrana Adelon, quasi minùs apparens, est quarta oculi tunica, à nonnullis invec̃ta, Amphiblestroidem tunicâ, quasi in summo excipiens, membrana minima simul & tenuissima, quam Hipp. non cognovit. lib. Introd. cap. 11.

Membrana dura, inviolata, crassa, cuticularis, Meninx dura, Mater dura, est, quæ calvariæ ossibus ablatis, aut saltèm apertis, Cerebrum in orbem contegens, primum apparet. Cui altera tenuis, mollisq; subnectitur, quæ pia mater nominatur, 9. de anat. admin. cap. 1. Utramq; Meningem vocant, solis Cerebri membranas nuncupatione hac reservatâ; tametsi Veteres, membranas omnes communiter, Meningas vocarent, Ibid. c. 2. quas etiam Vaginas vocant. 3. de artic. 33.

Membrana Pericardios, quæ & Tunica, & Domici-

micilium, & securum vallum, Theca item & Vagina, Capsula & Involucrum Cordis dicitur, est membrana, in cuius medio Cor est suspensum, quæ ex capite seu basi ipsius, ampla valdè exorta, post autem paulatim coarctat sese, eo planè modo, quo Cor ipsum, in quandam Coni acutiem desinit, ossi pectoris annexa, 16. de usu part. cap. 16. quæ Capsula Cordis, & Cordis Involucrum vulgò appellatur.

Membrana Periostios, est involucrum tenue, & fibrosum, velut indumentum ossium, à natura conditum, lib. finit. med. ut per illud ossa sentiunt, generaleq; nomen est, quod pro varietate partium, specialia sortitur nomina: in Cranio enim *περιστερίον*, in costis, *πριστεριον* dicitur. Vide Periostios.

Membrana pinguis, i.e. Mesaræon, & Mesenterium. 10. meth. 8.

Membrana secundiformis. Vide Choroides.

Membrana Sigmoides, sunt tres illæ Cordis ventriculi dextri membrana, præpositæ venæ arteriosæ, à qua Pulmo alitur, intùs foràs spectantes, quas à figura literæ S Sigmoides appellârunt. 6. de usu part. cap. 14.

Membrana subcingentes. Vide Hypezochotes, Cingentes, Diaphragmantes, & Medianum sive Mediastinum.

Membrana Triglochina, sunt membrana in ventriculo Cordis sinistro, præfecta arteria venosa, (quæ in pulmonem distribuitur) foris intrò pertinentes. Triglochinas appellârunt, non à figura aliqua, sed à mutua inter se ipsarum compositione, quæ cuspidum, telorum eminentiis, atq; angulis, quos glochinas vocant, penitus est similis. 6. de usu part. cap. 14.

Membra spiritalia sunt, Pulmo, Cor, Thorax, & duplex arteriarum genus, laeve & asperum. 7. de anat. adm. cap. 1.

Membrum simplex est, cujus quamcunq; partem sensibilem assumeris, erit illa toti communis, in nomine, essentia & definitione, ut caro, & os. Illi oppositum est Membrum compositum. lib. de anat. viv.

Mendosæ costæ. Vide Illegitimæ.

Mendosæ futuræ. Vide Lepidoides.

Meninx, Græcè *μηνιγξ*. Vide Membrana dura.

Meningophylax, *μηνιγγοφύλαξ*, i.e. membrana custos, sic dicta, quod in curationibus capitis affectuum, meningas, ab injuriis, & graviore oblatione tueatur. Lamina anea est, firma, paulum resima, ab exteriori parte levis, quâ Chirurghi, in vulneribus Capitis utuntur, quoties excidendum & attollendum est os, metusq; imminet, ne in ipso opere, Cerebri membrana negligentius, & ultra, quam res exposulat, premendo, ledatur & contundatur, ex quo sopores & graves inflammationes cum mortis periculo oriuntur. 4. de loc. aff. 2.

Menses, i.e. menstruæ mulierum purgationes, quæ per uterum singulis mensibus fiunt, lib. de atra bile, cap. 8. quæ & muliebris fluxus, & uteri Rheuma appellatur, 3. de caus. sympt. c. 4. Unde menses moventia medicamenta sunt, quæ in pesis, aut fomentis, aut quovis alio modo vulvæ admota, non habent vim tam familiarium succorum attractricem, quam ut sanguinem extenuent, & mea tus uteri, obstructione liberent. 5. simpl. 20.

Mentagra. Vide Impetigo.

Menti eruptiones, sunt affectiones ulcerosæ & asperæ, in mento sponte nascentes: aliàs menti papulæ, & men-

mentagræ appellantur. 5. de compos. med. loc. c. 6. & c. 7.

Mentum, quod Græci *μεντον* dicunt, id omne est, quod labro inferiori oblongâ & orbiculari figurâ subjacet. lib. Introd. cap. 10.

Meri Arabibus, Gula Latinis, Græcis propriè *σιστόν* & dicitur, & communiter *στόμαχος*; omni enim ventri, collum, instar Isthmi cujusdam, angustum præpositum, nominatur Stomachus. Meri autem communis quedam via est, quæ ab ore cibos & potum fert ad ventriculû, inter hunc, & fauces media. 4. de usu part. & 13. meth. c. 4.

Mesenterium, aut Mesaræon, utrumq; nomen ab accidentibus, naturali ipsius situ & peculiari substantiâ deductum; nam & medium inter intestina situm est, & omnes venas, ex jecore in ipsum descendentes (quæ ob id Meseraicæ dicuntur) vicinis arteriis, & nervis, quemadmodum etiam intestina singula, in orbem complectitur. 6. de anat. adm. cap. 6.

Mesenterii appendiculum, nominant illud unum Principium, in quo mesenterii venæ ac arteriæ (quæ veluti radices in arboribus, in concavam anfractuam partem, inferuntur) invicem cœunt, & in quo totum mesenterium cum intestinis continetur, ligamenti naturâ præditum, sursum tendens, adjacentes sibi habens venas, ad jecoris portas; arterias autem, ad eam spinæ partem, quæ in septum transversum & renes versum tendit. 6. de anat. adm. cap. 6.

Meseraicæ venæ. Vide Mesenterium.

Mesopleuria, i.e. intercostalia loca. lib. de musc. diss. cap. 23. Vide Intercostales musculi.

Metacarpium. Vide Brachiale.

Metalepticus, i.e. transsumptivus, vel translativus

motus, quem natura musculis quibusdam conciliavit. 7. de usu part. c. 14. Vide Transumptivus, & Euthyporos.

Metaptosis, transitus est, sive transmutatio, alicujus morbi, vel febris in aliam speciem: ut, si ex acuto fiat non acutus, tunc morbus acutus in τὴν μὲν ἀπὸ τοῦ ἀκροῦ & fieri dicitur.

Metaphrenum, i.e. Dorsum, media est scapularum pars, cui stomachus intus subjacet: lib. Introd. cap. 10. cui Thorax configuratur, tanquam ad carinam navis. lib. Tegni, cap. 29. Vide Spina, Dorsum.

Metaporopœsis, est exiguorum meatuum statumq; morbidi mutatio, ad naturalem statum: idem planè significans, quod μεταρρύθνησις, à quo μεταρροποιήσις nihil differt. 14. meth. 4. Undè Metasyncriticum medicamentum, idem saepe quod anodynon, confirmatorium est, & persanat, lib. de Dynamid. in proœm. & 7. de comp. med. per gen. cap. 11. ex alto quin & humores evocat & transfert. 1. de compos. loc. cap. 8.

Metasyncrasis. Vide Metaporopœsis.

Metastasis morbi propriè appellatur, cum ex parte unâ, in alteram, malum (morbis videlicet, causaq; morbida) migrat: per abusonem, ipsius morbi solutio ita etiam nominatur. 5. aph. 7.

Metopon, μέτωπον, pars faciei supra oculos sita, & ad tempora usq; protensa, ex substantia musculoſa, & ossè subjecto constans. Aliis frons dicitur spatium inter supercilia & capillos interjectum, pilis nudum. Alii totum id spatium, quod ab oculis ad coronalem usq; suturam extenditur, frontem & frontis os appellant.

Metrenchytae, i.e. uteri clysteres, instrumentum est, per quod in uterum medicamenta immittimus; perinde ut Otrenchytae, i.e. auricularii clysteres, per quos in aures &

& Recti Syphones, aliàs Catheteras dicti, instrumenta sunt, quibus in vesicam aliquid infunditur. 5. meth. 11.

Methodica medicina est, quæ communitatibus, & similium speculationi unice intenta, omnes particulares affectus, ad generales duos, adstrictum, & fluentem, quas communitates vocant, reducit. lib. Introd. cap. 3.

Milphosis, μιλφάσις ἢ μιλφωσις, idem est ac Madarosis, pilorum defluvium est ex palpebris, ab acri fluxione. Vide μαδάφωσις.

Mina Attica, & Aegyptia, habet uncias sexdecim, Romana uncias viginti. lib. de pond. & mens. cap. 3. Dicitur etiam Mina, Cordis capsula, & glandula. lib. de anat. viv.

Mochlia, traductio est osium ad naturalem locum, ab eo, qui præter naturam. lib. finit. med.

Modus morbi. Vide Morbi mos.

Mola, μῶλον, aliàs patella rotula, Græcis ἐπιγονάτις, à figura similitudine, sic dictum est os latum & rotundum, tori genu suprapositum. Dicitur in super Mola, caro informis, & inutilis, in muliebri utero concepta; quem conceptum inurilem, subdurus quoties fit, μῦλον sive μῶλον Græci appellant, i.e. scirrhum.

Molares dentes. Vide Dentes, & Tomi.

Mollicinum emplastrum. Vide Malthacode.

Mollientia medicamenta. Vide Malagmata.

Mollis pulsus est, in quo arteria quasi carnosior diutius contrectata apparet: durus, ubi siccior, rigidiorq; in modum Corii, l. de puls. ad Tyron. cap. 3. Mollitudo autem & durities, sunt tunicæ arteriarum qualitates. Ibid.

Mollities oculorum, (quæ & paralysis oculorum dicitur) morbus est, cum illorum voluntarius motus omni-

non aufertur: quemadmodum cum minuitur, tremor & titillatio dicitur. Cum vero depravatur, ipsiusque lacerti contorquentur, nec debite moventur, Spasmus nuncupatur. lib. de ocul. part. 4. cap. 7. Vide Paralysis.

Monoculum. Vide Cæcum intestinum.

Monohemera collyria sunt, quæ unius diei operâ, lippitudines apta sunt curare. 4. de comp. med. loc. c. 2.

Moram, i.e. Trivon, sive attritionem, Hippocrates appellat, callo obduratam sedem, quæ ex diuturna capitis brachii immolatione efficitur, in ea carnis circumjecta parte, in quam id primâ prolapsione incubuerat. 1. de artic. 21.

Morbidus rigor, corporis concussio est, sanis eveniens, à nulla exteriori causa violenta, sed ex ipsa dispositione corporis intussecâ, at cum aquâ frigidâ corpori affusâ rigor excitatur, non est morbidus rigor, uti cum ex ipsa corporis dispositione suscitatur. lib. de trem. conv. cap. 6.

Morbofum (νοσώδες) dicitur, ut corpus, ut causa, ut signum; nam corpora, quæ morbos continent; causæ, quæ eos efficiunt; & signa, quæ ipsos indicant, νοσώδη Græcis dicuntur. Gal. initio artis parvæ.

Morbus, νόσος, est dispositio præter naturam ladens operationes, 2. de cris. cap. 2. primò per se, & non per accidens, lib. de sympt. differ. cap. 1. Præter naturam, & contra naturam, idem sunt; utrumque uno verbo πάθος Græci dicunt: nam & sædus Ictericorum color, & lentigo, & alius quivis etiam levissimus affectus, contra naturam est, nec tamen morbus dicitur, quando propter sui exiguitatem & obscuritatem summam actionem non ladat.

Morbus Herculeus. Vide Comitialis.

Morbus magnus. Vide Comitialis.

Morbus puerilis, sive Comitialis affectus, ab infantem-

temperie cerebri f. h. iis provenit, quibus humidum naturâ est Cerebrum, teste Hipp. lib. de aère, aquâ & locis. ubi dicit, Pueris accidere convulsiones, & suspiria, quæ putant puerulum efficere, & sacrum morbum esse: ubi per puerulum, intelligit affectum comitalem. comm. 1. in 6. de morb. vulg. 5. Vide Comitialis.

Morbus regius, alias Arquatus, Aurigo, & Icteros dicitur, est bilis flava refuso in cutem & corporis superficiem, quæ proinde etiam hic tingitur, lutea quoque sit: albæ quoque ventris dejectiones sunt hoc morbo affectis. lib. finit. med. Vide Icteros.

Morbus sacer. Vide Comitialis.

Moria, & Morosis, sive fatuitas, Græcis μωρία, νόσος, est imminuta functio ratiocinatricis facultatis. de sympt. diff. cap. 3. Vide Fatuitas.

Mortifera facies est, de qua in Prognostico dixit, Naris acuta, oculi concavi, collapsa tempora. 3. acut. 54. Vide Facies Hippocratica.

Morbi mos, modus, cujus ratione morbus est benignus, vel malignus, tum ex propria sua specie, tum supervenientia propter symptomata. 1. de cris. cap. 3.

Moròs, μωρός, linamentum, seu linteum carptum, quod vulneribus, ulceribus, apertionibus corporis, seu siccum, seu medicamentis (quæ ob id ἐμαρτὰ vocantur) oblitum, inditur; vel ad sistendum sanguinem, vel ad detergendum, siccandum, exedendum. Præterea moròs, linamenta vocant, & medicamenta, quibus foris impostis, vel eschara ulceribus inducitur, vel meatus obstruuntur, vel carnosæ partes, quæ circa ulcus sunt, exeduntur & consumuntur. 5. meth. 3. Vide Emmora.

Morus naturalis, vel secundum naturam est, qui volun-

voluntatis imperium sequitur: sicuti qui involuntariè in corpore fiunt præter naturam sunt. l. ad Thrasib. c. 26. Motus enim sensibiles, in animantium corporibus sanis duplices genere apparent; alii quidem ex arbitrio sanè, ac voluntate, ac impetu fientes, qui nervorum musculationis ministerio fiunt; atque has Medici voluntarias actiones appellare solent; alii motus Arteriarum & Cordis officio obeuntur, quos vitales nuncupant. Est & tertium quoddam motuum genus in venis, quod & naturale dicitur, & sensibus non percipitur. lib. de trem. & palp. cap. 2. Unde motus naturalis, & genus & species motus est. ibid.

Mox apparentia symptomata. Vide Absidentia, vel Absistentia.

Mucor. Vide Coxendix.

Mucosum humorem, appellare consuevit Hippocrates eum, qui lentore quodam, & albedine præditus, ad exangues partes, ossa scilicet & cartilagine, cogi consuevit, cum imbecilla ita Natura est, ut benè conficere alimentum in ipsis nequeat, sed quasi semicoctum quid relinquat: non secus atque in oculis membrana relinquunt & promunt de sese mucorem quendam, cum lippitudine laborant. Fit autem Natura imbecillior, aut ex propria intemperatura, aut ex multitudine humoris, qui ad partes confluit, ut in præternaturalibus tumoribus. 3. de artic. 65.

Mucro, est inferna Cordis pars, quæ tantum protenditur, quantum Cordis magnitudo occupat spatium. 2. de placit. 4. Vide Basis Cordis.

Mucronata cartilago. Vide Cartilago ensiformis.

Mucus, mucor, est excrementum pituitosum, quod

à Cito

à Capite distillat, in gravedine Coryzæ, & aliis catarrhis. 2. de natur. fac. 9. Mucus sive Blena est crassior pituita. 2. de sem. c. 6. Mucum vocat Erasistr. phlegma frigidum & humidum albi coloris. 2. de natur. fac. 9. Hippoc. 4. de artic. 42. Vide Coxendix, Blena, Phlegma.

Muliebris fluxus, est humorum vitiosorum, ex toto corpore delatio & vacuatio per uterum ad multum tempus perdurans. lib. finit. med. Unde muliebria, sæpe notant menstruarum purgationum vacuationem, quæ per circuitum repetitur. 3. prorrh. 50. 5. aph. 28. Vide Menses.

Mulsa. Vide Melicraturum.

Multitudinis (quæ & Plenitudo dicitur) nota sunt, vasorum distentio, gravitas universi corporis, pigritia ad motiones & distentiones membrorum, ulceroza & lassitudinaria sensio, vita prior in otio traducta, non sine ciborum ac potuum largiore ingestione, & solitarum excretionum suppressione. lib. de multitud. cap. 1. & lib. de cur. rat. per sang. c. 4. Est autem multitudo, omnium humorum æquabilis redundantia, vel solius sanguinis, qui interim non sincerus sed cum aliis humoribus debita proportionem permixtus sit: cuiusmodi exuperantia & excessus πλεοναξία vocatur. Ea autem duplex est, una πλεοναξία τῶν αἰμάτων, vel, ut alii vocant, πλεοναξία τῶν ὑγμάτων, i.e. quoad vasa, sive vasorum plenitudo, cum vena tunica, in tumorem impleta supra naturalem cuiusmodi modum se attollunt, indeque tensio accidit. lib. de multitud. c. 10. Altera πλεοναξία τῶν ὑγμάτων, i.e. quoad vires, cum ægri consuetæ tamen si saltè munia obeunt, sentiunt sese graves, pigros, segnes, atque ægrè mobiles. lib. de cur. rat. per sang. mis. cap. 4. Illa propriè Plethora dicitur, qualis athletarum est.

Musculi carnosissimi, sunt musculi recti, quibus nulla caro sub-

sub-

subest, unde ambientibus musculis candidiores sunt. *vide anat. adm. cap. 7.*

Musculi cremasteres, i.e. suspensores, sunt duo graciles musculi, in utrumq. testem pervenientes, quorum alter à pubis, alter ab ilium osse, per membranosum ligamentum tenue exoritur, atq; illinc per meatum, qui ad testem devenit, perferuntur, & testem sursum attollunt. *lib. de musc. diss. cap. 27.*

Musculi masticatorii. *vide Mandibularii.*

Musculi Rhachyæ, i.e. spinales. *lib. de musc. diss. cap. 24.*

Musculi temporales. *vide Crotaphitæ, & Mandibularii.*

Musculus curiculofus, vel carnosus cutis, quæ extremis cutis sedis partibus admiscetur. *lib. de muscul. diss. sect. cap. 30.*

Musculus latus, *μυῖς τοῦ πλάτους*. *vide Latus musculus.*

Musculus Iacertus, *μυῖς*, nervosum corpus est, ex permixta illi carne factum, ad partium corporis motum voluntarium. *lib. finit. med.* Estq; proprium instrumentum motus voluntarii in animalibus. *16. de usu part. cap. 2.* Cujus substantia duobus constat, carne & fibris, positâ simplicibus & secundum longitudinem ut plurimum expositis. Cujus tres sunt partes: caput, quod & principium appellant, in quod nervus & ligamentum inferi solent, venter carnosus magis, & musculum præcipue circumscribens, & finis, ex quo Tendo & Aponeurosis oritur, atq; in partes movendas inseritur. *1. de motu musc. & 12. de usu part.*

Musculus maximus, qui Ploa dicitur, est, qui ab

imis

imis regionibus exortum habens, ad humeri dearticulationem ascendit. *lib. de musc. diss. cap. 1. vide Ploa.*

Mydefis, commune nomen est partium, quæ ex putrefactione corrumpuntur. *lib. Introd. cap. 15.*

Mydriasis dicitur, cum pupilla naturali suo colore conservatur, dilatatur magis quam natura poscit, ut Iridis circulo fiat proxima, & visioni noceat, & proinde est pupilla nimia dilatio. *3. meth. 2. & lib. Introd. cap. 15.*

Myelos, quasi medulla, *μυελος*, familiare ossis nutrimentum est, *2. de usu part. c. 16.* Substantia simplex est, humida, pinguis, alba, sensus expers, in cavis ossium contenta, exanguis quidem, sed ex sanguine, in ipsas cavitates per venas illabente, ortum habens, quæ in Cerebro consistens, dicitur *μυελος ἐγκεφαλις*, i.e. medulla spinalis, vel *σπονδυλική*, vel *σπονδυλική*, vel *σπονδυλική*, ad alterius differentiationem.

Myla. *vide Patella.*

Mylphæ, appellantur destlavia palpebrarum. *4. de comp. med. loc. 5.* Sunt quoq; pharmaca arida, quæ scabris palpebris conveniunt, & ad palpebrarum destlavia conducunt, & obtuse cernentibus, sive per aratem, sive ob crassitudinem frigiditatemq; humorum in oculis, aut deniq; propter status redundantes, id accidat. *Ibid.*

Myocephalon, i.e. muscæ caput, est exigua uveæ tunica porrectio, in nigro oculi, muscæ capiti similis, per ulcerationem facta, *lib. finit. med.* Species est *τὸς ὑποπτερός*, i.e. proidentia oculi.

Myodes platysma. *vide Latus musculus.*

Myopia, est affectio p.n. ab ortu contracta, quæ propinqua saltem cernimus, remota autem vel parum, vel omnino nihil. *lib. finit. med.* *μυωπία*, affectio, *μυωπία*, qui afficitur differt

differt à Nyctalope, qui non naturâ, sed morbo talis evadit. Vide Lusciolus.

Myracopa medicamenta (Græcis μυράκωπα) sunt, quæ lasitudines tollunt, cum quadam odoris suavitate. 6. de comp. med. per gen. cap. ii.

Myrmecia, μυρμηκία ἢ ἀνιόχες ἑσθλα, utrumq; malum, cutis est excrescentia callosa, & magnâ ex parte rotunda. Sed Myrmecia latiore basi & sessilis est, ac in scalpendo & attritu mordentis formica sensum efficit, ideoq; Latini Formica dicitur. Acrochordon autem basin angustior rem obtinet, ut chorda nexu suspensa esse videatur. Latini Verrucam vocant cum adjectione pensilem, 2. meth. 2. quas Clavos, Callos, & Pylus vocant, quas tollunt a ceto acri maceratâ cortice arboris Itæ combustâ. 6. simplic. Vide Formica.

Myfis, i. e. meatuum conniventia. Vide Stegnosia.

Myurus pulsus, sive Soricis cauda, (qui Soricis murisve caudam imitatur, quæ in acutum terminatur) est, cum e. g. secundus ictus primo est paulo minor, tertius secundo, quartus tertio, i. de diff. puls. c. ii. & proin à figuris, quæ in acutum terminant, nomen hoc Medici mutuunt. Ibid. Myuros pulsus vocant, qui ex magnis fiunt minores, ex frequentibus rariores, ex celeribus tardiores. lib. finit. med. Μυρυσὼν σφύρμους Græcè.

Myxa, μύξα, Latini Mucus, & Narium pituitas, pituitosum est de naribus stillans excrementum.

N.

NARCOTICA, sive Hypnotica, stupefacientia, somnifera, Græcè ναρκωτικά φαρμακία (Colica etiam, 5. de comp. med. loc. cap. 9. & lib. 7. cap. 5.) nuncupantur, h. e. somnum conciliantia medicamenta.

tempe

temperiem sortita sunt, summè adversam iis, quæ sunt anodyna; refrigerant siquidem omnia corpus, & sensum ed usque obstupefaciunt, ut, si paulo liberalius ebibantur, mortem asserant. 5. simpl. 19. Vide Anodyna, Colica, Hypnotica.

Nares, νωτῆρες, propriè dicuntur concava nasi partes utrinq; posita, quæ meatum præbent spiritui & odoribus, licet quandoq; totus nasus νωτῆς à Medicis appelletur odoratus instrumentum: quippè si oclusis naribus, spiritum ore adducimus, odorem nullum sentimus; sin autem spiritum apertis naribus attrahimus, odor sensum protinus movet: lib. de instr. odor. cap. i. Nasus verò in se septum quoddam cartilagineum per media loca diductum habet, duob; foramina satis conspicua, quæ propriissimè Nares dicuntur. Ibid. cap. 2.

Narium alæ. Vide Alæ narium.

Nasus. Vide Nares.

Nates, quas νωγῆς, & γλῶττες Græci vocant, sunt inferiores corporis partes postica, ad animalis facta quietem & sessionem, quam ob rem natibus carnosæ corpora substrata sunt, quarum gibba partes, quod orbiculares sunt, sphæromata, ceu modo orbium facta, Græcis appellantur. lib. Introd. cap. 10.

Nates Cerebri. Vide Glutia.

Nativus calor, (quem & calidum innatū vocant, cuius vi omnia animantia vivunt & vigent) apud Galenum est aut anima, aut primum & præcipuum animæ instrumentum, quo omnia, quæ sunt ad vitam necessaria, administrantur. Infiti caloris præsentia, vita est; ut absentia, mors; inequaliter in singulis corporis partibus dispersus; in Corde flagrantissimus, in Ventriculo & Præcordiis

Q

moderator, in Capite & Cerebro adhuc minor, in ossibus perexiguus; prout natura unicuique particulam expedire & convenire adjudicavit. Hic fixus & inlitus dicitur, h.e. à natura, in prima conformatione singulis partibus certam mensuram, & debitam proportionem inditus. Cui calor fluens & adventitius opponitur, quem natura in Corde, tanquam in quodam penu, collocavit, unde per arterias cum spiritu & sanguine, vehiculis & pabulis velut suis, continenter depromitur, ferturque in singulas partes, ut earum calorem nativum, fixum, insitumque, foreat, atque instauraret. Idem ille calor influens, in merore, metu, verecundia initio, frigore, accessionum principis & somno, intro cum sanguine & spiritu ad Cor recurrit; & ob id talibus in affectibus & curis, & subdita illi partes frigent & pallescent; contra in gaudio, & verecundia, jam vigente accessionum statu, ac vigilia, ac calor ad cutim copiosior effunditur, cum spiritu, & sanguine, & pronus calor, rubor, tumor & nitox hic partibus inducitur.

Naturæ nomine, temperamentum intellexisse Hippocratem: idemque esse precipuum, & maxime proprium Naturæ significatum, ab ipsa Naturæ substantia desumptum, cum sapissime, cum libro toto de Natura humana, Galenus testatur, 3. aph. 2. ubi Naturarum has dicit ad astatem, has ad hyemem, male bene se habere.

Naturalis motus. Vide Motus naturalis.

Naturales facultates, quæ à duobus, à Galeno in arte parva, distinguuntur in primas seu principes, & in secundarias sive ministras; primæ statuuntur tres, generatrix, auctrix, nutritrix. His omnibus singulis, aliæ quatuor inserviunt, attractrix, retentrix, concoctrix, expultrix, quæ non in jecinore modo, sed in omnibus vel minimis

minimis corporis partibus, à primo statim ortu, insunt.

Naviforme os. Vide Scafoides.

Nausea. Vide Vomitus.

Nauseationes in venis, *ναυσίωσες* appellat Hippocrates, quas prius vocaverat exuccationes, h.e. sugillationes, cum venæ (more eorum, qui nauseam patiuntur, & evomunt,) sanguinem exspuunt quasi & evomunt, tum ex propria imbecillitate virtutis retentricæ, quam ex inflammatione multoties contraxerunt, tum ex ipsius sanguinis copia, & pravitate. 2. de fract. 24.

Nebulæ, Græcè *νεφέλαι*, sunt utriusque oculi membranae tenues, & superficiaria albedines quasi & caligines; nam si crassiores sint & profundum petant, *κατάμυξα* & albugines dicuntur. lib. de remed. par. fac. cap. 12.

Nephritis, affectus renum, sive is similis sit, ut Intemperies; sive instrumentalis, ut Calculus; sive communis, ut Ulcus inflammatum; propriè tamen Lithiasis, i.e. calculi morbus, Nephritis appellatur. lib. de ren. aff. dign. c. 2. Omnes verò homines, qui subinde difficulter mejunt, aut etiam suppressam omnino urinam habent, ubi circa lumbos dolent, ac arenosa mejunt, nephriticos dicunt, quo calculo emicto, eorum protinus dolor, & urina suppressio desinit. 1. de placit. cap. 13. Unde nephriticas sive renales antidotos, & compositiones appellant, quas renibus affectis accommodant. 10. de comp. med. loc. cap. 1.

Nervum, quidam appellant omnia similarium corporum genera, in animalibus, quæ & ex sanguine sunt, & sensu carent, ut quæ ex ossibus oborta, ab Hippocrate Copula & Ligamenta vocantur. Insuper, quæ ex Cerebro & dorsali medulla prodeuntia, ab eodem propriè Nervi

& Tomi dicuntur. Deniq; ex musclicis qui proveniunt. Tendones quoq; sic vocitant. Quidam igitur, omnia hac Nervos appellantes, primum ipsorum genus colligatorum esse ajunt; se undum autem sensibile, atq; electorium; tertium aponeurolin, h.e. nervorum propaginem, cognominant. com. i. in 6. de morb. vulg. Nōgor autem dictum, & nō rē vōbeu, quod nutare & flectere significat, ut docet Galenus initio libri de motu muscul. Vide Tonos.

Nervum colligantem, Medici vocant νῶρον συνδετήριον, Hippocrates vocat ligamentum, seu συνδεσμός, Copulam, ex osibus ortum ducit. Vide Nervum.

Nervi duri & molles, ejusdem quidem substantia, at non uniusmodi sunt usus: molles enim ad sensum, duri ad motum sunt destinati; non quidem, quod duri non sentiant, sed a duris hebetior & obrusior sit sensus, quam a mollibus. Mollium principium est Cerebrum; Duro- rum, spinalis medulla; ab hoc principio singuli, in suas sedes, a Natura mittuntur, molles quidem in organa sensuum; duri in musculos; dicunturq; molles, vel duri, sibi invicem simul, & ad Cerebrum collati.

Nervi optici seu visivi. Vide Nervi sensifici.

Nervos sensificos in genere vocant, qui ad sensuum instrumenta mittuntur. 7. de plac. 5. Proprie autem sensificos vocant Nervos, sive Poros, nervos a Cerebro ad oculos descendentes, qui soli sunt conspicui & sensibiles via spiritus, 10. de usu part. 12. & proin eosdem Opticos vocant, 16. de usu part. 3. ab actione nomine deducto. lib. de nervor. diff. cap. 2.

Nervi vocales, sunt nervi gutturi, qui ad instrumenta vocem concinnantia proprie pertinent; sic dicti, quod

quod iis vel incisis, vel laqueo interceptis, vox perit: non deferunt a nervis apud arterias existentibus, quos recurrentes nominant; ipsorum enim essentia pars sunt, & utriq; vocem efformant. 1. de loc. aff. 6.

Nervi voluntarii dicuntur, qui ex Cerebro, dorsiq; medullā ortum ducunt: sicuti nervi, qui ex musclicis, tendones; & qui ex osibus proveniunt, ligamenta appellantur. lib. de osib. in proem.

Nervus cavernosus. Vide Nervosum.

Nervi recurrentes, νῶρον παλινδεσμούσας, sunt rami duo, nervorum sexta conjugationis, a Cerebro prodeuntiu, quorum dexter, circum arteriam, qua axillam adit; sinister vero, circum magnum arteria descendens truncum obvolutus, sursum revertitur. & recurrit quasi in laryngem, ad vocem efformandam: quare Galenus 4. de loc. aff. φωνητικὸς maluit appellare, i.e. vocales. ita enim sunt necessarii ad vocem, ut secti, vel intersepti, vocem prorsus aboleant; refrigerari vero, tantisper vocem impedian, donec calefacti, naturalem temperiem recuperaverint. 1. de loc. aff. 6.

Nervorum conjugatio dicitur, quoniam nervus non unus simplex, aut ἀπλὺς, a suo principio profisciscitur, sed omnes conjugati feruntur, ideoq; ab Anatomicis Nervorum paria appellantur, ac septem quidem paria a Cerebro, triginta vero a spinali medulla profisciscuntur.

Nervosum, νῶρονόδες, corpus est spermaticum, & exangue, ad nervi naturam & similitudinem efformatum: licet enim Gal. tria nervorum genera dicat, initio lib. 15. de usu part. & comm. 1. in 6. τῶν ἐκδομικῶν, præter illa tamen tria genera, sedes, uterus, vesica, & pudendum virile, nervosa dicuntur, cum tamen nullo prædictorum

generum contineantur, aut componantur; sed quod nervosorum corporum similitudinem gerant; contrahi enim in angustum, & extendi in latum possunt: id quod corpori carnosum & pingui non convenit. Unde quidam Penem colem, nervum cavernosum appellant, ab eoq; penem & ipsum, totum cavernosum vocant, quod arrigere, flaccescere, item contrahi, extendiq; possit. com. i. in 6. de morb. vulg. 2.

Nervosæ discriminationes, sunt fines membranarum, quæ orificiis cordis adjacent. 1. de placit. 10.

Nestes intestinum. Vide Entera, & Jejunum.

Neurotonus, dicitur is, qui in nervis vel tendonibus, sine discrimine, vulneratus est. 3. de comp. med. per gen. 2.

Neutrum corpus est, vel quod neutrius extrema dispositionis est particeps, vel quod utriusque, vel quod nunc huius, nunc illius particeps, nunc salubre est, nunc insalubre. lib. de sect. cap. 6.

Nigra bilis, est humor melancholicus, qui, dum animal naturaliter se habet, quotidie gignitur, & proinde omnino alia est ab ea, quæ ex ustione ac velut assatione conflatur. 14. meth. 9.

Nigra vena. Vide Media, Communis.

Nigritia, & Nigror. Vide Contusio, & Effusa.

Nodi, quos Condylus Græci vocant, sunt extrema pars postbrachialis, à quibus digiti incipiunt. 1. Interd. c. 10.

Nomas, appellare Medicis mos est, putrescentia ulcerum, & proinde τὸ νέμω, i. e. à pascendo, quod putredo depascatur membra, & ad vicinas partes serpat, adeoq; una cum parte primum vitiatâ, & ipsas finitimas sedes corrumpat. 9. simplic. Vide Phagedænas.

Nothæ costæ. Vide Illegitimæ.

Nothon.

Nothon. Vide Tergum.

Notyæos myelos. Vide Myelos.

Nubis nomen, solent Medici, ab aëre, ad urinas transferre, pro aliquâ eorum, quæ in urinarum superficie pendunt, specie, aut evaporatione. Ut ergo in aëre interim tempestas sit, ubi nubibus cōdensatus, ater & nubilosus dicitur, videnturq; nubes quædam per eum disjectæ, quo quidem tempore, nubium cernimus colorem, non exquisitè atrum, nec lucidum, sed inter hos medium; haud aliter nubes in urina, alias sublimamentum, ἐμπυρετόν, Latinis Nebula, Nubecula, nebulosæ suspensio, alba, nigra, media oritur ex evaporationibus, ad urinæ summam partem delatis. Cæterum, id omne crudum esse, & à flatuoso spiritu in altum efferrî, Galenus docuit; quod verò perfecte concoctum, secretum, æquale & simile est, id certè, quoniam nihil flatûs habet, in fundum vasis urinarii descendit, ac vocatur hypostalis.

Nucha, vulgò appellatur spinalis medulla initium, Græcè νωτιαῖον ὑμενόν. Vide Medulla spinalis.

Nutritum est, quicquid substantiam nostri corporis conservare & augere, & in eandem converti aptum est. 1. simplic. cap. 1.

Nutritio, est continuè effluentis substantiæ redintegratio; unumquodq; verò, eâ ipsâ substantiâ, quâ primum genitum est, aliè etiam consuevit. 1. de semin. cap. 10. Vide Prothetis. Vocatur autem omnis illa alteratio, quæ alimenti in substantiam partis, quæ nutritur, transmutationem præcedit, concoctio; ubi verò jam parti apponitur, nutritio. 8. de comp. med. loc. cap. 6.

Nyctalops, νυκταλῶψ, lusciosus, is est, qui die videri obtrusus, Sole occiduo acrius, nocte magis adhuc; vel con-

tra, die parum, vesperi aut nocte prorsus nihil, unde nostra aeterna oculorum cœcitas appellatur. 2. meth. 4. l. de comp. med. loc. 8. & lib. Introd. Vide Lusciosus.

Nympha. Vide Colliculum.

O

OBAUDITUS, sive Obauditio, est vitiosa actio auditricis facultatis, proportionem respondentem vitioso visui, veluti cum oculis, colore, figurâ, magnitudine, vel situ mutata videntur; differt à Barycoia, quæ est audiendi difficultas, gravis auditus, seu diminuta audiendi actio: ut, surditas est ablata audiendi actio. Auferatur autem, minuitur, vel depravatur auditus, aut læsâ aliquâ aurium particulâ, aut nervo, qui in has à Cerebro pertingit, aut Cerebri eâ parte, quâ is nervus exoritur. 1. de sympt. caus. cap. 3. 4. 5. Vide Barycoia.

Obliquatus pulsus est, qui oritur arteriâ non constitutâ in rectum: seu qui editur, cum arteria situs obliquus est. lib. finit. med.

Oblongum & depressum dicunt ossis caput, ad cervicem & sinum, cui inferitur, id ipsum referentes. lib. de ossib. in procem.

Obelæa sutura, est cranii commissura recta, quæ à mediâ syncipitis suturâ, ad mediâ suturam occipitis, secundum longitudinem extenditur. Græcis dicitur ὀβελία, ἢ παβελιαδὴς, παφί. Utrumque nomen inditum est, quod veru aut sagittæ, aut virgæ instar, rectâ incedit, Latini præindè rectam & sagittalem vocant. 9. de usu part. 17. & lib. de ossib. in procem.

Observatio, ὁρῶντις, Empyricorum vox est, qui, quicquid observassent fieri in morbis, id ἀπορίων, & quasi axioma nuncupabāt; ex quibus proximè artē constituiebāt.

Obstis

Obstipitas, est distortio spinæ, ad lateralem corporis partem, 3. de artic. 2. quam Scoliosis Græci vocant. Vide Cyphosis, νῦψις, Gibbus.

Obstruatio. Vide Compressio.

Obstruentia corpora (Græcis στενωσιμὰ, generaliori nomine contrahentia, occludentia, & constringentia dicuntur) sunt, quæ ora vasorum occludunt, & sensibiles excretiones cohibent. Corpus enim stegnoticum, quod claudit, & continet in se, nec quicquam, quod sensu queat percipi, de sese emitte, Græcis στεγνόν nuncupatur. Differunt à condensantibus, quod hæc poros & meatus corporis contrahant; Obstruentia autem & oppilantia, vasorum corpora claudant. 5. simpl. 14. Illa στενωσιμὰ; hæc στεγνόν Græci vocant.

Obstupescencia est, cum ager humi jacens, nec dicit, nec agit quidquam, sed apertis oculis, quietus manet, similis iis, qui ex timore sunt attroniti. 7. aph. 14.

Occiput, ἰνὸν, ea est capitis pars, quæ à vertice, tanquam à centro circuli, unde capillorum proventus incipit, ad posteriorem Capitis partem, usque ad Tendones, & Nucham descendit. lib. Introd. cap. 10.

Ochima τροφὴς, i. e. vehiculū nutrimenti, Hippo vocat serosum recrementū, est aquosa & tenuis sanguinis humiditas, ad crassâ substantiâ chymi, per artas venas, in totū corpus ferendâ, à Naturâ comparata. 4. de usu part. 5.

Ochthode ulcera, i. e. verrucosa, quæ non maligna & contumacia sunt, sed solum labra callosa & dura habent. 4. de compos. med. per gen. cap. 5. Vide Dulcia ulcera.

Ocrea. Vide Tibia.

Odaxismus, ὀδᾶξις, est ille pruritus, qui conceptis jam intra gingivas dentibus, & erumpere festinantibus,

sentitur; quo solent infantes relatis ad os digitis, identidem eos mordere, & ipsi gingivas suas conficcare. l. de nat. puer.

Odontalgia, i.e. dentium dolor. 2. meth. 2.

Odontoides. Vide Dentem.

Odontophylia, puerorum est dentitio, ubi scilicet è gingivis prorumpunt dentes.

Odoratum, Græcis ὀσφρηνός, nominant non solum odoris sensum, sed etiam vim ipsam, cujus odorandi officium est. lib. de instrum. odor. cap. 1.

Oedema, οἰδημα, Hippocrati sunt, vel omnes præter naturam tumores, sive dolore caveant, durig, sint, quos scirrhus Græci appellat; sive dolore inferant, quos phlegmonas, i.e. inflammationes propriè vocat; sive absq; dolore laxi, atque molles sint, quos solos in specie οἰδημα Græci nominant. comm. 1. in 6. de morb. vulg. 2. Et proin Oedema est tumor præter naturam, qui dolore caret, & digitis cedit: etsi aliquando apud Hippocratem, Oedema significet durum & dolentem tumorem. 1. progn. 29.

Oenodes vinum, i.e. vinum vinosum, quod multam sustinet aqua mistionem, & imbecilles vires ferit; alias Polyphorum, & multiferum appellatur, quod ut bene temperetur, multam exigit aquam. Contrario autem modo Oligophoron, sive pauciferum, quod ut bibatur, minimè eget aqua mistione. 3. acut. 20. & 7. meth. 6. Vide Hydatodes.

Oesophagum, Veteres nominabant eam partem, quæ inter fauces, & os ventriculi superius, intermedia est; Aristoteles, & qui post ejus seculum scripserunt, Stomachum, nos Gulam appellamus: via est eorum, quæ cum devorantur, cum vomitione deiciuntur. 5. de loc. aff. cap. 5. Gula, Arabibus Meri dicitur.

Oesy-

Oesyperus, i.e. lana succida, sive non lota. 14. meth. 7. Vide Lana succida.

Olecranos, quartus est musculus, qui per profunda adit cubitum, in medio gibberi interioris, inferiorisq; brachii. 3. de anat. adm. cap. 4. Ab hoc & Cubitus, & Cubiti os, Olecranos appellantur. Vide Ancon.

Oligophoron. Vide Oenodes.

Oligotrophia, i.e. parciore nutritio. 3. de sanit. tuend. cap. 8.

Omentum, ἐντὶνδρον ἢ ἐντὶνδρ, est corpus membranosum ex duplici peritoneo, seu plexu & adiposa substantia compositum, medium inter vasa, quæ in ipso continentur, quibusdā autē multò infra quàm umbilicus consistit, quibusdā ad pubis ossa descendit, cum in prorum, seu ad Umbilicum, parva magnorum vasorum soboles, ex alto deferuntur, 6. de anat. adm. cap. 5. ex duabus tunicis densis, & subtilibus sibi incumbētibus, quàm plurimis arteriis & venis, & pinguedine non paucā conflatum, gratiā calefaciendi & ventriculum roborandi factum, 4. de usu part. 9. quod Epiploon, sive ἐντὶνδρ, Arabibus Zirbus, Antiquis Rete, quod ita adipe instructum Omentum, reti non sit absimile, indeq; & πᾶν τὸν σπλῆν, pleriq; dicitur. lib. de nerv. & art. diss. cap. 1.

Omiæa vena, i.e. humeralis, ramus est vena cavæ claviculas supergressæ, per omoplatam in brachium descendens; hanc Galenus interdum externam vocat, ad differentiam axillaris, quam internam nominat. Vide Humeraria.

Omorribes, sive Omphacinum oleum, i.e. crudum oleum, ex olivis immaturis expressum. 8. meth. 3.

Omoplata, (quæ & homoplata dicuntur, & Scoptulæ,

prulæ, s. meth.) i.e. scapula, quæ humeri articulum constituunt; est enim in extremo scapularum insculpta capacitas, tantâ magnitudine, quanta ipsius brachii Capiti dearticulando, cui inferitur, esset aptissima. 13. de usu part. 10.

Omos, humerus, propriè dicitur id totum, quod in articulatione brachii, cum Omoplata apparet, adeoq; verà ipse articulus brachii cum Omoplata, sic vocatur.

Oncos, ὄγκος, apud Hippocratem idem est ac tumor, significat omne id, quod est supra naturalem constitutionem, incrementum. lib. de tumorib. cap. 1. Onchos verò & Poros, etiam quidam nostri corporis meatus vocant. 1. simplic. cap. 1.

Onyx, Græcis ὄνυξ, idem quod πύρις, est puris collectio in nigro oculi, cum phlegmone, juxta Iridem. lib. finit. med.

Ophialis, est affectus capitis, quo capilli primum excrevantur, deinde decidunt, in certis spaciis & capiti sedibus, in serpentis similitudinem. Idem cum Alopecia malum est, solaq; figurâ ab eo differt. Vide Calvities, & Madarosis.

Ophthalmia, lippitudo, frequentissima oculorum affectio, est inflammatio tunica seu pellicula, os capitis, & Calvariam ambientis, quam Membranam agnatam, adnatam, conjunctivam vocant, propterea, quod aliis, quæ oculum ipsum constituunt, tunicis, forinsecus adnata sit; ligamentum in super totius oculi, ad circumfusa ossa, & ob id omnia, quæ circum-circa oculos sita sunt, usq; ad malas, quandoq; in vehementi lippitudine attollens & colligans. 4. de compos. med. loc. cap. 2.

Opium, est papaveris lacryma & succus. 2. de antid. cap. 7. Unde opiata, medicamenta somnifera sunt, quibus opium admiscetur. Arabes vocant Allabiar.

Opi

Opisthotonos. Vide Distentio.

Opopanacem, vocant Panacis guttam & liquorem. 3. de comp. med. per gen. cap. 5.

Oppilatio. Vide Compressio, & Obstruentia.

Optici nervi, sunt primum nervorum par, quod cum utroq; Cerebri panniculo, ad oculos descendit, iidemq; visibilem spiritum adducit. lib. de ocul. par. 2. cap. 3. Vide Nervos sensibiles.

Ordinatus pulsus est, quando ictus, pari semper numero, paribus partibus, statim procedunt circuib. lib. de puls. ad Tyron. cap. 6.

Orexis ὀρεξις, appetitus, sive appetentia, est concupiscentia cibi & potus. Hipp. λικνός, h. e. famem appellat, cum ait: Famem meri potionem solvi.

Oricularia. Vide Laminas.

Oroboides urina, quæ habet hypostasin similem orobis, eaq; fit à colliquatione & dissolutione carnis. lib. de urinis, cap. 26.

Oros, dicitur à quibusdam τὸ πῆλον, h. e. pars tota pedis superior, quam alii ποδόςσεν appellat, i. e. multorum ossium. Oiros verò tūm serum lactis significat, tūm Perinæon, tūm etiam sacri ossis extremum, ad caudam usq; protentum. Vide Gal. 1. 3. de usu part. c. 7.

Orthoclon, ὀρθόκλον, quasi rectus articulus, est articuli vitium, quando ob durum aliquem tumorem, musculi partem aliquam insectentes, non sequuntur, sed perperam articulus tenditur, neq; insecti potest. 3. de art.

Orthopnce, ὀρθόπνοια, quasi recta spiratio dixeris, est magna spirandi difficultas, quæ non aliter fieri potest, quam erecta cervice, & thorace elato. quod is quoq; accidit, qui velociter cucurrerunt: qui sic affecti, dicuntur ὀρθο-

ἄσθμα. Idem malum ab alio symptomate, Asthma nuncupatur, à viscosis, & crasis humoribus, circa asperas in pulmone arterias, sine febre congregatis. 1. de difficult. respir. c. 11. & com. 4. in 6. de morb. vulg. 4. Vide Anhelosi.

Os, & quæ, duobus modis dicitur: primum, quantum diducta labra patent; secundo & propriè, totum id spacium, quod dictis labris, ad imas usq; fauces interjacet, in quo dentes, palatum, lingua, gurgulio, & tonsillæ duæ continentur, quarum omnium partium, una tunica est, etiam naribus communis, à peritoneo prognata. 3. de usu part. cap. 5.

Ossa, & quæ, partes humani corporis durissimæ, siccissimæ, maximèq; terrestres & frigida sunt, quæ sese mutuo, & alias partes omnes, tanquam fundamenta sustinent, & firman, atq; ad universam corporis substantiam sustentandam & gestandam faciunt, quibus proin omnia adnascuntur, & stabiliuntur. lib. de ossib. in præm.

Ossa alata. Vide Pterigodes.

Os Ballistæ. Vide Astragalus.

Ossa cavernosa. Vide Ossa Ichmoidea.

Os cartilagineum (aut, sicut aliis placet, cartilago ossea) est, quod ad caput Cordis invenitur, ad quod omnium ipsius ligamentorum principia adaptantur. 7. de anat. adm.

Ossa colatoria, sive Colo similia. Vide Ossa Ichmoidea.

Os cubiforme. Vide Os Cyboides.

Os Cyboides, i.e. cubiforme, est, quod ab externis Tarsipartibus locarum, firmum in terra statuitur, & dearticulatur cavitati calcanei, ad finem adjacenti. 1. 3. de usu part. cap. 7 & 8.

Ossa

Ossa foraminulenta. Vide Ossa Ichmoidea.

Os frontis, quod vulgus Coronale vocat. Vide Coronale os.

Os humeri, quod Arabes Os adjutorii vocant. Vide Adjutorii os.

Ossa Ichmoidea, sunt ossa foraminulenta, & cavernosa, ad radicem & principium narium in meatu olfactorio posita, quæ Natura variè pertusa velut spongiam & cribram formavit, ne aliud corpus durum extrinsecus in illa incidat, insuper, ne viribus integris aer frigidus inspiratus, rectè in Cerebri ventriculos sese insinuet; quin &, ut vapor odorem secum ferens, per ea foramina à Cerebro recipiatur, simul &, ut Cerebrum vacuare posset se ab excrementis; hæc quoniam ad Cribri & Spongiæ similitudinem perforata sunt, Ichmoidea, & Spongioidea proin dicuntur. 8. de usu part. cap. 6. & 7. de loc. aff. 10. Colatoria ad hæc vel colo similia vocant, quod per illa crassum Cerebri excrementum purgetur & percoletur; sicuti viciissim tenuiora excrementa, vaporis similia, in sublime lata per calvaria suturas excernuntur; crassiora autem prona feruntur, quorum altera pars in eas vias, quæ ad os pertinent, influit, & per sreatum ejicitur; altera, quæ mucus dicitur, in nares, & per esslatum vehementem excernitur. lib. de instr. odor. cap. 2.

Os jugale. Vide Zygoma.

Os latum. Vide Spina.

Os magnum. Vide Spina.

Os naviforme. Vide Os scaphoides.

Os palati. Vide Sphenoides.

Os petrosum, ἰσοκέλης ὄστρον, sic dicitur pars ossis temporalis, protensis sutura lambdoidea sinibus terminata: sic

sic dicta, quoddam petrae, vel rupi, duritie & soliditate sua, videatur similis.

Os sacrum, ὀστέον ἱερόν, duobus modis sumitur: primum latius, ut Coccygem etiam comprehendat, ut 12. de usu part. scribit, Os sacrum constare ossibus quatuor, tribus scilicet propriis, & Coccyge; hæc enim ossa sibi unita per symphysin, efficiunt unum os, quod parte superna vocatur sacrum, inferna Coccyx. Deinde, sumitur pro ea tantum parte, quæ revera sacra, i.e. magna & lata est, quæ parte hoc os, cum osse ilio per synarthrosin jungitur, tunc ejus reliquum gracilescens semper ac tenuatum, in tres cartilagineas acutissimas, quas Coccygem vocant, destinit. lib. de ossib. cap. 12. & 3. de artic. 104.

Os scaphoides. Vide Scaphoides os.

Ossa spongiosa. Vide Ossa Ithmoidea.

Oscitatio, & Pandiculatio, sunt mediocres motus virtutis expultricis Cerebri, 2. de sympt. caus. cap. 6. per quos contenta in musculis humida, flatulenta, spiritusque flatuosi, expurgantur. 7. aph. 56. Per Oscitationem tale quid solis maxilla inferioris musculus accidit, quale in Pandiculatione in omnibus musculis symptoma est; utraq; enim evacuandorum in musculis halitusosorum excrementorum causa sit. comm. 1. in 6. de morb. vulg. 4. & 7. aph. 56. Xαῖνος illa; hæc οὐροδιδύμια Græcè.

Osculorum apertio, Anastomosis, & ἰσχυρὰ ὁμιλία, sit tunc in arteriis & venis per resudantiam, tunc in ulceribus & vulneribus, quæ sinuosa sunt, fistulosa, & angustiorificii, cum scilicet hæc debescunt. 6. de comp. med. loc. 6. 2.

Ostocopi, i.e. ossium dolores, nominantur excitati, ob affectas membranas, quæ ossibus adjacent, dolores & profundi, (i.e. in intimo corpore sentiri soliti,) & ossium ipsorum

ipsorum veluti dolentium inducentes imaginem, magnam ex parte ab exercitationibus evenire solent, interdum etiam à frigore, & plenitudine, quin & ab humorum cacoethia in lue Venerea. 2. de loc. aff. 8.

Ostracoderma, animal omne est, cui pro cute, testa est. lib. 1. de aliment. fac. 1.

Ostraga, instrumenti genus est, quo in ossium fracturis, collisionibus, & comminutionibus utimur. 6. meth. 6.

Otalgia, aurium dolor est, is cumprimis, qui ad profundum auditorii meatum pertinet. 2. meth. 2.

Otrenchytæ, instrumenta sunt Chirurgica, quibus aliquid in aures infunditur. Aurifusoria specilla ab aliis quibus, à Celso strigiles, alias auriculares clysteres appellantur.

Oxelæum, i.e. compositio ex aceto, & oleo. 1. de compos. med. per gen. cap. 7.

Oxycratum, i.e. compositio ex aqua, & aceto. 1. simpl. 29.

Oxydercica facultas est, quæ oculos, (ubi nullum insit illis sensibile pathema) male munere suo fungentes, corrigit & in integrum restituit, ac nimirum & in auribus & naribus, aliisque sensoriis cunctis id ipsum præstat, & proin in auribus x. g. oxycoos dicitur. 5. simplic. 23.

Oxygalax, i.e. acidum lac. 3. de aliment. 16.

Oxymel, non ex aceti mellis, mixture tantum compositio est, verum ex mulla paululum aceti accipiente. 3. acut. 24. & 4. de sanit. tuend. cap. 6.

Oxyregmia, i.e. acidus ructus, qui sine aliqua pituita, quandoque, in ventriculo frigidior, & in quibusdam levitatibus intestinorum, ex frigidityte ortum habentibus sunt. 6. aph. 1.

Oxyrhodinum, quod & Rhodinum dicunt, est frontis linimentum, ex aceto, oleo, & rosacea placent à capiti phreniticorum, aut quacumq; intemperie calida laborantium, permixtum. 13. meth. 21.

Oxys, i.e. acutus, à quo ὀξύς πυρετός, ὀξεία νόσος, & ὀξύ νόσος dictum. Consistit autem acuti morbi essentia, non in celeri tantum motu, sed cum primis in magnitudine & periculo. 2. aph. 23.

Ozæna, est ulceratio in naribus profunda, tetri odoris halitus emittens. lib. finit. med. & 3. de comp. med. loc. cap. 3. Unde Ozæna ex ulcerum genere est, eoq; à Polypo differt, quippe qui in tumorum tantum genere est, non ulcerum nascitur ex influxu humorum acrim, à Cerebro in nares facto, unde vel earum ala, vel interstitium, vel alia ipsarum partes exulcerantur.

P

PÆDOTROPICA, est Medicina pars, de puerorum sanitate, & regimine. lib. de part. art. med. c. 5.

Palatum, partem illam in ore altioris sedis cavam vocant, qua super foramina è naribus in ipsum pertinentia, sublimis est. com. 1. in 6. de morb. vulg. 3.

Palati os. Vide Basis Cerebri.

Palimuolus homo, dolosus est, qui aliud loquitur, aliud sentit, & qui facile sententiam mutat: ejusmodi quoq; morbus appellatur, qui speciem quidem & spem facit levationis, sed tamen intus malignus est. com. 1. in 6. de morb. vulg. 6.

Pallida bilis. Vide Bilis pallida, & amara.

Palma, est ea pars manus, qua Metacarpium, & Postbrachiale dicitur. 1. de musc. diff. cap. 21.

Palmos, Vide Palpitatio.

Pal-

Palpitatio, alias Subfultio, Græcis παλῦς, similiter atq; tremor, motus est, quo partes palpitantes, citra & præter voluntatem nostram, nobis invitis attolluntur, & deorsum aguntur, à crasso & vaporoso spiritu, quærente exitum. Differt verò palpitatio à tremore, quod nemo, qui artus movere non instituerit, tremat; palpitantes autem particula, etiamsi in quiete fuerint, nullusq; illis motus sit inductus, palpitent: etenim supercilium palpebræ & oculus subinde citra omnem voluntatem attolluntur; tremor autem totius & integri membri motus est, ut totius manus, brachii, capitis; palpitat verò pars membri, ut vel sola cutis, vel sola arteria, ut censebat Praxagoras, vel solus musculus, ut Herophilus. Ad hæc, quæ tremunt, totum mutant locum; quæ autem palpitant partes, eundem obtinent, sed modò ampliorem, modò minorem; in se ipsas enim concidunt partes palpitantes, dum contrahuntur; aliò autem moventur, quæ tremunt. lib. de trem. & palp. cap. 4. & 5. Præterea, Palpitatio est contractio quadam præter naturam, in illis corporis partibus, in quibus ob substantia ipsarum mollitiem, distentio, dilatatio, & contractio accidere potest. 2. de sympt. caus. cap. 2. Non enim os vel cartilago palpitant, quod dilatari non possint. Deniq; Palpitatio motus est toto genere præter naturam, Tremor autem, mixtus, ex motu secundum naturam, membrum movente, & motu præter naturam, virtutem ad violenter movendum proripiente & cogente. 2. de sympt. caus. cap. 2.

Palpebræ, sunt externæ oculi partes, supercilii subjacentes, supernæ, infernæq; interiores oculi tunicas contingentes: hæc inferior, illa superior dicitur. lib. introd. c. 10.

Panccenus. Vide Endemus.

Pancratium. *Vide* Pancreas.

Pancreas, Pancreon, Calicreas, & Calicreon, corpus glandulosum, vel caro glandulosa est, in medio mesenterio sita, quam Natura quatuor vasis, vena, arteria, nervo, & vesica bilis, in orbem substravit, divisionesque illarum mutuas replevit, ne ullum ipsorum facile scindatur, propter vehementem motum, sed molli cedente corpore, conquiescat. 5. de usu part. cap. 2. Hoc corpus vocatur etiam Pancratium. 1. de motu muscul. 6. & lib. de ven. & art. diss. cap. 1.

Pancreon. *Vide* Pancreas.

Pandemus. *Vide* Endemus.

Pandiculatio. *Vide* Oscitatio.

Panus, i.e. tuberculum immaturum, quod aliquando & magnum, & durum, & diuturnum exoritur: 3. de art. 2. est tumor, non altus, sed latus, in quo quoddam pustule simile, panis similitudinem habens, inest: hinc Latini Panum appellant. *Vide* Phygethlon.

Papilla mammae, i.e. extremum mammae mulieris, quod ori infantis inditur. 15. de usu part. cap. 7.

Papula, nomen est, iis, quae sponte extruderant in cute, exanthematibus conveniens, quae superfluis constant humoribus, atque qualitatem illorum etiam non injuriâ subsequuntur: cum tenues humores sunt, exulcerationem potius, quam tumores creant; at crassi, in tumorem cutim attollunt. com. 3. in 3. de morb. vulg. 51.

Paracentesis, i.e. punctio & apertio abdominis circa umbilicum, quae Hydripibus, & Herniosis adhibetur, ad aquam evocandam. 14. meth. 13. & 6. aph. 27.

Paracmastica. *Vide* Continua.

Paracynanche. *Vide* Cynanche.

Para-

Paralysis, (quae & Parefis à recentioribus Medicis dicitur) est nervorum resolutio, cum nervi & partes corporis, omnino sensus & motus expertes sunt. 1. de sympr. caus. cap. 5. Fit, cum humorum multitudo indissolubiter in aliqua corporis parte, non principe, impacta fuerit, ut & Epilepsia, & Apoplexia parvis dici possit. 4. acut. 27. Exquisita autem paralysis est, in qua nervi, & membra sentientia, omnino sensum & motum perdidit; imperfecta, in qua motus quidem perit, servato sensu; imperfectior, in qua incolumi motu, sensus aboletur: est enim paralysis motus potius, quam sensus affectio; quae si fiat in universo corpore, Apoplexia potius dicenda est, quam vera paralysis. Accidit insuper Paralysis oculis; ubi & mollities dicitur, cum oculus vel motu, vel visu, vel utroque privatur, laeso vel Cerebro, vel nervo concavo, vel spiritu visibili. lib. de ocul. par. 4. cap. 13. Est insuper Paralysis imaginatricis facultatis affectio, qualis & Caros, & Catalepsis nominatur. 1. de sympr. differ. cap. 3. *Vide* Resolutio.

Paramelus digirus, i.e. digitus annularis. lib. de muscul. diss. cap. 22.

Paraphrolyne, pravus est erransque motus virtutis imaginatricis Cerebri, qui delirium dicitur. 1. de sympr. differ. cap. 3. Differt vero ab Aneia, & Amentia, quod illa sit imaginatricis aut ratiocinatricis depravatus vel diminutus motus; haec vero earundem facultatum paralysis existat & resolutio.

Paraphimosis, vitium est Phimosi contrarium, cum videlicet ea, quae naturales meatus concludunt, opercula & tegumenta ita diducta sunt, ut reduci nequeant: proprie dicitur de preputio retrorsum adducto, ut glandem tege-

re nequeat; quod malum ex nervi contractione maxime contingit; fit & ex immodica praeputii siccitate. Ei contrarium vitium Phimosi appellatur. lib. finit. med.

Paraplegia, sive *παραπληγία*, est plerarumq; alterutro in latere corporis partium immobilitas, sensusq; privatio, quam etiam Apoplexiam vocat Hipp. com. 2. in 1. prorrh. 50. quod utraq; à frigido & pituitosis fiat humoribus. Paraplegia, affectio unius partis corporis talis est, qualis Paraplexia totius. com. 3. in 1. prorrh. 26. Apoplexia, in partium resolutionem quae finit, Paraplexia appellatur, 4. acut. 27. & com. 2. in 1. de morb. vulg. 59. Apoplexia, à paraplexia, ut à toto, pars, differt; Apoplectici namq; prorsus & paraplectici sunt; Paraplectici vero, non omnino & Apoplectici. Adde, sanos mente, paraplecticos, resolutos parte una corporis, dextrâ, vel sinistrâ, Apoplecticos & mente, & toto corpore resolutos esse constat. lib. finit. med.

Pararhythmus pulsus est, qui (cum quaq; aetas proprium pulsum agnoscat) non convenit illi aetati, in qua est ille pulsus, sed alterius proximioris: quemadmodum heterorhythmus pulsum vocamus, qui alterius aetatis habet rhythum. lib. finit. med.

Pararosis, est depravata visus actio, cum oculis, colore, figura, magnitudine, vel situ, mutata videntur: veluti Amblyopia est diminuta actio visus, & cæcitas, visioq; ablata. 1. de sympt. caus. cap. 5.

Parastatae, aut feminarii meatus, Latini astites nominantur, sunt, qui ex vena & arteria constant, in unam naturam confertis, semen confoventes, & persistentes. lib. finit. med. Vide Glandulosi assistentes.

Parasynanche. Vide Cynanche.

Par-

Paregorica, i.e. mitigatoria medicamenta, quae non sanant, sed mitigant, ne malum crescat. lib. de Dynamid. in proem.

Parempptosis, quam & Periptosis, h.e. incidentiam & casum vocat, lib. 3. *παραπτοσις*, est intercidentia, sive coincidentia; cum E. G. ea plenitudo, quae ex ingestione eorum, quae comeduntur, & bibuntur, in venis gignitur, à venis in arterias delabitur. lib. de caus. procatart. c. 3. Atq; universim parempptosis est, quando aliunde in aliud vas humor influit. 7. de anat. admin. cap. 16. Speciatim, transumptio spirituum, ex arteriis, in venas, parempptosis dicitur. 1. de vena sect. contra Erasistr. c. 2. Vide Coincidentia.

Parencephalis, i.e. Cerebellum, & Encranion, est posterius Cerebrum, quod à priori & anteriori (propter sui magnitudinem) nomen totius sibi vindicâre, crasse meningis duplicatione est diremptum. 8. de usu part. c. 1. Vide Cerebrum.

Parenchymata, Graeci vocant carneam illam substantiam, quae inter vasorum intercapedines recipitur, 7. de anat. adm. cap. 5. ut quae in Visceribus, in Jecinore, Renibus, Liene, & Pulmone visitur: quam substantiam Galenus non vult vocari carnem; ea enim solum caro dicitur, quae in musculo est; reliquarum nullam homines carnem vocant, praequam admodum pauci: sed quae in visceribus, seu Jecinore, Renibus, Liene & Pulmone visuntur, eas Parenchymata (quasi effusiones dixeris) Graeci vocant; quae verò in Intestinis, Ventriculo, Stomacho, & Utero sunt, sine nomine relinquunt. 10. meth. 11.

Pareisis, idem quod paralyxis, i.e. resolutio. Vide Paralyxis. Proprie contractio artuum, in quam passio colica terminatur.

R 4

Parietalia. Vide Bregmata.

Paristhmia, παρίσθια, Tōssillas, & amygdalas vocant, sunt locorum ad Isthmum (i.e. eam oris regionem, quæ os & gulam interjacet) attinentium inflammationes. 3. aph. 26. Paristhmia, Tonsillæ, & Uvæ, nihil aliud sunt, quàm inflammationes; Uvæ quidem, Gargareonis; Tonsillæ verò, adenum, qui in principio faucium inter se oppositi sunt; Paristhmia, corporum eorum, quæ in faucibus continentur. lib. de tumor. cap. 17. Hoc ipso nomine non solum inflammationem, sed etiam faucium partem prædictam nominant Græci, quod locus ille, cui adjacent, Isthmus quæpiam velut angustus est, quum inflammatione tumet, & multo quàm antea angustior fiat.

Parocheteusis, Latinis derivatio, est, cum sanguis avertitur, atq; ad alia membra proximiora conversus, derivatur: si verò sanguis ad contraria revellatur, Antispasmi Græci, Latini Revulsionem vocant. 5. meth. 2.

Paronychia, abscessus est, qui ad latera unguium enascitur, 8. de comp. med. loc. cap. 2. quem Arabes Panaritium vocant, Latini Reduvias.

Parotides. Vide Eparmata.

Paroxysmus. Vide Accessio.

Partes inanes corporis sunt, quæcumq; inter extremitatem thoracis costâ, & femoris ossa continentur. 2. progn. 1.

Partus, τόνος, actio est partim uteri ipsius, adaucti sætus gravitate, & excrementorum redundantia onerati & distenti, vi propriâ expultrice sætus ejicientis; partim ejusdem sætus grandioris effecti, & majori alimento, quàm quod in utero recipere possit, indigentis, atq; ex utero angustia, adaucto nativo calore, ad suffocationis imminentis periculum averfandum festinantis, & (quum non suffi-

sufficiat illi amplius spiritus maternus, quem illa per arterias subministrat) ad exitum repente concitati.

Parulides. Vide Epiludes.

Parygron, i.e. humidum, seu liquidum medicamentum, quod medetur particula, parvâ adhuc phlegmone, confluctanti, huic protinus impositum, ubi duritiem à dolore alienam pars affecta acquisierit; quemadmodum etiam, si phlegmonoso affectu omnino sit libera. 7. de comp. med. per gen. cap. 2.

Palsio, πάθος, πάβησις, generaliter quidem dicitur omnis motus, qui ab altero in alterum fit, sive secundum naturam fiat, sive præter naturam, quâ parte ab altero recipitur: hinc Visio, Auditio, Calefactio, Frigefactio, Humectatio, Delectatio, Dolere, Gaudere, Tristari, palsiones dicuntur, quorum essentia in fieri est, cum motus sint, cujus nullæ sunt partes permanentes, sed dum fiunt, solum sunt, solumq; in fieri & mutari essentiam suam habent: cum autem motus desit, non affectio aut palsio, sed affectum esse & passum dicitur, Græcis διαβάσις. Speciatim verò non solum, dum fit alteratio, palsio dicitur, sed dum facta est, & quæ motu absoluto superstes adhuc est, πάβησις appellatur; ut, ex vulnere cæcitas, ex contusione nigror, ex febre tabes; ex continuâ vigiliis sapientia. Tertio, specialius adhuc non modò palsio, quæ fit, nec quæ facta est, sed quæ est præter naturam tantum facta affectio, palsio vocatur, ut, ex vulnere cæcitas: quâ significatione, morbi, & symptomata, à Medicis palsiones dicuntur. Vide Affectus, & Symptoma.

Pastilli, Græcis τροχίσκοι, seu rotulæ & orbiculi, à figurâ sic dicuntur, medicamenta plana, in rotâ aut circuli formam coacta. 5. de med. per gen. 11. & 1. de antid. cap. 9.

Pastio, i.e. ulcus depascens. 5. de med. per gen. cap. 3.

Patella, est os cartilaginofum, & rotundum, gibbum, quâ femur Tibiæ connectitur; aliàs Mola dicitur, lib. de osib. 23. quin & Rorula, Myla, & Epigonatis, i.e. supergenualis appellatur. 3. de usu part. cap. 15.

Pathema, i.e. passio. Vide Affectus, Passio, & Symptoma.

Pathognomonica syndrome, i.e. concursus symptomatum, affectus p.n. index. 1. de loc. aff. 1. Pathognomonica autem signa sunt, quæ & homoidea, & homogenea, ejusdem speciei, vel generis dicta, in una aliqua sola sunt affectione, & perpetuò soliq; illi insunt, tanquam soli propria, & inseparabilia, veluti quæ per sputa excernuntur, affectionis tum pulmonum, tum thoracis, tum asperæ arteriæ, tum gutturis, & tandem respirationi subservientium instrumentorum, signa sunt, quæ & in Respiratione, vitium per se & primum contraxerunt, non per consensum: atq; hæc signa sunt certissima, non autem ea, quæ perpetuò, sed non soli insunt, vel soli, sed non perpetuò. com. 1. in 1. prorrh. 2. Vide Alsidentia.

Pathologica, sive Aetiologica, Medicina pars est, quæ causas & symptomata, & morbos inquirir. Vide Aetiologica.

Pauciferum vinum. Vide Oenodes.

Pechys. Vide Cubitus.

Pectis, πῆξις, Congelatio, idem quod ἐλγῶσις, h.e. firmitas, stabilitas, fixio; quum verò illa, quæ frigore concresecunt & congelant, firma quoq; fiant ac stabilia, ob id malum hoc (ubi corporis partes præ frigore rigent, adeoque stabiles sint) πῆξις, i.e. congelatio dicatur.

Pecten, est sinus ipse, quo muliebri pudendum clauditur.

tur. lib. Introd. cap. 10. Est adhuc pecten, ea plantæ pedis pars, quâ terram contingimus, & quæ post concavum ad digitos assurgit. Dicitur & Pecten, pars manûs, undè digiti procedunt. Ibid.

Pectorale os, medio pectore situm, costis utring; alligatum est; constat autem septem parvis osibus, per synarthrosin colligatis, quibus singulis singula costa connectuntur; quæ tota pectoralis ossis figura à nonnullis, quia gladii similitudinem repræsentat, Xiphoides, i.e. ensiformis, lib. de osib. cap. 13. imò & sternon appellatur. 7. de anat. adm. cap. 2. Vide Sternon.

Pectus, ea est corporis pars, quæ inter medias costas, & utrumq; latus jacet. lib. Introd. cap. 10.

Pedem summum, partem eam pedis vocat Hippocrates, quæ à planta & solo; usq; ad digitos & ungues porrigitur. 3. de artic. 106.

Pedicularis morbus. Vide Phthiriasis.

Pedion, i.e. planum, planities, seu planta, est pars pedis, quæ est ante digitos; quæ verò pars ante hanc sita est, Tarsus dicitur. 3. de usu part. 5. Arabicè Rascerta. Illud metacarpio manûs, hoc Carpo proportionè responderet. cap. 6. Atqui & interiorem summæ manûs regionem, & quantum infra pedem est, nῆμα Græci, plantam Latini dicunt. 3. de anat. adm. cap. 1.

Pelignus, est color lividus. 14. meth. 9.

Pelma. Vide Pedion.

Pelvis. Vide Infundibulum, & Choana.

Peltalis cartilago. Vide Cricoides cartilago.

Pemphygodes febris. Vide Febris Pemphygodes.

Penis, πῆνα, virile membrum, quod & ἐκδοιον, & γυναιξὶς dicitur. 2. de sympt. caus. cap. 2.

Pen-

Pensilis verruca (vide *Acrochordon*) dicitur, quod inâ sui parte usq³ adeo sit angusta, ut pendere videatur; tota enim foras prominet, adeo ut excisa, nullam radiculam relinquat, angustiore basi prædita, summâq³ chorde similis: à *Myrmecia* differt, quæ basin habet latiore, & nigro colore præditam, atq³ ubi à Chirurgo tollitur, sanguinem fundit copiosorem, undè & selsilis *Verruca* appellatur. Vide *Myrmecia*.

Pepasmus, πεπασμός, est morbi, & eorum, quæ præter naturam sunt, veluti coctio quadam, maturatio, & ad excretionem præparatio, in quâ quod assimilatur, paucum est; quod autem semicoctum & superfluum, multum. Quamquam alibi πεπασμός significatum latius extendens Galenus, omnem deductionem in mediocrem temperiem, πεπασμός appellat; & alibi omnem morborum πέψιν in succorum alteratione consistere scribit.

Pepsis. Vide *Pepasmus*.

Peracutus morbus. Vide *Acutus simpliciter*.

Per consensam morbus. Vide *Idiopathia*.

Perditio. Vide *Aborsus*.

Perfrictio, est idem quod rigor, horror, lib. de tremor. convuls. cap. 6. qui nativam caliditatem, ab humorum multitudine gravari ostendit. 4. acut. 26. Vide *Frigus*.

Perforatio, est sectio, in spatiosam pulmonis sedis capacitatem, ipsumq³ usq³ in pulmonis cavum penetrans; reliqua verò omnis divisio ipsius, vulneratio quidem dicitur, perforatio non item. 7. de anat. adm. c. 14. Nominatur quoq³ perforatio, insignis quidam ventriculus, & meatus, qui ab anterioribus duobus Cerebri ventriculis in ipsum Cerebellum prorumpit, per quem Parencephalis Cerebro est communis & connexa. Cum enim Cerebrum sit
à pa-

à parencephalide, crassa meningis duplicatione diremptū, ipsumq³ oporteret aliquâ parte illi conjungi, quod prædictum meatum produceret, in unum prius locum utroq³ ventriculos terminavit; quem sanè quartum totius Cerebri ventriculum nonnulli nuncupant; alii rectius non ventriculum, sed perforationem nominant, ex qua cavitate, animalis spiritus, parencephalidi transmittitur. 8. de usu part. cap. 11.

Periapta medicamenta sunt, quæ capitis dolori conferunt, Latinis *Amuleta* appellantur, quod de collo suspendantur, aut alicui corporis parti alligentur. lib. de re-med. par. fac. cap. 1. Vide *Amuleta*.

Pericardium, *Membrana*, & *Tunica* dicitur: *Membrana*, à substantia; *Tunica*, ab usu. 7. de anat. adm. cap. 2. Vide *Membrana Pericardios*.

Pericranios membrana, tunica est cranio superimposita, quæ ex duplicatione dura meningis undiq³ connata & intrinsecus cranio adhaerentis, per suturas extra cranium egressa, ut cranium dura meningi & Cerebro artius vinciret, oborta, ipsi cranio extrinsecus in orbem circumfunditur. 8. de usu part. cap. 9.

Pericharia, h. e. subitum & vehemens gaudium; contrarium *Eplexiæ*, quæ est subitus timor. Ex amborum occasione scimus multos interisse. 12. meth. 5.

Pericholus, i. e. biliosus, sive is homo sit, sive dejectio, sive urina, sive morbus. comm. 2. in 1. prorrh. 18. Consueverunt autem excrementa, bilem tenuem circiter habentia, atq³ ea circumvoluta, vocare *Perichra*, i. e. circiter colorata. Ibid.

Perinæon, quod & *Perinæum*, femem & inter-femineum dicitur. Vide *Interfemineum*.

Periodus. Vide Circuitus.

Periostios membrana, est ea tunica, quæ singulis ossibus proximè adjacet; aggregavit enim Natura ac circumjecit omnibus ossibus carnes, simulq; ipsa pinguis-
simâ quoq; parte extracta, terrestria atq; arida, & pinguedine omni carentia reddidit; atq; ex eo, quod extraxit, lentum ac tenax singulis, & in capitibus colligamina, quibus inter se connectuntur, & in longitudine circum undiq; tenues membranas produxit, quæ circum ossa, h.e. ossium involucria, & periostia nuncupantur, quibus carnes aggregavit. 1. de semin. cap. 10. Est insuper Periostios membrana, succingentem & costas circumdans, quæ costis intus tenditur, ita ut inter costas & succingentem, media collocetur. 8. de anat. adm. cap. 10. Est quoq; Periostios oculi tunica, septima in ordine, quæ totum oculum cum ossibus colligat, & simul quoq; moventes ipsum oculum musculos operit. 10. de usu part. c. 2.

Peripneumonia, seu Pulmonia, pulmonis inflammatio est, quam semper continua & acuta febris comitatur; Pulmo autem, cum viscus sit laxum & molle, fistulisq; inanibus undiq; infinitis cavum, cordi vicinum, à pituitosiore proin atq; crassiore sanguine inflammatur, cum subtilis biliosusq; fluat ferè, nec cum viscere ullâ ratione coherescere possit. 4. de caus. puls. cap. 12. & 2. prognost. 64. Comitatur ipsam spirandi difficultas, tantâq; angustia, ut suffocari laborantes videantur, ac rectè sedere cogantur, calidâ sentiunt expirationem, multumq; aërem frigidum attrahere concupiscunt, atq; inter tusiendum spiritum variâ colore ejiciunt, insuper gravitatis cujusdam, thoraci incumbentis sensum sæpè percipiunt, ac dolorem, ex imo ad ipsum

ipsum pervenire, & ad os pectorale, & ad spinam usq; extendi conqueruntur. 2. de loc. aff. cap. 9.

Periptosis. Vide Paremptosis.

Peritonæum, ἀνὸ τῆ περιτνεύου, à circumtendendo sic dicta, abdominis commune regumentum, membrana est, quod alimenti vasis, cunctisq; in imo ventre contentis partibus prætendatur, tenuis est substantia, ex simplicium & primorum corporum numero, prætenditur tum visceribus, tum intestinis, tum vasis, quæ inter septum transversum & crura habentur; tum etiam iis, quæ interjacent, quale est vulva, & vesica, tenue admodum corpus, laris araneorum telis similitimum, abdomini superstratum. 1. de anat. adm. cap. 4. & 4. meth. 6. Arabibus Si-phac dicitur.

Peritonæi vertex, membrana est, telis araneorum similis, inferioribus septi partibus circumjecta, continua, totam inferiorem septi transversæ regionem subvestiens, eademq; circumbarens. 6. de anat. adm. cap. 8.

Perittoma, περιττωμα, est id, quod post completam coctionem nec confectum, nec assimilatum relinquitur, adeoq; corpori nec adnascitur, nec accrescit, sed per ipsius laxiora spatia, tanquam supervacaneum errat; unde nomen quoq; à Majoribus ei Perittoma est inditum, 1. de sanit. tuend. cap. 3. quod est idem ac excrementum, sive id spiritus, sive corpus aliud solidum sit.

Perniones, alias Chimethla dicuntur, sunt intertrimenta, & scissura manuum, & pedum, hyberno tempore à summis algoribus facta. lib. de med. fac. part. cap. 203.

Perona, Sura, Fibula quibusdam, est alterum os tibiae exterius & tenuius: alterum enim, quod crassissimum est, & interiori in parte situm, ὀστέον Græcis, & eodem cum

cum totâ parte, nomine, Latinis Tibia appellatur. Galenus autem ex Hippocrate in τὰς γυναικείας dicit, Peronam diversa significare, aliquando quidem os totum membri, aliquando ipsius ossis epiphysin, interdum ejus protuberantiam, sive malleolum.

Perosis, h.e. oblasio, est privatio & impedimentum naturalis functionis, aut alicujus particula mutilatio. lib. finit. med.

Persistentes morbi sunt, qui eisdem horis accedunt ac remittunt. lib. de Typis, cap. 3.

Perspiratio, & Perspiratus. Vide Inspiratio.

Per viciniam affici. Vide Idiopathia.

Pes, πῆξ, pars infima cruris est, quâ multiplici osses constat, malleolis, talo & digitis.

Pessarium, Pessus, πῆσος, est lana concerpta, aut pannus, aut bombax, aut lineamentum, ad digiti figuram rotundam factum, quod immersum in medicamentum aliquod, involutum serico, filoq; appensum, in uterum inditur.

Pestilentia, febris pestilens, morbus pestilens, λοιμός, est morbus, non quidem patrius, sed Epidemius, contagiosus, perniciosissimus, communis, è communi causa natus, adventitius, presentissimi periculi, quippe qui malignâ & venenatâ putredine, humores, vitales spiritus, & substantiam Cordis labefactat. Pestim itaq; excitat aer, totâ suâ substantiâ putris & corruptus, sive quod is inclusus non diffleat, sive à non humatis cadaveribus, & qui exhalant, vaporibus, & halitibus putridis non discussis, quod inquinatus sit & corruptus. An verò corporum celestium aspectus infausi, influxusq; pestilentem reddant aerem, dubitare malim, quàm credere; præfer-

tini

rim cum Medico, sensus magis sequenti, aeris mutationes pro omni sint Astrologia, ut est 3. aph. & initio prognost. & lib. de aquâ, aëre, & locis.

Petaloides urina est, quâ habet hypostasim similem squamis piscium. lib. de Urinis, cap. 27.

Petia oculi, est sanguis fluens de aliquâ arteriâ, vel venâ oblasâ & sauciâtâ. lib. de ocul. part. 4. cap. 7.

Phacos, faciei macula est nigra, lentis similitudinem obtinens: Latini Lentiginem & Lenticulam vocant.

Phagedænas, φαγδαῖνας, Antiqui nominant ulcera maligna, quâ semper majora & deteriora fiunt; vel quod cicatrice nullâ obducantur, vel quod facta cicatrix resolvatur subindè; sive propter influxum vitiosorum humorum, vel propter dispositionem partis latentem, longo tempore contractam, ex influentibus humoribus, sive ob aliquam dispositionem p.n. ossis eo loco corrupti: sed nobis sufficiat, ex iis ulceribus prævis, alia nominare Herpetes, quâ summam cutem tantum infestant; alia Phagedænas, i.e. exedentes, quâ carnem subjectam corrumpunt: nam quod putridum atque depascens à nonnullis ulcus vocatur, non est propria ulceris differentia, sed passio implicita, ex ulcere atq; putredine. 6. aph. 45. & lib. de aquâ, aëre, & loc. cap. 2. Aliis Phagedænae sunt illa ulcera, quâ partes vicinas continuò depascunt, non tamen eas putrefaciunt, & febres inferunt; quod si depastionem cum putrilagine sustinent partes, proindè aliis Nomæ dicantur, i.e. depastiones. 6. de compos. medic. per gen. cap. 1.

Phalacrofis, φαλακρόσις, calvitium, seu calvities, pilorum capitis desfluvium est, propter humoris alimentarii penuriam, non autem humorum ob vitium; nam hinc

S

oritur Alopecia, Area, & Ophiasis. Vide Madarosis.

Phalanx, articulus est, is maximè, quo magnus digitus, ossi Carpi propinquo, dearticulatur. 2. de usu part. c. 9. Græcis *φάλαγγες*, *φάλαγγες*. Vide Digits.

Phalangosis, affectus est, quo pilorum subnascentium duplex, triplexve acies, in superiore, aut inferiore palpebra, provenit. lib. Introd. cap. 15. Ex quo videtur Author Introductorii phalangosin confundere cum distichiasis, quod falsum videtur, quoniam in distichiasis novi pili, & non naturales succrescunt; in phalangosi autem soli naturales pili sunt, qui inversi, negotium oculo facessunt; in qua cilium intrò spectat, pilorum acie simul cum eo inversa, sic enim oculum compungunt: quibus duobus affectibus commune genus est Trichiasis, i.e. noxa oculis, inversis à pilis, proveniens: qui pili si recenter exoriuntur, distichiasin efficiunt; si nativi, & naturales, Phalangosin, Paulus.

Pharmaceutica, Medicina Therapeutica altera pars est, quæ medicamentis per os assumptis, affectibus p.n. medetur. 3. de comp. med. per gen. cap. 2.

Pharmacia, purgatio, *φάρμακον*, *φάρμακον*, duplicem habet significationem: primò enim significat humorum, qui sua qualitate molestant, evacuationem, sive naturam, sive arte factam, per quamcumq; regionem, E. G. vomitum, sudorem, urinam, nares, tuum, alvum, uterum: secundò, solam vitiosi humoris evacuationem per alvum tantum, ope medicamenti factam, notat: prior significatio habetur comm. 4. in 6. de morb. vulg. posterior in Aphorism. commentis.

Pharyngæthron, apud Galenum nunc pro Pharynge

ge sumitur, nunc pro osse hyoide, seu portione maxima Pharyngis. Vide Hyoides.

Pharynx, duo significat, nimirum primum fauces, (i.e. regionem intra os, ubi tum gula, tum aspera arteria extrema concurrunt, sive medium illud spatium inter laryngem & gulam, & ipsam asperam arteriam, cujus summum laryngem vocant.) Deinde, sumitur nomen hoc pro aspera arteria, quin etiam pro ipsius aspera arterie summo capite.

Phathnia, *φάθνια*, *φάθνια*, sunt ossa, dentes continentia: lib. de ossib. vel potius sunt alveoli, præsepiola, & cavitates, quibus per *ὀφθαλμοὺς* dentes inferuntur.

Phaulon, simplicem & vulgarem victus rationem vocat Hippocrates; eam verò, quæ huic contraria est, exquisitam: inter utramq; autem mediam, hypophaulon, i.e. subvulgarem nuncupavit. 1. de fract. 45.

Phimos, & Phimosis, vitium quoddam in masculis est, Cels. lib. 7. cap. 25. in quo Colis glans aded præputio contacta, ut nudari non possit: huic contrarium malum, in quo propter cutem decurtatam, aut retrò abactam, glans regi non potest, Periphimosis, vel Parephimosis appellatur.

Phimosis est, cum cutis palpebrarum extrinsecus ed usq; inflammatur, ut vicina regionis partes quoq; occupentur, & palpebrae invertantur; cum verò minor quidem in cute inflammatio est, at membrana, quæ intrò ad Irim usq; extenditur, valde abbreviata, tunc intrò palpebra convertitur: quod vitium cum urrisq; palpebris accidit, Phimosis, b.e. Capistratio nuncupatur, cum diducere eas ager atq; oculum aperire nequit. Idem morbus interdum in labiis oritur, & præputio, & ano, cujus

causa ubiq; eadem est. l. 3. de iis, quæ in medic. 32. Vide Paphimolis.

Phleborrhagia, i.e. venarum ruptio. 4. acut. 86.

Phlebotomia, i.e. venæ sectio, aut sanguinis per venam sectam emissio. 11. meth. 1.

Phlegma, Latinis Pituita, Prodicto, Blenna, & Mucus vocatur, humor est frigidus & humidus, albi coloris, insipidus, qui cum in senibus, cum iis, qui ratione quâvis sunt perfrigerati, plurimus coacervatur, autumno abundans. 2. de nat. fac. cap. 9. Vide Pituita, Gravedo, & Coryza.

Phlegmatia, significant sive proprie dictos phlegmonas, & inflammationes nominantur, sive etiam libeat febres unâ completi, secundum antiquam vocabuli acceptionem. 1. aph. 7.

Phlegmone, Græcis φλεγμών, ἢ φλόγῳσις, tumor p.n. est, in quo sanguis calidus copiosior in aliquam animalis partem procumbens, majora ejus vasa distendit, ab his ad minora procedit, à quibus exudat foras, in ea ampla spatia, quæ inter vasa sunt, ut etiam omnia, quæ in carne habentur, loca inania occupet. 10. meth. 6. Soler Hippocrates Phlegmonas appellare omnes inflammationes, etsi tumore præter naturam careant; sed ipso posteriores, nomen PHLEGMONES tumoribus præter naturam attribuunt, quâ cum inflammatione & resistentiâ, & pulsatorio dolore consistunt. comm. 4. in 6. de morb. vulg. 1. Consueverunt Antiqui, omnem caliditatem p.n. phlogosin, i.e. inflammen, & Phlegmonem, sive inflammationem nuncupare. 2. ad Glauc. 1. 4. acut. 21. & 13. meth. 1.

Phlegmone erysipelatosa, est tumor præter naturam, à sanguine bilioso subortus, sanguine in predomino

pec-

peccante, bile in subdominio. Econtra Erysipelas phlegmonosum, in quo prædominatur bilis, sanguine in subdominio peccante, ita ut ab eo, quod in mistura exuperat, nomen ipsi tumori indatur, & Phlegmone erysipelatosa, vel Erysipelas phlegmonosum vocetur: ubi autem neutrum vincit, ibi vitium phlegmones, erysipelatosq; medium nominetur. 14. meth. 2. Vide Inflammatio.

Phlegmone oculi, tumor est circa oculos, cum rubore & caliditate multa, & moru difficili, & punctationibus conjunctus. lib. finit. med. Vide Inflammatio.

Phlogosis, i.e. inflammen, sæpe idem est quod phlegmone, sive inflammatio. 3. prognost. 71. Vide Inflammatio, & Phlegmone.

Phlyctænam vocant propriissimè, ubi per exulcerationem, vel etiam sine hac, exterior Ceratoidis tunica membrana tenuissima, & sublimis elata, intra se humorem collegerit, aut sub tunica spatio, crassior humor currens intumescitiam parit. lib. Introd. cap. 16. Inde ad pustulas per corpus erumpentes, à serosis humoribus ad cutem translatis, nomen transfertur. 2. progn. 60.

Phlyctides, sunt pustula, quæ in ardentissimâ febre, in vigore & statu, calore intensissimo existente, in ore generantur. lib. finit. med. Vide Febris pemphigodes.

Phocatos, instrumenti genus est, quo in fracturis calvaria utimur, à lenticula specie sic dictum. 6. meth. 6.

Phœnigmus, rubrificatio, est ruboris per medicamenta, in aliqua corporis parte, excitatio; quædam enim medicamenta eam vim habent, ut cuti admotæ, ruborem concitent, caloremq; accendant, & si diutius immorentur, vesiculas excitent, tandemq; exulcerent; ab Arabibus proinde Vesicantia, & Vesicatoria appellantur.

Phoxos, est depravata capitis figura, cum caput acuminato est vertice, nec ad oblonga sphaera similitudinem, qualem secundum naturam humanum caput habet, formatum est. lib. de osib. cap. 1.

Phrenitim, eam affectionem vocant, in qua Phrenas, i.e. mentem laesam esse vident. 1. prorrh. cap. 1. Est verò Phrenitis mentis alienatio cum febre acuta, quando Cerebrum propria primariâq. affectione laborat: si verò Cerebrum per consensum afficiatur, dicitur Delirium, & Paraphrenitis. 5. de loc. aff. 4. Est autem affectio hac, inflammatio in meningibus, & in ipsum etiam Cerebrum aliquando pervadens, adeoq. perpetuum cum acuta febre delirii efficiens. 1. prorrh. 1. Quod si febrem adjunctâ non habeat, tunc non phrenitis, sed vel delirium, vel mania appellatur; si verò perpetuum non sit delirium, tunc haudquaquam phrenitis dici debet, sed vel paraphrosyne, vel paraphrenitis, ut quæ tum à ventriculo, tum à diaphragmate, tum in summo febris vigore, excitatur, ac declinante paroxysmo, sponte cessat mentis alienatio. com. 3. in 3. de morb. vulg. 45. Unde omnia signa, quæ eam vel efficiunt, vel significant, dicuntur phrenitica. comm. 1. in 1. prorrh. 4.

Phrenas. Vide Diaphragma.

Phrenicæ venæ, sunt duæ propagines venarum, è trunco venæ cavæ superioris orientes, insertæ in diaphragma, ipsumq. totum nutriendes.

Phtharticum. Vide Deleterium.

Phthiriasis, est scabies, circa palpebrarum radices, squamas furfuribus similes dimittens. lib. finit. med. Vocatur etiam morbus pedicularis, cujus generatio quibusdam contingit in capite acervatim, ex multis videlicet

hujus

humoribus viscidis & calidis quidem, sed non ad talem tantamq. caliditatem progressis, ad quantam perveniunt acres Ichores, i.e. sanies. 1. de loc. aff. 7.

Phthisicus, Græcè φθισικός, is dicitur, vel qui phthisi correptus est & contabuit; vel qui quavis ex causa macilentus evaserit; vel qui ad phthisin naturâ proclivis, angusto scilicet adstrictoq. est thorace, collo oblongo, cui insuper à tergo operata scopula, instar alarum, prominent, (unde πteryγός, h.e. alatus nominatur:) tandem, cui caput imbecillum est, organaq. respiratoria facile omnem ejus fluxionem recipiunt. comm. 2. in 1. de morb. vulg. 13.

Phthisis, Latinis Tabes, communiter sumpta, est diminutio & colliquatio corporis: Tabes verò propriè est à pulmonis ulceratione, thoracis item fauciumq. oblesione, quam proin ruficula & lenta comitantur febres, & corporis consumptio. **Phthoë**, proprio vocabulo dicta, est corporis consumptio ex ulcere. lib. finit. med. φθίσις & φθόν Græcis. Phthoën Athenienses nominant, ob pulmonis ulceram insanabilia, totius corporis cum parva febre factam extenuationem. 7. aph. 16. 5. meth. 15. & 1. aph. 12.

Phthisis oculi. Vide Tabes oculi.

Phthoë. Vide Phthisis.

Phthoria, φθόρια, i.e. medicamenta, quæ valent ad ejiciendos foetus, vivos vel mortuos: alio nomine ἐμβόλια appellantur.

Phthoropœum. Vide Deleterium.

Phygethlon, inflammatio est adenum, quæ in inguinibus & aliis sunt, calore & celeritate generationis, ab aliis tuberculis distincta. lib. de tumorib. cap. 15. **Phygethlon**, est erysipelas inflammationis pariceps, 2. ad Glauco. 1. figurâ

suâ illi pano similis, quo textores utuntur, atq; ideo panus & panis dicitur.

Phyma, est phlegmone, glandulis (sicubi fluxio in eas procumbit) citra ulceris occasionem, accidens, 13. meth. 5. quæ statim augetur, atq; ad suppurationem venit. 2. ad Glau. 1. Vide Tuberculum, Furunculus.

Physema, est resina species, quam & pitynam, & piceam nominant, expers pinguitudinis, admodum exsiccans. 7. de comp. med. loc. cap. 3.

Physiognomica signa sunt, quæ hominum vultui & faciei impressa, rei naturam indicant. lib. Quod animi mor. cap. 6.

Physiologia, sive Naturalis scientia, 1. de elem. 5. Medicina pars prima, nomine sumpto à materia, quæ cognitioni Medicorum subiecta est, ipsissimaq; est corporis humani Natura. lib. de part. art. med. cap. 6.

Phylis, apud Hippocratem nunc naturam, nunc temperamentum significat. 2. acutor. 31. Vocatur insuper Phylis, status aut flatus sive halituosus spiritus, succis pituitosis, in ventre à deficiente calore, in halitum solutus; qui cum per os excernitur, ructum creat; cum per sedem, sonorum silentemve flatum; cum verò neutrà parte emititur, symptoma creat, quod Empneumatosis, h. e. inflatio vocatur, ventre scilicet impotente ad excrementosum nebulosumq; excernendum spiritum; qui retentus propter magnam spiritus vim, & intestinorum latitudinem, graviter sonat, & murmur, quod Græci Borborygmon vocant, causatur. 3. de sympt. caus. cap. 2. Vide Clydones.

Pia & dura mater. Vide Membrana dura.

Picatio, auxilium medicum est, quo partium corpo-

ris

ris pilos excindimus, cum maximè, cum quidam novacula præsidium formident, præsertim in gutture, usq; abrais pharmacum aliquod applicamus. 1. de comp. med. loc. cap. 5. Aliqui verò, picationem & picam significare, inquirunt, symptoma depravata vitiosaq; appetentia, cum stomachus vitiosos & à natura alienos cibos concupiscit præter morem: quo malo mulieres gravida infestantur, ad secundum vel tertium usq; mensem; quarto namq; ferè eo liberantur: quod malum alias Citra, & Cittosa passio, ab ave, quæ Pica dicitur, denominatur. Vide Cittosa.

Pica. Vide Picatio, & Cittosa.

Picea. Vide Physema.

Picra simpliciter, sive Hiera picra, est idem ac medicamentum ex aloë, 4. de loc. aff. 2. quod sui amaritudine, morbos & humores expellit. lib. de Dynamid. in præcæm. Eadem & amara simpliciter appellatur. lib. de cur. rat. per sang. cap. 18.

Picrocholos homo, i. e. amarâ bile abundans. 2. acut. 29.

Pinguedo, est effusi alimenti, circa membranas maximè facta concretio, sensu carens. lib. finit. medic. Vide Adeps.

Pinnæ, seu Pinnulæ, sunt alæ narium. lib. finit. med. Vide Alæ narium.

Pituita, seu Phlegma, in genere dicitur & est omnis frigidus & naturâ humidus humor. 8. de placit. cap. 6. unus ex quatuor humoribus principibus, omnis qualitatibus & saporis expers, nonnunquam verò & dulcis particeps sit qualitatibus. lib. de atra bile, cap. 2. Scindapson Galenus jocandi gratiâ, nunc pituitam, 8. de placit. cap. 6. nunc Cerebrum nominat. 8. de placit. cap. 4.

Pityriasis. Vide Physema.

Pityriasis & Pityra. Vide Furfuratio.

Pityroides urina, quæ habet hypostasim similem fururi, & furfuraceam. lib. de urinis, cap. 28.

Pladarotes, sunt molliæ veluti corpora vetusta, & maxime decolora, palpebrarum parte internâ nondum aspredinem habentia. lib. Introd. cap. 15.

Plados, omnis humiditas redundans & excrementitia dicitur: sive tenuis ea sit, sive, in modum puris, crassa. 3. de fractur.

Plagulæ, quæ & splenia dicuntur, à splenis formâ, deligationum stabilimenta velut & firmamenta sunt: luxato enim fracto, vel comminuto osi, fasciæ imponuntur, quæ confirmatum ac repositum os continent, prohibentq; ab affecta parte inflammationem, præsentem humorem repellendo, & adveniienti obfistendo, quæ Fasciæ, & subfasciaciones, & subligamina appellantur; supra has, ne dimoveantur ac divertant, plagule imponuntur, cerato aliquo imbutæ; quarum duplex est usus: alter, ut subligamina contineant; alter, ut ea membra circum expleant, quæ in acutum desinunt. Plagulis tertio alia fasciæ, quas superligamina nominant, induntur, quibus ferule superponuntur, quæ totam deligationem firment ac stabiliant. 3. de iis, quæ in medic. 11.

Planities. Vide Pedion.

Planra. Vide Pedion.

Planum. Vide Pedion.

Platysma, h. e. latius linteum, quod ulceribus extrinsecus superadditur. 4. de comp. med. per gen. 14. Platysma autem myodes, est dilatio musculoſa, sive latus ille musculus, qui cuti subnascens, buccam, sinè maxilla, movet.

ret. lib. de nervor. dissect. cap. 6. Vide Latus musculus.

Plectrum. Vide Pharynx, & Isthmus.

Plenitudo. Vide Multitudo.

Plenus pulsus, qui arteriam tactui exhibet pleniorē, & humidam. 1. de differ. puls. cap. 6.

Plethora est, ubi equaliter inter se omnes succi sunt adaucti; nos plenitudinem, & succorum redundantiam dixerimus: ubi verò vel slavâ bile, vel nigrâ, vel pituitâ, vel serosis humoribus refertum jam corpus fuerit, eum habitum, Cacochymiam, i. e. succorum vitium, non autem Plethoram, dicimus. 3. meth. 6. & 13. meth. 4. Vide Multitudo.

Pleuritis, Pleuresis, & morbus lateralis, est inflammatio illius membrana, quæ costas intus subcingit, 6. aph. 33. & mutuato à costis nomine, Pleura dicitur. Exquisita verò pleuritis fit, ubi subcingens costas membrana, primario affectu laborat, & dolor vel ad jugulum, vel ad præcordia pervenit; ad jugulum quidem, superioribus ejus partibus affectis; ad præcordia verò, ubi inferiores asficiuntur: vehemens quoq; febris hanc inflammationem perpetuò sequitur, quia sedes affecta & parùm distat à Corde, & cum ipsius involucri ac septo transversò cognitionem habet. 5. de loc. aff. 3. & lib. de constit. art. cap. 15. Arabibus Sofati, Birsen, & Pleuresis, Græcis πλὴνιτις appellatur. Non exquisita verò pleuritis est, in qua dolor externus est, qui contactu loco movetur, exacerbaturq; vel quod sinè febre, vel sinè sputo, vel sinè rufi, vel sinè spirandi difficultate sit; vel quod neq; tensionem, neq; duritiem ullam pulsus habet, quæ tamen singula exquisitam efficiunt pleuritidem. Pleuritidem verò incoctam appellant, quæ vel celeriter hominem jugulat, vel non nisi longo

go tempore finitur, nec per spūm expurgatur. 5. de loc. aff. cap. 2.

Plexus choroides. Vide Choroides plexus.

Plexus retiformis, seu reticularis, est involucrium ex multis arteriis complicatis sub dura meninge collocatum, ad retardandum spiritum animale, ne statim effluat: ubi enim Natura voluit diutius morari materiam, ibi transitum ipsis difficilem molita est; quemadmodum in Ventriculo quidem Pylorus, in intestinis involucria, anfractus & gyri, & ante testiculos arterie & vena multipliciter involvuntur; non secus in capite sub dura meningē, plexus arteriarum retiformis, & reticularis, & Choroides, quin & rete mirabile dictus. 4. de usu part. cap. 13. & 9. de usu part. cap. 7. Vide Glandulosi assites.

Plexus variciformis. Vide Flexus variciformis.

Plixada, i.e. gressuram, totum id, quod inter inguina utriusq. cruris est, solet Hippocrates appellare. 4. de art. 45.

Pneumantias, & Pneumatodes, vocat Hippocrates anhelosos, qui densum spiritum, sive crebram & densam respirationem habent. 3. de diffic. respir. cap. 12. Quin etiam Pneumatodes vocat Hippocrates eos, qui ventrem inflatum habent. Ibid.

Pneumaticus, i.e. spiritalis, qui omnia spiritibus attribuit. lib. Introduct. cap. 9. vel qui de spiritibus agit. 3. de differ. puls. cap. 6.

Pneumomphalon, umbilici est dilatatio, à flatuoso spiritu. lib. finit. med.

Phigalion morbus, Incubus Latinis dictus, alio nomine Ephialtes. Vide Ephialtes.

Podagra, est Arthritis pedum: ut enim Arthritis, un-

versis

versi corporis, & articularum omnium, morbus est; ita, si solum pedum sit passio, ab affecta parte Podagra; si manuum, Chiragra nuncupatur. Vide Arthritis.

Pollex, est brevior & major digitus manus, quem Antichera & promanum vocant. lib. de ossib. c. 22. Vide Digni.

Polychresta medicamenta sunt, quae multis affectibus conveniunt. 5. de compos. med. per gen. cap. 1.

Polychronius, aut simpliciter, ὁ πολυχρόνιος, morbus, qui longo tempore durat: cui opponitur Brachichronius, qui brevi tempore finitur. 3. de diet. dact. cap. 13.

Polymorphum. Vide Sphenoris os.

Polypus, tumor est præter naturam, in navibus genit. polypodis carni juxta substantia proprietatem, assimilis. 3. de comp. med. loc. cap. 3. Hipp. lib. πειρ. παθόν.

Pompholix, bulla, est elevatio in humore facta à flatuoso spiritu, quo intra humorem concluso bulla excitari solet, præsertim si humor tenax viscosusq. est, & calor in illam agat debilis; tunc enim bulla permanet, nec facile solvitur: quales sæpe in urinis visuntur, renalem & longum morbum significantes, ut est apud Hippocr. in aph. Est & Pompholix metallicum medicamentum.

Ponos, nunc laborem propriè dictum, nunc dolorem, seu malam affectionem, quæ in acutis morbis ægri male tractantur, significat. 2. acut. 47.

Poples, sive Ancyle, est articulus ille, quo os magnum femoris articulatur ossi tibiae, in quo pars exterior genu dicitur, interna verò, quæ crus flectitur, dicitur poples. lib. Introduct. cap. 10.

Poroccele, est ramex callosus, sive tophus in testiculo, aut in membrana Erythroide concrevens, insignis, ren-

tens,

tens, durus, & inæqualis. His notis ab Hydrocele, & Sarcocele distinguitur. lib. finit. med.

Poromphalon, est concretio tophi in Umbilico. lib. finit. med.

Poropœia, est exiguorum meatuum apertio. 4. meth. 4.

Porracea bilis. Vide Bilis pallida.

Porrigo, i.e. surfuratio. Vide Furfuratio.

Porta vena. Vide Cava vena.

Portæ hepatis, πύλαι τῆς ἡπατὸς, sunt pars summa hepatis, in qua radicata vena porta, vel vena portæ, quæ est ingressus chyli in jecur; sicut ex gibbâ, sanguinis est egressus.

Porta ventriculi, est inferius ventriculi orificium, quod πυλωγὸς Græcis, Latinis Janitor dicitur. 3. de loc. aff. 7. Vide Pyloros.

Portinarium, est primum intestinorum, quod duodenū appellatur. l. de anat. viv. Vide Dodecadaetylon.

Porus, in speciem est opticus nervus mollis, ex prima conjugatione nervorum, à Cerebro ad oculos pertinens, quippe qui solus manifestum habet foramen, unde & visibilibus & meatus absolute dicitur. 3. de loc. aff. 2. Porus deinde dicitur exiguus omnis corporeæ molis meatus. l. de sanit. tuend. cap. 12. Atqui & porus tophum significat, tum qui in Arthriticis, tum qui in calculosis generatur: cum enim humor crudus lentorem assumit, & transitus per renes in quibusdam naturis sunt angustis, id, quod crassissimum est, & maxime lentum, diutius moratur & tophum gignit. l. de alim. facult. cap. 5. Porus denique & Callum significat, ad quem gignendum cogi & concretere aliquid proprii osium alimenti oportet; id quod in fracturis osium cum primis accidit. 6. meth. 5. Vide Meatus, & Oncos.

Post.

Post-apparentia. Vide Absidentia.

Post-brachiale. Vide Brachiale.

Posterius Cerebrum. Vide Cerebellum.

Posthia, sive Crithe dicitur, cum parte internâ palpebrarum, juxta coronam; suppuratum tuberculum oblongum, figurâ hordeo simile, (unde appellatum est) efficitur. lib. Introd. cap. 15.

Præcedentes causæ. Vide Antegressa, & Febres putridæ.

Præcognitio, προγνωσις, prænotio est futuri decursus & eventus morbi, uti etiam futuri symptomatis ejus, quod necessariam habet generationem, non autem omnium, quæ circa egrotos eveniunt, accidentium; modò nihil aut ab egro, aut ab absidentibus fuerit commissum, quo Medici judicium jure frustrari possit. Hippocr. ab init. prognost.

Præcordia, aliàs Phrenas, Veteres Diaphragma & Transversum septum appellarunt; infra verò hæc præcordia, tum venter, & intestina, tum jecur ipsum sita sunt. 8. de placit. cap. 9.

Pregmatis ossa duo sunt, capiti desuper incumbentia, parte posteriori os occipitis, anteriori verò os frontis, utrinque ab ossibus temporum, lineis fuerunt distincta, quæ & Bregmatis ossa appellantur. 11. de usu part. cap. 20. Vide Bregmata.

Præincipientes causæ. Vide Antegressa.

Præputium cutis est, quæ glandem pudendi vestit. 1. meth. 15. Vide Glans.

Præsepiola. Vide Pharthnia.

Præter naturam. Vide Secundum naturam.

Prætextus, manifestissimas causas, & verissimas vocavit Hippocrates; cum tamen in usu sit, ut falsa cause prætextus

textus appellantur, 2. de fract. 62. Quin & prætextus aliquando non falsas causas, sed veras dicit. 3. de fract. 46.

Priapismus (Latinis Tentigo) est auditio pudendi stibilis, in longitudinem ac orbem tumefacti, citra rei Venereæ appetentiam, 9. de comp. med. loc. cap. 9. à flatuoso spiritu, 14. meth. 7. nullo præsentē stimulo ad libidinem, aut desiderio coitus; ut quibusdam accidere consuevit, quæ supini decumbunt: ductâ denominatione à Priapo; nam hunc, cui suapte naturâ hujusmodi Coles esset, ita finxerunt, atq; picturâ descripserunt homines. 6. de loc. aff. 6. Affectum hunc etiam Satyriasin, & Satyriasum Græci vocant, quod Satyri arrigere semper crediti sint. 1. de tumor. cap. 14.

Prima corpora. Vide Homiomerēs.

Prima particula. Vide Similare.

Primæ venæ (quæ & magna vasa appellantur, & vasorum radices, 5. meth. 3.) sunt, quæ circa jecur, & mesenterium, & Cor visenda sese præbent. 12. meth. cap. 3. Vide Radicem vasis.

Primarius affectus. Vide Idiopathia.

Primitiva causa. Vide Antegressa.

Princeps intestinum. Vide Rectum.

Principium morbi triplex dicitur: primum quidem de primo insultu, qui simplex est, & latitudine caret; secundum, de eo, quod ad tertium extenditur diem; & præter hæc etiam id, quod tanquam pars accipitur totius morbi, in quod manifestæ coctionis signa desiderantur. 1. de crisi. cap. 8. & 19.

Proboscis, sive Pronomæa, est pars quadam pendens angusta, & longa in Elephantæ animali, (quo loco alius est nasus) adeo ut ad terram pertingat. 16. de usu part. 14.

Pro-

Procatactica causa. Vide Antegressa.

Processus anchoralis. Vide Ancyroides.

Processus cornicularis. Vide Ancyroides.

Procidentia oculi est, cum ab ictu aliquo violento, aut strangulatione, cum febre continua, vel capitis dolore, prolapsus oculus fuerit. lib. finit. med.

Procondyli, dicuntur primi digitorum articuli, metacarpio proximi, perinde ut medii digitorum articuli, condyli; extremi verò, metacondyli nuncupantur.

Proëgumena, causa interna est, aliàs antecedens: Celsus vocat abditam, in occulto positam, & morbi continentem causam: quanquam talis in specie dicitur causa morbi conjuncta, quâ posita, ponitur; sublata, tollitur morbus.

Productio. Vide Dodecadactylon.

Prognostica signa, futura prænunciant; Diagnostica, præsentia declarant; Indicatoria, instantem crisin & curationem indicant. lib. de opt. sec. cap. 6.

Prolapsiones, i.e. ossium absolutas & integras alterationes sive dearticulationes. Dimotiones non integras appellat Hippocrates, 3. de fract. 51. & 2. de fract. 39.

Prolepticus morbus. Vide Anticipans, & Cihnumenus.

Promanus. Vide Digiti, & Pollex.

Pronervationes. Vide Tendones, & Aponeurosis.

Pronomæa. Vide Proboscis.

Prophasis. Vide Antegressa.

Prophylace, ea dicitur artis Medicæ pars, quæ morbi causam adimit; Prophylactice verò, quæ à morbo præservat. 11. meth. 2.

Proprius affectus. Vide Idiopathia.

T

Proptosis, *procidencia oculi* appellatur, *abi cum in inflammatione, illi ex sede suâ procidunt.* lib. Introd. cap. 15.

Profartesis, *h.e. appensio*, longiorum membranarum ad vicina loca est applicatio. lib. finit. med.

Prospheromena, *i.e. assumenda*, vocantur, quæ intra corpus sumuntur, ut quæ eduntur, bibuntur, ipsæq; inspiratus aër. 10. meth. 7.

Prospylis. Vide Prosthesis.

Prosthesis, prior est virtutis nutritiva facultas, quæ nutrimentum membro nutriendo apponit: unde appositio dicitur, quam subsequitur **Prospylis**, *i.e. agglutinat*, sive unio, quæ nutrimentum appositum agglutinat, & unit membro. Tertia est *duo tactus*, quæ unitum nutrimentum eidem assimilât, & dicitur in specie Nutritio. 3. de natur. facult. cap. 1. & 13.

Prosthetis, est pars carnosâ, quæ in manuum & pedum cavâ parte nascitur.

Protopathia. Vide Idiopathia.

Prurigo, *pruritus*, sensus pruriginosus est, cum exigua quadam molestia, qualis puerorum, qui jam dentire incipiunt, gingivis accidit. 3. apb. 35.

Pfallidæ. Vide Fornices.

Pfallioides, sive **Pfallioides**. Vide Camarion.

Psammissmus, Curationis genus est, quo *Hydropici*, arenâ calidâ, recto capite, ad aquam ab universo corpore eiendam, & ejiciendam, sepeliebantur, & soli ardenti exponebantur. 3. meth. med. 9.

Philothra medicamenta sunt, quæ pilos & capillos aut ex toto auferunt, vel duos, magnos, multos, crassos, & veluti suillos pilos attenuant, & minores reddunt, vel ipsos penitus extripant, & partes corporis depiles reddunt. 1. de

1. de comp. med. loc. cap. 4. Differunt à Dropace, quod sine viribus Dropace valentiora. Vide Dropax.

Psoa, quasi *pulpam*, *i.e. lamborum carnem* dixeris, est magnus musculus, ab undecimâ thoracis costâ incipiens, & per universa ilia, ipsamq; pubem progrediens. lib. de muscul. diss. cap. 31.

Psoa, scabies est, cum asperitate summa cutis, pruritu, furfuribus, insigni & corporis assumptione, lib. Introd. cap. 13: quæ omnia etsi illi cum *Leprâ* communia sint, differunt tamen, quod in *Psoa* summa cutis occupatur, in *Leprâ* malum altius descendit, subjectasq; sevit in partes. Insuper, in *Psoa* furfuracea fit cutis, in *Leprâ* squamosa. Ad hæc, *Psoa* variè figurata est, *Lepra* verò circularibus magis erosionibus curem depascitur. *Psoam* Avicenna distinxit in excorticatam, & non-excorticatam, scædam, & non-scædam, humidam, & siccam: quod forte aliud sit Græcis *Psoa*, ac Arabibus.

Psoialis, est scabies, & duritia scroti, cum intensâ prurigine; quandoq; verò & ulceratione. lib. finit. med.

Psoica medicamenta sunt, quæ scabras in palpebris affectiones sanant. 2. de comp. med. loc. cap. 3.

Psorophthalmia, *i.e. pruriginosa scabies*, à Sole, & pulvere orta. lib. de ræmed. par. fac. cap. 10.

Psychrophobus dicitur, qui frigida aqua exhibenda est timidus: sicut & hæmophobus, est sanguinis mittendi timidus: & hydrophobus, qui à rabido cane morsus, aquam reformidat. 9. meth. 5.

Plyctica medicamenta, sunt refrigeratoria, quæ omnem calorem & lassitudinem mitigant. lib. de Dynam. in proem.

Psydraciæ sunt parvæ efflorescences, factæ in capite, si-

miles vesicis eminentibus in superficie. lib. de med. fac. par. cap. 5. Differunt à Phlyctænis, quòd hæc in toto corpore, nec tantum capite, ut Psylodracia, oriuntur. Item, quòd Phlyctenæ à calidiori acrioriq̃, hæc à minus calido & acri humore gignantur.

Pterna, calx, os pedis omnium maximum est, parte, quâ ingredimur, leniter rotundum & latiusculum, posteriore, tibia rectitudinem longè excedens, inferiore astragalo, anteriore osse scaphoidi inarticulatum.

Pterygoidea, quæ & alaria ossa dicuntur. Vide Sphenois os.

Pterygium, dicitur superinnata oculi membrana, incipiens ab angulis, & procedens usq̃ ad corneam; quæ magis aucta cooperit & pupillam. lib. de med. fac. par. c. 12. Pterygia etiam vocant alas narium, i. e. fines ejus infernos, qui moventur. 11. de usu part. cap. 12. Insuper, Pterygium etiam Ungula appellatur & Unguis; differens ab Encanthide, quæ est carnis in majore angulo ex-crescentia; Pterygium verò, nervosa caruncula est. 10. de usu part. cap. 11.

Prilos, glabras, palpebras, qui pilos non habent, Græci vocant. 4. de comp. med. loc. cap. 8.

Prilosis, est casus palpebræ pilorum. lib. de medic. fac. par. cap. 12.

Prisana, nunc pro succo hordei percolato, nunc pro jusculo ex hordeo parato sumitur. 9. de placit. cap. 6.

Prosis, oculi vitium est, quòd alio nomine *παράγγωσις* appellatur. Vide Phalangosis.

Pryelos. Vide Choana.

Pubes, pubertas, tempus est ætatis primæ, quo lanugo circa mentum & pudenda oriri incipit: id quod anno de-cimo-

cimo-quarto fieri solet. 5. aph. 7. Est & Pubes idem quod pecten, postrema pars hypogastrii, sive Aqualiculi, cui pili innascuntur. Vide Aqualiculus. Cujus pubis, seu pecti-nis ossa, apophyses sunt ossis sacri tenues perforata, & in anteriora protensa.

Publicè grassantes. Vide Communis, & Endemus.

Puerilis morbus. Vide Comitialis.

Pulmo, ex genere est parenchymatum, caro rara, tene-ra, & spongiosa est, in cujus cavis & fistulis cartilagineis, aer attractus modicè retinetur, & rectificatur à suis pravis qualitatibus, indeq̃ in cordis transmittitur ventriculum sinistrum, pro spirituum vitalium generatione. 1. de anat. viv. Unde respirationis & vocis instrumentum est. 7. de usu part. 1. Est itaq̃ Pulmo viscus, quemadmodum hepar, va-sis quàm plurimis contextum, quorum intervalla carne molli, instar stœbes cujusdam, opplentur, quo omne id, quod inter vasa est inane, repletur, essetq̃ firmamentum ac propugnaculum imbecillitatis ipsorum. Ibid. cap. 2 & 8. *πνεύμων* Græcè dicitur, spongiosus est, quòd follii instar, aère impleri distendiq̃, circa noxam possit & contrahi, sub-stantiâ sua spumam sanguinis referens.

Pulmonia. Vide Peripneumonia.

Pulsativus dolor. Vide Dolor pulsativus.

Pulsus, est sensibilis Cordis & arteriarum motus, dila-tatione & contractione factus. 1. de differ. puls. cap. 2. & 4. de differ. puls. cap. 3. Hoc nomen Pulsus Veteres primum adhibuerunt designandis motibus dolorificis pulsantibus, ex inflammatione concitatis, vehementiq̃ motu arteria-rum. Deinde, Medici eâ voce significant motum secundum naturam in Corde & arteriis factum per systolen, & dia-

stolen: in quo Medici tactus ipsa in diastole si evertatur, aut violenter impellatur, ipsaq; arteria cum renixu quodam pulset, vehemens pulsus, *σφοδρὸς σφύγξ* dicitur: cui oppositus *ἀνσφοδρὸς*, languidus dicitur.

Pulvis pinguis est, in quo nec asperum quippiam, nec acre subest. 5. de sanit. tuend. cap. 3.

Punctio, solutio continuitatis in carne est, ab aliquo acuto incidente, & tenui facta: Græcè *ὥγξ*, & *ὥγξιν* dicitur. Punctio insuper & Compunctio, appellatur incisionis ratio, quæ hydropicis ad ciendam aquam debetur, *παπανόττις* Græcis dicta, Arabibus Punctura.

Punctorius dolor. Vide Dolor tristis.

Pupilla, Græcè *χόρη*, foramen medium uveæ tunica oculi est, in quo fit visio. lib. de anat. viv. Estq; media totius Tridus pars, lib. Introd. cap. 10.

Purgatio, evacuatio est vitiosorum & qualitatibus suis peccantium humorum per propria loca; derivatio per propinquiora; revulsio per contraria. 4. meth. 6. & 5. meth. 3. Vacuationem appello propriè materia, ubi quantitate exuperat; purgationem verò materia, qualitatibus suis insensæ. 2. progn. 14. & 1. aph. 2. Vide Evacuatio, Pharmacia.

Purgamenta, *λοχία* Græcis, dicuntur ea omnia, quæ à puerperâ, post sætum & secundas exeunt per uterum, quæ & Catamenia appellantur; soloq; hoc differunt, quòd hæc ante partum sint, illa post partum.

Purgatorii facultatem non omnes intelligunt; duo enim significat: alterum commune omnium, quæ quovis modo animalis excrementa expurgant; alterum verò per excellentiam de iis tantum dicitur, quæ aut per

vo

vomitum; aut per ventris dejectionem substantia sue familiaria expurgant. 5. de simpl. med. cap. 20. Vide Cathartica.

Purpurea vena. Vide Communis, & Media.

Purulentia, suppuratio est, ubi pus universum constitit, concocto tumore quopiam præter naturam. 1. progn. 40.

Purulentus, & Suppuratus. Vide Empyus, & Empyus.

Pus, *πύον*, est humor putris sive suppuratus, partium spermaticarum substantia assimilis. Humor dicitur, quòd in humoris modum fluens, suam ex humore habeat originem, qui in partem inflammatione laborantem decumbens, & per inania ejus spatia diffusus, occlusis undiq; meatibus, per spiratione intercepta computrescit; perinde atq; alia omnia, quæ per spiratu carentia, alieno in loco vehementius incallescunt.

Pustulæ, Græcis Hydatides, & Exanthemata dicuntur. 4. de sanit. tuend. cap. 4. Sunt & Pustulæ, abscessus in nigro oculi, cum phlegmone & humorum affluxu. lib. finit. med. Vide Exanthemata.

Pustulæ latæ, sive tubercula omnia, duplicem habent differentiam: etenim quædam tendunt in acumen, & altum petunt; quædam in majorem & ampliorem extenduntur locum, non tamen in altum attolluntur: unde Pustulæ quædam sublimes, nonnullæ latæ sunt. 6. aph. 9. Latæ quidem, tum ob humoris frigiditatem, lentorem, & crassitudinem; tum propter continentis membrana densitatem: Sublimes verò, tum propter humoris caliditatem, & tunica raritatem; tum propter virtutis robur, foras pellentis pus; unde Coni similitu-

dinem referunt, & in mucronem fastigiantur. 1. progn. 40.

Putredo, Putrefactio, Græcis *οὐσία*, est mutatio totius putrescentis corporis substantiæ ad corruptelam, à calido externo. 11. meth. 8. Secundum Philosoph. in lib. de gener. & corrupt. est corruptio caloris in unoquoque calido & humido, ab extraneâ caliditate. Cæterum, non quicquid corrumpitur, reverà etiam *οὐσία*, i.e. putrescit, sed quibus id cum fetore accidit. 5. simpl. 15. Putredinem porro duplicem Galenus facit, 1. de diff. febr. unam, quæ sit superante naturâ; alteram, quæ sit superatâ. Galenum eo loco consule.

Pycnorica, & Pycnosis. Vide Condensantia, & Obstruentia.

Pyelus, Græci vocant parvos alveos, in quibus nationes insituntur. 7. meth. 6.

Pyloros, posterius & inferius est ventriculi orificium: sic dictus, quoniam porta modo, ne nutrimentum ex eo confestim dilabatur, prohibet. lib. Introd. cap. 11. Dicitur & Pyloron, ad dextram propè jecur situm habens. lib. de ven. & artic. dissect. cap. 1. Latinis Janitor. Vide Porta Ventriculi.

Pylus. Vide Myrmecia, Clavus, Callus.

Pyssis. Vide Onyx.

Pyricauton, i.e. igne ambustum. Sic quoque dicitur affectus ille, quo quis in aqua ferventi ustus fuerit. 1. de comp. med. per gen. cap. 4.

Pytiroides. Vide Hypostasis.

Pyriama, fortis, somentum est, quod corpori admoveatur, vel per suscitum, vel validam spongiam humido aliquo decocto imbutam, vel vaporem per arundinem, vel cucurbitulas, &c.

Py-

Pyrrionides. Vide Dentes.

Pyulcon, instrumentum est, quo mulsâ per ulcus infusâ, jubemus, ut ægri, in laborantem partem thoracis decumbentes, tussiant, aliquando etiam molliter thoracem concutiendo, sic pus universum, saniemque ulceris extrahimus. 5. meth. c. 8. Quin & Pyulca, i.e. puris attractiva medicamenta nominantur. 2. ad Glauc. 8.

QUADRATUM corpus, Græcis Eusarcon, est, quod nec gracile, nec crassum, nec calidum, aut frigidum, aut alio quovis modo intemperatum, 1. de temp. cap. 6. sed inter hæc omnia extrema, medium constituitur. 3. de caus. puls. cap. 11.

Quartana febris, *τετραήμερος*, est, cujus circuitus est quarto quoque die, quo unam accessionem facit, ac unam remissionem. lib. de Typis, cap. 4.

Quassatio, est quartus luxationis vertebrarum modus; tria enim vitia ex vertebrarum luxatione contingunt: cum retrò abeunt, gibborositas; cum intrò, repanditas; cum in latus torquentur, obstopitas; præter hæc quartum vertebrarum vitium accedit, cum dimota quidem junctura ac compages sunt, sed vertebra tamen in suâ sede permanent, quassationem hanc appellant. 3. de artic. 2.

Quotidiana febris. Vide Cathemerina.

Quotidianarum febrium typus est, qui quotidie unam & eandem accessionem, & eam quidem longitudine commensuratam, & unam eandemque remissionem habet: ut, Tertianus circuitus est, qui tertio quoque die, unam & eandem accessionem longitudine commensuratam, & unam & eandem remissionem facit. lib. de Typis, cap. 4.

T §

RADENS bilis. *Vide* Ater succus, Atra bilis, & Acida bilis.

Radius. *Vide* Cubitus.

Radicem vasis, seu venæ, vocant priorem ejus partem, Feciori vel Cordi propiorem: hac in cõllo ab inferiore est parte, in brachiis & cruribus à superiore. 5. meth. 3.

Ramenta, sunt membranarum in intestinis rasæ, aliquando cruentosæ. 1. de loc. aff. 4. *Vide* Strigmenta.

Ramex, Hernia, Græcè Cele, est omnis in Scroto tumor, sive ex delapsu Intestini, sive Omenti, sive Vasorum spermaticorum, varicis, tophi, sive lenti humoris, sive aquosæ substantiæ. lib. finit. med. Fit autem & aliquando Ramex in inguine, quoties validus ille Tendo membranæ, qui ante inguina ortum habet, & pubis osi inferitur, laxescit, ejusq; robur infirmius factum, & cum eo rotus inguinum locus laxior redditus, partes quasdam corporis subiacentium, veluti sunt intestinorum, vel omenti, in sese recipit. 4. de anat. adm. cap. 6. *Vide* Celas.

Ranula, tumor est phlegmonodes, sub lingua consistens, potissimum in pueris, Græci βάρδαχον vocant. Dicuntur quoq; Ranæ, sublinguales vena, sanguine copiosiore distenta.

Rarefacientia medicamenta (Aræotica Græcis) sunt, quæ cutis meatus referant. 5. simplic. 14. *Vide* Anæstomatica.

Rarum corpus est, cujus partes multis spatiis inartibus, aëre plenis instructa: e contra corpus densum, seu ipsissimum, quod ejusmodi porositatibus carens, compactum est. 1. simplic. 13. Sive, Rarum corpus est, quod meatum & poros magnos habet. 2. de sanit. tuend. cap. 5.

Rarus

Rarus pulsus. *Vide* Creber pulsus.

Rascetta. *Vide* Brachiale.

Rationalis Medicorum secta est, quæ naturæ rationem & ductum secuta, morborum causas inquirat, & signis ad illarum inventionem utitur, curationem capiens à contrario, prout causæ exigunt. lib. Introd. cap. 3.

Raucedines. *Vide* Branchos.

Recidiva febris est, quam pravorum humorum reliquæ putrescentes, de novo accendunt; cum omnis humor alienus à natura corporis, in quo continetur, aptus non sit ad ejus nutritionem, & proin necessarii ad putredinem convertatur. 2. aph. 12.

Reciprocus pulsus. *Vide* Deficiens, & Recurrens.

Reciprocus decurtatus. *Vide* Deficiens decurtatus.

Recrementum. *Vide* Callosum corpus.

Recrudescencia, ulcera maligna vocat: & Recrudescere, quasi rursus crudum fieri, atq; in pristinam malignitatem quippiam redire, statuunt Medici. 2. de fract. 28.

Recta futura Calvariæ. *Vide* Obelæa.

Rectum Intestinum (quod & extensum, & longum, quin & Intestinum princeps vocatur) est ultimum intestinorum omnium, quod ad sedem usq; porrectum est: 6. de anat. adm. cap. 9. ad cujus finem est Sphincter, i. e. constrictorius musculus; ad cujus distinctionem reliquam intestini recti partem infimam, quæ maxime dilatatur & laxatur, laxam appellamus. lib. de vulve dissect. cap. 1.

Recurrentes nervi. *Vide* Nervi recurrentes.

Recurrens pulsus est, qui in quantum excurrit magni-

gnitudinis aut vehementiæ, in aliis rursus ad tantundem recurrit. lib. finit. med.

Reduvia. Vide Paronychia.

Refectio. Vide Anatriptis.

Regius morbus est, qui amarā bilem in toto corpore redundantem comitatur: sunt perinde ut Erysipelata & ulcera serpentia, cum eadem amara bilis unam quampiam particulam obsidet: nigram verò bilem in toto quidem corpore, Elephantiasis; in una quampiam particula, Cancer subsequitur. Pituitoso excremento, in toto quidem corpore luxurianti, succedit hydrops Leucophlegmatias dictus: cum in unâ insedit particulā, tumor œdematosus oritur. 3. de sympt. caus. cap. 2. Vide Artuatus, & Icteros.

Relaxantia medicamenta, Græcis Chalastica, familiariori omnibus propè recentioribus Medicis vocabulo, inde nimirum dicta, quòd tensas laxant particulas; quippè relaxari ac intendi, contraria inter se dicunt. 7. de compos. med. per gen. cap. 9. Vide Chalastica.

Remissio febris, secunda totius circuitus paroxysmi pars mitior, ad infebriationem properans; in duo siquidem periodus universa divisa est, in accessionem & remissionem. lib. de totius morbi temp. c. 8. Vide Ablatio.

Remissus pulsus. Vide Vehemens.

Renes, νεφροί, corpus sunt densum, ex carne & fibris constitutum, adeoq; carnea substantia, non paucas habens involutiones, figurā Græcæ literæ C, aut phaseolis similes, habentes in medio cavitatem quandam, quā ex venis & arteriis serosum excrementum excipiunt: ad Renes enim non majores solum venæ, quarum aliæ in cavitatem hanc inferuntur, aliæ in membranā, quā eos tegit sed me-

tius

tus etiam capillis modò exiles deferuntur. Renes siti, paulò altius quàm illa, à quibus duo urinarii meatus emergunt, per quos ad vesicam urina deducitur. Renum operatio est, secernere, & percolare serosum excrementum, à sanguine. lib. de ren. aff. dign. cap. 1.

Repanditas. Vide Obstipitas, Quassatio, Cyphosis.

Repercutientia. Vide Attrahens.

Respiratio, & Respiratus. Vide Inspiratio, & Transpiratio.

Resolutio nervorum, est deperditio motus, cum prius in aliqua corporis parte, non autem semper sensus; si enim deperditur sensus, dicitur sensus resolutio. 3. de loc. aff. 10. Licet ejusdem capituli initio, dicat: Ubi omnes pariter nervi tum sensum, tum motum amiserint, Apoplexia hac affectio appellatur; ubi verò alteri laterum soli, aut dextro, aut sinistro id accadat, resolutio, ejus scilicet partis, in qua consistit affectio, interdum dextra, interdum sinistra; quòd si in aliquo membrorum idem eveniat, ejusdem membri resolutio, Græcis paralytis esse dicitur. 3. de loc. aff. 10.

Resolutus oculus, qui naturali motu destitutus, neq; sursum, neq; deorsum moveri potest, verum sensus expers sit: frequenter id mali partibus etiā oculi accidit. l. Introd. c. 15.

Restitutio, est osis vel membri in propriam sedem collocatio, reductio, & repositio. 3. de fract. 38.

Rete. Vide Omentum.

Retentrix facultas. Vide Attraatrix.

Retiforme corpus, est tunica, aut tunica quid simile, humorem vitreum oculi ambiens, ex Cerebri portione, aut verius ex nervo optico supernè descendente atq; amplifi-

plificato conflatum, reti simile, quod ipsum corpus, cum à Choroide, i.e. tenui Cerebri tunica, quæ illi supernè demittitur, continetur, proin tunica oculi, choroides, i.e. secundina nominatur. 10. de us part. c. 2. Vide Choroides.

Retiformis plexus. Vide Flexus variciformis, & Amphiblestroide.

Retina, est panniculus, vitreum humorem oculi circumdans ad instar rete: cui annectitur alius, qui dicitur secundina, quodd secundina sit similis, juxta quem tertius est, qui ossa contingit, durus & solidus, undè scleròs dicitur. lib. de ocul. cap. 2.

Reversiva febris nominatur, quæ non est acuta, sed diuturna, & imperfectas habet solutiones, erroneasq; accessiones. com. 2. in 6. de morb. vulg. 21.

Revulsio, est evacuatio alienæ materiæ per loca opposita. Vide Purgatio, & Derivatio. Est autem revulsio faciendâ, deorsum quidem; ubi succi ad superiora feruntur; sursum, ubi ad inferiora vergunt: & ubi introsum, ad exteriora; ubi extrosum, ad interiora: ubi dextrorsum inclinant, in sinistrum; si sinistrorsum, ad dextram revulsio faciendâ. Sic ergo fluxiones, quæ retrò inclinant, in priora revellendæ; quæ in priora, in posteriorem regionem abducendæ sunt. lib. de Hyrudin. c. 2. & lib. de Derivat. cap. 19. Motum hunc Græci Antispasin vocant. Vide Antispasis, Derivatio, Purgatio.

Rhabdoides futura, eadem est ac recta capitis sutura. Vide Obelæa.

Rhachiræ, aut Rhachice, sunt dorsales musculi. 4. de anat. adm. c. 6. & 7. aph. 36. Undè Rhachitis medulla, i.e. spinalis medulla, quæ & Rhachis spina dicitur. Vide Dorsum, Medulla.

Rha-

Rhacodes, i.e. lacerosa, dicitur universa cutis, erosa instar laceræ vestis, à pure circa abscessum aggregato sufficienter extenuato: idq; accidit, ubi qui ad abscessum perveniunt tumores, tardè secti fuerint, aut ob medicantium imperitiam, aut eorum, quibus medela adhibetur, timiditatem, qui secari non patiuntur, sed expectant, ut longiori tempore cutis à pure rodatur. 2. ad Glauco. 8.

Rhacosis, i.e. detritio, multa scroti extensio est. lib. finit. med.

Rhagas, i.e. scissura, fissurave, divisio est labia obtinens, callo obdurata, dura. lib. finit. med.

Rhagades, sunt rugæ ani intumescences, rimæq; ac fissuræ sedis, i. de comp. med. loc. cap. 8. quæ & rimæ ledis dicuntur, non aliter quàm labra, quandoq; & manus, ex vehementi frigore, fissæ conspiciuntur.

Rhages, dicuntur extremi digitorum fines, qui Græcis ραγες vocantur.

Rhagois tunica, aliàs cœrulea, uvea, & uviformis dicitur, est oculi panniculus, albugineum humorem tangens, & circumdans, nigri coloris; undè uvea tunica, ab uvarum colore, dicitur: post quem est alius panniculus, cornu similis; undè Ceratoides, i.e. corneus appellatur, juxta quem est tertius non circumdans alios, sed eos inter se jungens, quem Conjunctivam vocant, & Adnatam; sive Agnatam. Inter crystallinum autem & albugineum est tela aranea. lib. de ocul. cap. 2. & lib. Intrad. cap. 11. & 10. de usu part. cap. 4.

Rhappe, i.e. sutura, commissura, syntaxis serrata. Vide Commissura.

Rhegma; i.e. ruptum, est solutio continuitatis in vase: ut, Fractura in osse; Convulsio, seu Spasmus in nervo; Apopsa-

Apospasmus in ligamentis ; *Tblasma* in musculis ; ita *Rhegma*, in vasis, ex violento ictu, vel gravi casu, vel alio quopiam valente motu excitata, est unionis solutio. 4. meth. 1.

Rhetidosis, i.e. oculi tabes, & corrugatio. 3. meth. 2. Vide *Tabes oculi*.

Rheuma, i.e. fluxio, & humorum decubitus. 1. de comp. med. per gen. 4. Vide *Fluxio*.

Rheumaticus vocatus affectus provenit, quando toto videlicet corpore infirmo, & cachectico, principibusq; partibus (paulum licet ipsis insit sanguinis) gravari solitis, noxios humores, illa ad carnosas cutis partes protrudunt, potissimumq; ad adenas, excipiendis recrementis idoneas, tum ob substantia laxitatem, tum quia omnium partium minime robustas habent naturales virtutes, sicut & pinguedo; partes enim infirmiores omnium prima excrementitiiis morbis corripuntur. lib. de cur. rat. per sang. cap. 8. Fluentibus vero humoribus, *Rheuma*, seu *Fluxio* dicitur; cum vero in aliqua parte iidem illi constiterint, is affectus, qui inde generatur, *Rheumaticus* appellatur. 2. ad Glau. cap. 2.

Rhexis, i.e. ruptio, ab ictu, vel alia quâpiam causa violentâ in alto, totas subinde membranas dividens, & persæpe humores, quibus videndi facultas administratur, effundens. lib. Introd. cap. 15.

Rhodinum. Vide *Oxyrhodinum*.

Rhodomeli, i.e. mel rosaceum, quod aliquando simplex, interdum purgatorium paratur.

Rhoeas, sive *Rhyas*. Vide *Encanthis*.

Rhogme, est osis ruptio sive interruptio, per superficiem recta, vel angusta, vel lata. lib. finit. med.

Rho-

Rhopalosis, concretio est summorum pilorum indivisibilis, cum inhibito ipsorum incremento. lib. finit. med.

Rhus, πῶς ῥυαία, fluxus muliebris, seu profluvium fœminarum, propriè apud Medicos significat menses albos decolores, fluente sanguine assidue penè & inordinate per uterum: longèq; diversa fluxio est ab eâ, quâ fluit sanguis per uterum, mensuris periodicis; cum illa præter naturam sit, hæc verò secundum naturam.

Rhyas, est oculorum vitium, quando meatus, qui ab oculis in palatum definit, vel obstructus, vel connivens, excrementa, non ad loca consueta transmittit, sed in oculos regurgitare permittit. com. 2. in 6. de morb. vulg. 32. Vide *Rhoeas*, & *Encanthis*.

Rhypodea medicamenta sunt, quæ à sordium similitudine, quasi strigmentosa nominantur. 2. de comp. med. per gen. cap. 1.

Rhyprica sive extergentia medicamenta nominantur, quæ in superficie, sive in cute, sive in ulceribus sordem auferunt; quæ verò altius poros ab excrementis suis repurgant, ea *Ecphrastica*, & *Eccathartica* (quasi expurgantia, & ab infarctu liberantia dicas) appellantur. 5. simplic. 12.

Rhythmus in pulsu, est proportio temporis ictus, ad tempus quietis. 1. de differ. puls. cap. 7.

Rigor, πῖς, est infiri caloris exagitatio, cum sensu doloris subita, & universim facta. lib. de tremor. convuls. cap. 6. Nominatur etiam *Rigor*, Nervorum convulsio, & *Tetanos*. 3. de loc. aff. 10. Est autem propriè sic dictus, convulsio & commotio inequalis totius corporis, à tenui & magis acri, copiosioriq; humore, quàm qui in horrore pectet. 3. de san. tuend. 5. & 1. de sympt. caus. 8. Vide *Frigus*.

U

Rigor sine febre, nonnullis quidem accidit semel, nonnullis autem per vices interpolatas multorum dierum interjecto spatio, vel à principio usq; ad finem continuatur; aut est ita omnino exiguus, ut neq; adesse videatur, cum se quieti tradiderint, sed cum moveri coeperint, tunc demum eum sentiunt; aut etiam sine motu molestus, accidit pituita humore redundante, sed non putrescente; quando autem hic humor etiam putruerit, non modò rigent, sed etiam febricitant aegri. 2. de differ. febr. cap. 5.

Rob. Vide Succum medicatum.

Ros, tertia est humiditatis species, unde partes nostri corporis nutriuntur, quæ continentur in omnibus animalis partibus, ceu ros quidam, per earum substantiam sparsus. 7. meth. 6.

Rotula. Vide Pateilla.

Rubra bilis. Vide Bilis pallida.

Ructus, est flatûs excretio per gulam: cum & alius sit, qui per intestinum rectum secernitur. comm. 5. in 6. de morb. vulg. 4.

Ruptura. Vide Unionis solutio.

S

SACCU S. Vide Cæcum Intestinum.

Sacer morbus (ἱερά νόσος, i.e. Epilepsia) dicitur, quod ejus magnitudo designetur, sacrum enim apud Antiquos significat magnitudinem. Alii verò sacrum dici putant, quod divinus esset, & à diis in peccatorum vindictam mitteretur: quos Gal. reprehendit, lib. 2. de caus. sympt. cap. 3.

Sacer ignis, i.e. Erysipelas. lib. de purg. med. fac. Licet Celsus, ignem sacrum, prævum ulcus existimat dici.

Sa-

Sacrum os. Vide Dorsum.

Sagittalis sutura. Vide Obelæa.

Salsa pituita est, quæ ab alieno calore computruit, 2. de natur. fac. cap. 9. & salsa redditur, aut propter putredinem, aut propter salis humiditatis serosa admisionem. 2. de differ. febr. cap. 6.

Salvus, Palpitatio, & Palmos dicitur. 2. meth. 2. Vide Palpitatio.

Salvatella vena, est ramus vena axillaris, media percurrentes intermedium digitum manûs, & auricularem. 3. de anat. adm. cap. 5. & lib. de anat. viv.

Salubre corpus, simpliciter est, quod ab ipso Natura ortu bonam habet temperaturam, in simplicibus & primis particulis, atq; in iis, quæ ex illis componuntur, instrumentis est probe conformatum & commensuratum. lib. artis med. cap. 4.

Sanguificatio, Hæmatosis, est mutatio alimenti in sanguinem. lib. finit. med. Vide Attractrix, & Hepar.

Sanguifluas venas, eas appellat Hippocrates, quæ magnæ sunt, quibus ruptis, insignes sanguinis eruptiones contingunt: id quod ex parvis evenire non consuevit; nam & paucus ex hujusmodi sanguis effunditur, & citò ad oras ipsas divisas coalescit, nec nocumentum affert. 2. de fract. 24.

Sanguinarium medicamentum (aliàs & glutinatorium, cruentis opitulans, Græcis Enæmon dictum) est, quod vulneris oras committere & glutinare molitur. 3. de compos. med. per gen. cap. 2. Vide Glutinatorium.

Sanguineus Cordis Ventriculus, dexter ipsius est ventriculus, per cujus orificium unus sanguis in Cor intro-

mittitur, per alterum autem, sanguis ex ipso in pulmonem deducitur: alius Cordis ventriculus sinister, spirituosus nominatur, per cuius prius quidem orificium, Cor iis, quæ in pulmone sunt, arteriis; per posterius autem, omnibus, quæ per totum animal sunt diffusæ, arteriis Cor est continuum. 6. de usu part. 7.

Sanguis, nunc sumitur pro omni in venis concluso succo, (pituita scilicet, utraq; bile, & tenuibus serosisq; liquoribus) nunc pro quarta substantia, è directo reliquis humoribus opposita, quæ propriè sanguis dicitur, & è cuius exuberantia tota massa nominatur. comm. 4. in 6. de morb. vulg. 29. & comm. 2. in 6. de morb. vulg. 38. & lib. de multitud. cap. 10.

Sanies. Vide Sordes.

Sanitas partium simularium, est calidi, frigidi, humididi, & sicci symmetria: dissimularium verò, compositio, numerus, magnitudo, figura conveniens. 1. de sanit. tuend. cap. 1. & 4. & comm. 2. in 1. de morb. vulg. 3.

Sapa, alius Siræon vocatur, est mustum plurimum coctum. Sunt qui & ficuum siccarum decoctum ita nominant. lib. de attenuante dieta, cap. 12. Vide Apothermus.

Sapharum, Avicenna & Plinio manantia capitis ulcera nominantur, Græcis ἀρχαῖα, & νήλαι, Halyabbas tineam, sub quo & ficus, & ῥοδία, & ἑσάνθιστος collocavit, nominat.

Sapor. Vide Chymus.

Saphæna vena est, quæ desuper ad partem cruris intimam descendit, quæ descendendo occultatur, donec partem super malleolum internam attingere incipiat. lib. de anat. viv. Vide Malleoli vena.

Sarcocele, σαρκονίλη, est morbus testiculis induratis

con-

veniens: quodd si aquosus humor in tunicis, quæ circa testiculos sunt, aggregetur, Hydrocele; omentum autem & intestina quodd si eadem in loca illabuntur, Epiplocele, & Enteroccele dicitur. lib. de tumor. cap. 15. Sarcocele verò simpliciter Ramex dicitur, quam aliis proprio magis nomine Cirlocele nuncupant. 14. meth. med. 17.

Sarcoma, est carnis in naribus aut aliis partibus præter naturam auctio, differens à Polypo magnitudine & substantia. lib. finit. med.

Sarcophalon, incrementum carnis est præter naturam in Umbilico. lib. finit. med.

Sarcosis in utero, est carnis ibidem prognata & collecta expullulatio, quam, si magna sit, recidere convenit, vellicatam scalpri, quod celerius emoriatur; sin' parva, protinus tollere. lib. finit. med. Videtur proinde aliud nihil esse quàm mola.

Sarcoticum medicamentum est, quod carne ulcus adimplet. 3. meth. 2.

Satyriasis, & Satyriasmus. Vide Priapismus, & Elephas.

Scabies. Vide Psora.

Scabies oculi, est summarum genarū, angulorumq; oculi erosio, cum pruritu, quam acerrima fluxio progignit. lib. finit. medic.

Scalpella. Vide Laminas.

Scalptus, idem quod frictio, motusq; per ungues effectus, quod in prurientibus particulis animalia naturaliter faciunt, idq; in ipsis omnibus reperitur. comm. 5. in 6. de morb. vulg. 4.

Scamnum Hippocraticum. Vide Hippocraticum scamnum.

Scaphoides, i. e. os naviculare, sive naviforme, est os profundo sinu excavatum, Tali caput anterius & oblongum excipiens: dictum à scaphæ similitudine; cavitatem enim habet oblongam, scaphæ similem, in quam simile caput Astragali, seu Tali, intra se admittit. Vide Cubiforme.

Scapulæ, alias Omoplatæ, sunt ossa in dorso post thoracem sita, cum osse occipitis, spinâ thoracis, costis, & osse, quod gutturi præjacet, musculorum operâ copulata. lib. de ossib. cap. 14. & lib. Introd. cap. 10. Vide Omoplatæ.

Scarificatio, est cutis incisio. lib. de cucurbit. cap. 4. Vide Encharaxis.

Sceletos, quasi cadaver asiccatum, est ossium humani corporis invicem coherentium universarum, universa compactio. lib. de ossib. in præf. & 1. de anat. adm. c. 2.

Scelos, crus, pars est corporis organica, à coxendice ad inum pedem protensa, præcipuum ambulationis instrumentum, cui innitimur: dividitur in femur, tibiâ, & pedem parvum.

Scelotyrbe, quasi cruris turbam, aut perturbacionem dicas, species est resolutionis, quâ erectus ambulare homo nequies, latus quandoq; sinistrum in dextrum, nonnunquam dextrum in sinistrum circumfert; interdum quoq; pedem non attollit, sed attrahit, velut ii, qui magnos clivos ascendunt. lib. finit. med.

Sceptica, est illorum Medicorum schola, qui nihil sciri posse dicebant, atq; in singulis rebus hærent, atq;itant. libell. de subfig. emp. cap. 1.

Schesis, i. e. dispositio, est adventitius corporis habitus, qui facile discutitur, ut calefactum in Sole lignum: oppositum ei affectioni, quæ agrè solvitur, lignum E. G. quod igni

ea

catenus excalescendum est, ut jam accendatur, & fumum edat. 8. meth. cap. 1. & 3. de caus. puls. cap. 10. Vide Afectus.

Schetica febris est, quæ facile discutitur; e contra Hæctica, quæ difficulter solvitur. 8. meth. 1.

Schetron, exquisitum victum vocat Hippocrates; Phaulon autem, victum simplicem, vulgarem & exquisitum; medium autem, Hypophaulon, i. e. subvulgarem. 1. de fract. 45.

Schidacedon, est divisio per longitudinem facta, conveniens fractis ossibus, quæ non omnino separantur à se invicem, sed veluti per rectitudinem finduntur: veluti Cauledon, divisio per transversum facta. 6. meth. 5.

Scindapfos. Vide Piruita.

Scirrholis, est livescens & crescens caro, ex vehementiâ inflammationis orta. lib. Introd. cap. 15.

Scirrhus, tumor est durus, qui sine dolore, non tamen omni sine sensu est; talis enim sanabilis non est. Sunt, qui eos duntaxat tumores præter naturam, qui omnino insensibiles sunt, scirrhos appellandos censent, reliquos non scirrhos, sed scirrholos tumores. 14. meth. 6. Exquisitus verò scirrhus nominatur, qui omnino durus, sensuq; privatus est; qui verò non omnino insensibilis, & difficulter sentit, ex humore lento, & crasso, qui partibus, quæ indurantur, tenaciter insiguitur, non-exquisitus. 2. ad Glauc. 4.

Scleriafis, i. e. durities, est tumor palpebræ cum rubore & dolore, difficile tollitur, & durat magis, quàm inflammatio. lib. Introd. cap. 15.

Sclerintica, i. e. indurancia medicamenta, quæ duritiem corpori inducunt: quod tribus auxiliis præ-

statum, congelatione, siccitate, & repletione tensioneq.

Scleroma, durities, tumor est duriusculus, qui in parte vulva aliquā nascitur, fitq. plerumq. ex phlegmonis, quæ diu permansit, induratione. lib. finit. med.

Sclerophthalmia, i.e. dura lippitudo, in quā oculus durior, ad motum pigrior, dolens, rubicundus redditur, palpebraq. similiter duriores solito siccioresq. redditæ, post somnum aperiri facile non possunt, ut nec inverti, propter duritiem; differt a Xerophthalmia, solā magnitudine doloris, duritiæ, & siccitatis, quod hæc sit illā imbecillior longē.

Scleros tunica. Vide Retina.

Scoliosis. Vide Obstipitas, Cyphosis.

Scoptulæ. Vide Omoplatæ.

Scotodinos, h.e. tenebricosa Vertigo; cum enim caput circumagi videtur, Dinos, sive Vertigo nuncupatur; cum insuper & tenebricosa fuerit visio, Scotodinos, h.e. tenebricosa Vertigo appellatur. Porro, ob inordinatam spiritus flatusi motionem, qui vel in capite primam suam habet generationem, vel sursum ex infernis fertur partibus. 4. acut. 42. Est ergo Scotodinos, seu tenebricosa Vertigo, quando simul res conspectæ videntur circumvolvi, & sensus visus repente obscuratur, & egrotus, sibi tenebras circumfundi, opinatur. 4. aph. 17. Idem affectus & Scotomia, & Scotoma, & affectus scotomaticus appellatur; ex quā ipsa appellatione, qualis sit, apparet, quippe à parva occasione hebetantur ii, qui sic laborant, adeo, ut interdum cadant, maximè si aliquando in gyrū rotentur; sive aliū quempiam rotari viderint; sive rotā, aut id genus aliud quippiā, ipsosq. adeo, quos vocant, in aquis vortices, circumagi viderint. 3. de loc. aff. 8.

Scot

Scotomia, Scotoma, Scotomaticus affectus. Vide Scotodinos.

Scrofulæ, aliàs Strumæ Chærades, Parotides, & Eparmata dicuntur, sunt apostemata secus aures. lib. de med. facil. par. cap. 11.

Scrotum, est tunica crassissima, extrinsecus testiculos ambiens. lib. Introd. cap. 10. Vulgò Bursa testium dicitur.

Scutiformis cartilago. Vide Cricoides.

Scybala excrementa, sicciora, & quasi in nucleum formata, combusta scilicet à visceris phlegmone, sunt ne-
εὐτὶς ὡς ἄλ. 4. acut.

Scypho. Vide Choana.

Scyros, i.e. Callus, & Porus.

Scytalides. Vide Digi.

Sebum, sive sebum, est oleosa & pinguis substantia, adipe siccior, & magis concreta compactaq. ejusdemq. interim cum adipe generis, (utrumq. enim sanguis est coctus, ex nutrimenti bonitate) nisi quod sebum fragile usquequaq. sit, nec igni admotum tam facile liquecat, & cum refrigit, denud concrecat: pinguedo autem liquidior sit, minimeq. apta durari, oleo longā vetustate in-
crassato similis, ut equi, & suis.

Secundiformis tunica, Græcè Choroides. Vide Choroides.

Secunda, sive Secundina. Vide Chorion, Retina, Retiforme.

Secundum naturam fieri dicitur, quod primā ratione à natura sit, & quasi finis ab eā intenditur, non quod ex consequitione quadam aliis succedere consuevit; talis motus secundum naturam est, cum ex se aliquid insitāq. naturā suā moveretur: ut, motus Cordis, qui in pulsibus sit, est

operatio, & ea quidem secundum naturam; qui verò in palpitationibus fit, is & à Corde fit, sed p.n. à causis morbidis exagitato; unde etiam palpitatio affectio est, & ea quidem p.n. 6. de placit. c.1. Præter naturam autem omne est, aut affectus, à quo functio ladicur, aut causa horum, aut symptomata: 3. de præag. ex puls. cap.1. differt q. ab eo, quod est non naturaliter se habere. 8. meth. 9.

Sedes. Vide Unionis solutio.

Sedimentum, est id, quod in urina parte infimâ subsidet. lib. de urinis, cap. 16. Quod si ad supremam superficiem terminatur, dicitur Nubecula; si ad mediam regionem, Suspensum; si profundiori parte, inferioremq. occupet locum, Hypostasis. Ibid. cap. 21.

Semen, ex Aristotele, est quadam pars utilis excrementi, à quo, & ex quo singula ferus membra efformantur. 1. de sem. cap. 14. Alii Semen nihil aliud esse dicunt, quam sanguinem à venis, quæ ipsum continent, exquisitè confectum. 2. de sem. cap. 2. & 1. progn. 42.

Semicoctos humores appello, qui à ventriculi calore alterationem perpeßi, nec tamen perfecte ab eo superati fuerunt. 4. simpl. 15.

Seminarii meatus. Vide Parastatæ, & Glandulosi assistentes.

Semeiotice, h.e. adnotatrix Medicina pars est, quæ de signis salubribus, insalubribus, & neutris agit, curationi morborum, per victum, summè necessaria, præterita, præsentiaq. symptomata ad morbi causam inveniendam, & ad præagendum, diligenter inspicies. lib. Introd. cap. 3.

Semisyderatus homo. Vide Syderatio.

Semitertiana, *intermittens*, febris est, quæ ex quotidiana continua, & tertiana intermittente fit: 2. de diff. febr. cap. 7.

cap. 7. ubi sequentem in modum de hæc febris loquitur: Frequenter febris secundum suam ipsius naturam, ex intermittentium genere est, ut tertiana, complexus autem quotidianæ febris, nullum integritatis tempus, priori circuitui relinquit, dum secunda accessio, antequam prior absolvetur, invadere anticipet; hanc ego febrem, compendiosa claræq. doctrinæ gratiâ, uno volens appellare vocabulo, imposui ei nomen Semitertianæ. lib. de morb. temp. cap. 8. Sanè nonnulli ajunt, Semitertianam ita nominatam fuisse, veluti semicirculum, ipsam tertiani circuitus dimidio minorem esse asserentes. Alii dicunt, Semitertianam appellatam fuisse idem, quod dimidio tempore tertianam superet: ut, si tertiana accessio ex duodecim horis componatur, semitertiana ipsas duodecim horas tertianæ in sese comprehendat, cuiq. dimidium duodecim horarum addat, universaq. simul evadant duo-de-viginti. lib. de Typ. c. 4.

Senecta serpentum, est crassissimus quidam lentor, & velut membrana, ex diuturna latitationis mora, hyemis tempore, sub cavernis terra contracta, temporis longitudine potius, quam senescentis ætatis vitio, facta. lib. de Theriac. ad Pison. cap. 13.

Senes, à Decrepitis nonnulli distinguunt, nomen seniorum ultimæ ætatis tribuentes, senes autem in priori ætate statuentes, quæ media est inter juvenes & seniores. Aliquando senes vocat Hippocrates eos, qui extremam agunt ætatem. 3. aph. 31. Estq. id, quod proprie omnes homines senectutem appellant, non aliud, quam siccum, & frigidum corporis temperamentum, annorum multitudinis ratione comparatum. 5. de tuend. sanit. cap. 9.

Sensifici nervi. Vide Nervi sensifici.

Sensus indigentia, est sensus tactus exquisitissimus, soli

soli ventriculo, & maxime ori ejus superno per conjugationis sexta nervos molles, conoessus, ad cibum sumendum animal ipsum excitans & stimulans, 4. de usu part. cap. 7. qui fames nuncupatur. lib. 5. cap. 8.

Sensus vitiosus est omnis, qui perperam obitur & oblesus est, quando scilicet proprium sensibile non aut omnino sentitur, vel cum vitio sentitur, vel diminute, aut depravate, & sub specie peregrina percipitur; ut, in auditu surditas, auditus gravitas, obauditio: in visu cecitas, visus obscuritas, & depravationes quadam. lib. de symptom. differ. cap. 3.

Sepedonodes, putredinosos, Græci vocant eos, qui ad putredinem sunt proni & dispositi. 8. meth. 7.

Septa, quæ & Septica medicamenta dicuntur, sunt omnia, quæ tum eliquare, tum colliquare, ac potissimum carnem tenellam consumere ferè absq; dolore possunt: hujusmodi sunt, Arsenicum, Auripigmentum, Sandaracha, Chrysocolia, Aconitum; vocantur Septica seu Putrefactientia cum putredine: symptomatis autem similitudo, ut sic appellemus, efficit; inter hæc autem numerantur & Cathæretica, h. e. detractoria, quæ extrinsecus solummodò superficiem, quam tetigerint, detrahunt & consciunt, neq; in altum subire corporis & savire valent: ut, Alumen, Galla, Omphacium, Aes combustum lotum. 5. simpl. 15.

Serapium, vocat Actuarius potionem, quam hodie Syrupum nominant: sic verò vocant, quando medicamentosi succi & liquores cum melle vel saccharo, donec concreverint, coquantur. Dividunt Sepiasarii Syrupum in brevem & longum: brevem, quod parum aquei humoris in se habet, appellant alio nomine communem: vocant longum, quod humoris aquei multum obtineat, nominantq;

nantq; aliàs decoctum; quin & dividunt in communes & magistræles.

Septum transversum. Vide Diaphragma.

Serosum recrementum. Vide Ochima ῥερός.

Serpigo. Vide Herpes.

Selamoidea ossa, a sesami leguminis minuti specie sic dicta, quæ multis manuum & pedum articulis, natura ex abundanti, velut auctarium circumponit, securitatis gratiâ. 2. de usu part. cap. 12.

Sesilis verruca. Vide Formica, & Myrmecia.

Sextans, pendet uncias duas; sestarius, uncias tres. 4. de comp. med. per gen. 14.

Sicca & valida frictio est, quæ corpori foris adhibetur, ad curandam quodammodo lassitudinem, nullo humido, aquâ videlicet, vel oleo, foris corpori circumfuso. 2. simpl. 25.

Siccus hydrops. Vide Hydrops Tympania.

Sief. Vide Collyria.

Sielismus, est saliva copiosissima in os affluxus, sive ab humidiori capite in glandulas, ad radicem lingue sitas; sive à Ventriculo, multâ pituitâ redundante, quæ ex eo secundum gulam in os prorepit & resluit multaties, etiam absque vomitu. 8. de comp. med. loc. cap. 4.

Sigmoides apophysis, dicitur processus unus Omoplate, quod instar antiquæ Græcorum literæ C cavius sit: aliàs Ancyroides & Coracoides appellatur.

Sigmoides membranæ, seu cartilagine, sunt tres tunica, quæ in vena Cordis arteriosa orificio videntur, (quæ pulmonem alunt) intus foras spectantes, quas à figura Græcæ literæ Σ, sigmoides appellarunt. 6. de usu part. cap. 14.

Sigmoides quoq; dicuntur, cartilaginum aspera arteriæ, extre-

extremæ partes, quæ literæ Σ figuram referunt. 4. de loc. aff. 6. Vide Cricoides.

Signa iudicatoria. Vide Decretorius dies.

Significatio febris. Vide Insultus accessionis.

Signa aliqua mala sunt, cum ut signa, tum ut causa: ut signa quidem, quoties ex difficilioribus sunt affectionibus; ut causa verò, quoties ipsa rursus alias committunt & concitant pravæ affectiones, pessimaq; inducunt symptomata. 2. prognost. 49.

Sima Hepatis pars, est concava ipsius pars, quæ ex parte prodit vena porta; per cuius furculos, nimirum Mesaræi venas, alimentum à ventriculo, primisq; intestinis jecur attrahit: cuius opposita pars, convexa & gibba nuncupatur. 4. de usu part. cap. 13.

Similare membrum (quod & simplex, homogeneum, & prima corporis particula, quæ ex primis constat elementis, & ex quâ partes organica conflata sunt) est, cuius quamcumq; partem sensibilem sumpseris, erit illa toti similis in nomine, & definitione, sicut os & caro. lib. de anat. viv. Cuiusmodi sunt etiam arteria, vena, nervi, ossa, cartilago, ligamentum, membrana, caro. lib. de morb. differ. cap. 3. Vide Instrumenta.

Simiolis. Vide Annotatio.

Simplex morbus. Vide Compositus.

Simplem febrem vocat Hippocrates, quæ mitis est, & cum signis tuis cumprimis: sic dicitur febris ephemera. 1. de cris. 16.

Synapismus, est medicamentum vehementer calidum ex synapi compositum, capiti conveniens. 3. de loc. aff. 4.

Synciput, est anterior capitis pars, supra frontem sita, capillis interfecta. lib. Introd. cap. 10. Vide Bregma.

Singul-

Singultus, $\lambda\omicron\gamma\zeta$, est convulsiva quadam oris ventriculi affectio, quoties illud ex humorum copiâ vel gravatur, vel morderetur, vel propter frigiditatem contristatur. com. 1. in 1. prorrhæ. 23. Accedit etiam ex immoderata inanitione. 4. acut. 69. Non autem Singultus est vera convulsio, ut potè quæ in solis musculis accidit; ventriculus autem nec musculus est, nec ejus os. 3. de caus. sympt. cap. 2.

Singultuosa febris est, in quâ per singultum, rodens acerrimusq; humor vomitû rejicitur, a quo tamen symptomate febrientes sunt liberati: verum febris huiusmodi nequaquam singultuosa dici debet, nisi singultus per totum morbum, simul cum febre, agrum excruciarit. 4. acut. 69.

Sinus, aut Vomica, est solutio continuitatis in carnosâ parte: fit cum sanguinis in mediam regionem, partium inanem & porosam, affluxione: id quod abscessui, & sinui commune est; pars affecta, in exteriore summitate occlusa, os nullum habet, & abscessisse ipsa dicitur à subjectis partibus, cum ejusmodi in ipsam quadam sit fluxio: affectio verò abscessus propriè, sive apostema vocatur; at ubi aliquâ ex parte aperta est, ut, qui continetur, humor inde excernatur, non amplius abscessus, sed sinus jam appellatur. 2. de his, quæ in medic. 27.

Sinus rectus appellatur, cuius os, in inferiore parte, fundum, in superiore est: obliquus, cum in latus declinat. Fiant contrario etiam modo sinus, quibus deorsum fundum, sursum verò os vergat; quibus neuriquam fundum, quò facilius saniei exitus pateat, aperimus. 2. de his, quæ in medic. 28.

Sinus vulvæ. Vide Cornua uteri.

Sirialis, est inflammatio Cerebri, & membranarum ejus, quam consequuntur syncipitis & oculorum cavitas,

tas, febris ardens, pallor, totius corporis siccitas & inappetentia.

Siræon. Vide Apothermus.

Sitis, Græcè *δίψα*, est appetitus frigidi & humidissimi alimenti. lib. 1. de caus. sympt. c. 3.

Solidas corporis partes, vocant Medici ossa, cartilagineas, ligamenta, tunicas, musculos, membranas, nervos, arterias, quas particulas, elementares, similes, & simplices appellant. 1. de natur. fac. cap. 7.

Solutio morbi, simpliciter est illa, in qua vel virtute, vel morbo sensim emoriente & devicto, vel morbus, vel vita finitur. 3. de cris. 1.

Solutus, est & dicitur Paralyticus, qui laxatos habet articulos. 5. de compos. med. per gen. cap. 2.

Sopientia. Vide Anodyna.

Sopor, alias Coma, propensio delatione in somnum est, cum vigilare agri nequeunt, non habentes apertos oculos, sed conniventes, alto somno, vel tenui, quin & vigiliis detinentur; idque accidit, vel humectata plus nimis ea parte Cerebri, quæ sensus fons est, ut in ebriis, vel ejusdem intensissimum ob solum frigus; aliquando ob utrumque, quin & propter virium imbecillitatem adeo jam emorientium, ut apertas palpebras, moribundi, servare nequeant. comm. 1. in 3. de morb. vulg. 7. Vide Caros, & Coma.

Soporariæ arteriæ, vulgò Carotides dicuntur, sunt duæ illæ, quæ ab arteriâ magnâ sursum ascendente, postquam ex Thorace exiens, ac claviculas transgressa, in medium jugulum pervenit, generantur. 1. de placit. c. 7. Vide Carotides.

Sordes, crassius nutritionis excrementum est; in ipsâ enim carnis generatione duplex excrementum provenit, quod

quod omnem qualitatis alimenti mutationem superat: alterum crassius, alterum tenuius: quod tenuius est, ipsa est insensibilis perspiratio; quæ etiam subinde fit visibilis, quoties vel naturalis calor languet, vel nutrimento utitur, quàm justum sit, ampliore, vel motus quispiam vehementior animali contingit; alterum crassius, sunt ipsæ sordes, quæ in summo corpore nostro colliguntur. Quin etiam in ulceribus, tenue excrementum, sanies, Græcè *Ichor* appellatur; quod crassum est, sordes: ex priori excremento, ulcus humidum redditur; ex crasso, sordidum. 3. meth. 3. Vide Ichor.

Sorici cauda, sive Soricinus. Vide Myurus.

Sparganosis est, dum ob lactis redundantiam, mamille tumefactæ sic distenduntur, ut copiam hanc vix ferre queant. lib. 2. ad Glauc. cap. 2.

Spasma. Vide Rhegma.

Spasmus, i. e. Convulsio, musculi est ad suum principium contractio. Vide Convulsio. Inde Spasmosus affectus, i. e. Convulsivus, qui in suo principio, aut non multo post, quàm fieri coeperit, convulsionem accersit. comm. 3. in 1. prorrh. Sic convulsivum affectum appellant, qui ante mortem necessarium, convulsionis aliquod periculum inducit. 1. de prasag. ex puls. Spasmosus autem pulsus, sive convulsivus pulsus, est inæqualis in unâ pulsatione, & diversis arteriæ partibus, & ejusmodi quidem, in quo utrinque, ab extremis retrahi, tendi, convelli, arteria videtur, in modum chordæ tensæ.

Spasmus oculi. Vide Mollities.

Spata, vulgò Spatula, instrumentum est, quo Pharmacopola, confecturas in cacabo, seu mortario movens. 1. de comp. med. per gen. c. 4.

Spathomela. *Vide* Laminas.

Sperma, Spermatice arteriæ, Spermatice venæ, Spermatici pori. *Vide* Semen, Glandulosi assistentes, & Parastatæ.

Sphacelare, Hippocr. in lib. de fract. & artic. idem est quod corrumpere: Sphacelus autem est corruptio substantiæ uniuscujusq; partis, quæ sphacelari dicitur. Partis carnosæ autem interitum, ex magnitudine inflammationis, propriè Medici Gangrenam nominant. 7. aph. 50. Sphacelon, in specie etiam vocant ossis cariẽm. 14. meth. 17. Sphacelos vocem sunt qui dicunt, vehementem dolorem declarare; alii inflammationis excessum tantum, qui partem ad corruptionis periculum deducit. 2. de loc. aff. 7.

Sphacelodes Hemicrania, i.e. alterius capitis partis convulsorius dolor. 2. de loc. aff. 7.

Sphacelon. *Vide* Sphacelare, & Syderatio.

Sphæromata. *Vide* Narem.

Sphage. *Vide* Anticardion.

Sphagitide, i.e. venæ jugulares. 5. meth. 4.

Sphenois os (quod & Polymorphum appellatur, lib. Introd. cap. 12.) est, quod ad cunei similitudinem, ex utroq; latere Calvariæ, ad palatum tendit, superiorem maxillam constituens, cujus ossis apophyses utring; concavæ, ab alarum similitudine, Pterygodes nuncupantur. lib. de ossib. cap. 1.

Sphincter, quasi constrictor, seu constrictorius, musculus constringens orificium recti intestini, & vesicæ urinarie. 6. de anat. adm. cap. 4. *Vide* Rectum Intestinum.

Spicilla. *Vide* Laminas.

Spina, est omnium vertebrarum, quas spondylos vocant, basis, compages & structura: sumitur etiam aliquan-

quando pro medulla spinali. 3. de loc. aff. 10. *Vide* Dorsum, Myelon, & Medulla spinalis.

Spirationem naturalem, appellat Hippocrates spirationis facilitatem, quæ neg; Thoracem, neg; Cor, aut Pulmonem, neg; Præcordia p. n. affecta, aut dolore aliquo infestata, quin neg; partes adjunctas, Ventriculum, Lienem, Jecur, egrotare significat. 1. progn. 25.

Spiritus, avicenna præcipuum est natura simul & anima instrumentum, quo omnes functiones muniag; exequitur: substantia aërea, calida, levissima, tenuissima, omnes in corpore motus naturales ciens; est enim tertia substantia corporis nostri constitutiva, contradistincta aliis duabus solidis, & humoribus, ejusdem planè cum calore nativo originis, & temperiei, cujus calor est perpetuus comes; nam cum ad vitæ munia oporteret calidum innatum per omnia diffundi, is verò singulis solidis partibus insitus & fixus, & immobilis sit; ei Natura spiritum socium ascivit, qui ipsum, suo celeri motu, quod necesse erat, deduceret. Estq; tanta spiritui cum calore nativo, substantia communio, & operis societas, ut par sit ejusdem essentia, natura, & proprietas; ut non immerito Hippocrates spiritus vocarit, imperum facientia, à sui motus celeritate. Aliquando Hippocrates absolute ipsam respirationem, vocat spiritum. com. 4. in 6. de morb. vulg. 4. Unde & densum & rarum spiritum, i.e. respirationem tardam, & raram vocitabat. 1. de diffic. respir. c. 2. Interdum, ab eodem, aer inspiratu attractus, qui respirationis, vocisq; materia est, spiritus appellatur. 1. acut. & in prognost. Aliquando flatus ipse, quo nervosa & musculosa corpora distenduntur, spiritus appellatur.

Spirituosos, appellat Hippocrates eos duntaxat, qui

copiosum aëre inspirant, & aëre multo indigent. 4. acut. 115.
Spirituosus. Vide Sanguineus.

Spiritus flatuosus, sive flatus, crassus & vaporosus
flatus est, secundum substantiam aërius, tenuis. Cogita ve-
rd ejus naturam ex circumstante nos aëre, in memoriam
revocans, qualis in Austrinis constitutionibus, & qualis in
Aquilonaribus fiat: ei enim, qui in Australibus, assimilatur
flatuosus; alteri verd, qui in Aquilonaribus, is, qui in nobis
secundum naturam est, spiritus comparatur. 2. ad Glauco. 6.
Vide Flatus.

Spiritus animalis, est primum animæ instrumen-
tum, in Cerebri ventriculis contentus, ad sensificam &
motoricem vim in universas corporis partes transmitten-
dam, procreatus. 4. de loc. affect. 2. Spiritus equidem, qui
in arteriis continetur, vitalis & est, & dicitur; qui in Ce-
rebro, animalis, non quod de substantia animæ sit, sed
quod primum ejus illic habitantis sit instrumentum, qua-
liscumq; substantia ejusdem fuerit, qui ex vitali perfectius
concocto, & in Cerebri anfractibus elaborato, conficitur;
qui animalis spiritus, nequaquam animæ domicilium, sed
primum tantum ejus instrumentum est, eo quod, cum ex
vulneratione fuerit evacuatus, illico animal quasi mor-
tuum collabitur; cum iterum colligitur, reviviscit. 7. de
placit. cap. 3. Spiritus animalis, exhalatio quadam est
sanguinis benigni. 6. de usu part. 17.

Spiritus detentio, est Respirationis ad plurimum tem-
pus voluntaria cohibitio, per quam & singultus, & oscita-
tiones sanantur. 3. de diff. respir. cap. 10.

Spiritus densus, est brevis spiratio, sive motus respira-
toriorum organorum, per breve tempus, factus. 3. de differ.
respir. cap. 10. Vide Inspiratio densa.

Spiri-

Spiritus inter exeundum offendens. Vide Expi-
ratus.

Spiritus asper, à quibusdam appellatur is spiritus, qui
cum sono & stertore ducitur, sive ob angustiam loci, quo il-
le redditur, sive ab humoris copiâ. 3. de artic.

Spiritus vitalis à Cordis facultate naturali genitus,
in arteriis continetur, & nutritur per respirationem, at-
tracto aëre & sanguine; quod si naturalis quoq; spiritus
est; utique is quoq; in jecinore, & venis continebitur.
12. meth. 5.

Spiritus naturalis. Vide Spiritus vitalis.

Spiritus sublimis est, qui sublimioribus thoracis par-
tibus inspiratur. 4. de loc. aff. 7.

Spirituum interceptio. Vide Interceptiones spi-
rituum.

Spissum corpus. Vide Rarum.

Splen, sive Lien, corpus est rarum admodum, ac la-
xum, instar spongiae, ut succos crassos, & melancholicos fa-
cile attrahat, excipiat, hepar ab illis expurget, eosdemq;
conficiat. Unde ipsum Parenchyma, i. e. affusionem
nominant, 4. de usu part. cap. 15. cujus limæ partes, seu
concavæ Jecur, & ventriculum spectant: gibbæ his op-
ponuntur. cap. 16. Ejusdem Lienis corpus tantò est rarius
hepate, quantum est crassius pulmone. cap. 15.

Splenica vena, est ramus sinister superior & minor
venæ portæ, qui totus per lienem spargitur; nam cum vena
portæ in duos præcipuos ramos, mesentericum videlicet &
splenicum, distincta sit, hic in lienem abit, ille in mesente-
rium diffunditur.

Splenici, dicuntur ii propriè, qui indurata splenis
habent scirrhosamq; substantiam; non autem, quibus in-

flammatum viscus est. 9. de comp. med. loc. cap. 2. Evadunt autem lienosi, à copia melancholici humoris, lieni inserti, quam defluxiones, & fedus corporis color subsequitur.

Splendentem urinam vocavit Galenus, quæ & flava est, & peculiari ac propriâ mitione constat, ita ut gemini coloris esse videatur, & rufi, & rubei. Splendorem à rufo, nitorem autem à rubeo accipiens. lib. de urin. cap. 4.

Splenia. Vide Plagulæ.

Spondylus, Sphondylus, Spondylon, & Vertebra, sunt viginti-quatuor ossa, quibus Rhachis, i.e. spina constituitur; tot enim sunt in homine, secundum naturam se habente: aliquando verò plura, aliquando pauciora visa sunt, omnia cava & forata, spinam habent, & apophyses obliquas, & transversas descendentes, & ascendentes. Vide Dorsum.

Spongoidea ossa. Vide Ossa Ithmoidea, & Cavernosa ossa.

Spontanea vocantur ulcera, quæ oriuntur ex mordente humore, qui sistitur in exitu, ac tardat, extremamq; cuticulam solam, propterea quod ab eâ remoratur, tum erodit, tum exedit; quam nec ipsam, si eandem quoq; sudoris vice transirent, ulcerarent. 14. meth. 17.

Spontaneum, apud Medicos dicitur, non quod sine causa sit, sed quod nostrâ causâ non sit: item quod sit absq; operâ Medici, solius Naturæ vi. 6. aph. 14.

Sponte evacuari ex corpore dicimus, quæcumq; sine Medici operâ excernuntur; ea scilicet, quæ nostrum regit corpus, potentiâ ipsum expurgante, aut quæ ex irritamento aliquo, aut quia à vasis nō continentur, rejiciuntur. 4. aph. 2.

Sporades morbi, sive Sporadici sunt, qui sparsim privatimq;prehendunt, egros discrepante fatigantes, neq;

secun-

secundum communem modum constantes. 1. acut. 9. Vide Endemus, Communis.

Sporades venæ, sunt propagines quædam venæ maxima, cavæ, trunci, in totum crus, ab interiore ipsius parte per inguina procurrentis, inordinatæ, ad cutem permeantes, modicis intervallis disperse. 3. de anat. adm. cap. 12.

Spuriæ costæ. Vide Illegitimæ.

Sputamen, est sputum, cui aliquid alieni humoris est admistum: ut, bilis, sanguinis, saniei. 1. de cris. 5. Sputum autem, quod secundum naturam se habet, est, cui flavum aliquid admistum est. Ibid.

Sputum appellatur, non quod sanguineum, biliosum, atq; spumosum est; tale enim propriè sputamen nominamus: sed quod neq; sanguini, neq; bili pallidæ, vel nigre commistum, spuendo rejectum fuerit. 1. de cris. 5.

Spiratus, (ἐπιπνευστικὴ πύλη) vocant Caprarum dejectiones: sunt autem hæ siccæ, atq; id, quod excernitur, propriâ circumscriptione rotundum circumductumq; existit: cum igitur quis hoc pacto, sicca & circumducta dejecerit excrementa, talia Spyratode, i.e. in sphyras voluta appellantur; fiunt & quod plusculo tempore retinentur, & propter copiam igneæ caliditatis: com. 1. in 1. prorrh. 6. quæ & Scybala excrementa vocantur. Vide Scybala excrementa.

Squamosæ agglutinationes, quæ aliàs & mendoas commissuræ, & temporales dicuntur. Vide Lepidoides.

Staltica medicaméta, quæ carnes vulneribus equant. lib. de Dynam. in proem.

Staphyle, est carnosa quædam particula, quæ in summo ore apparet pendula, si quis, aperto plurimum ore oro,

linguam deprimat; hac ipsa caruncula duobus nominibus appellatur, à veteribus Græcis Gargareon, & Cion, b.e. Gurgulio & Columna. Cæterum, posteriores Medici ferè omnes non ita, sed Cyonidem, i.e. Columellam vocant; nam qui Staphylen, i.e. uvam & acinum ipsam appellant, eorum neg. meminisse præstat. Propriè enim non particulam illam, sed unam aliquam ejus affectionem, Staphylen, sive Uvam nominamus: raro autem hac affectio circa Columellam contingit, tamen si sæpè inflammetur gravissimè. 6. de comp. med. loc. cap. 3. & lib. de anat. viv. Est igitur Staphyle, non illius partis inflammatio, ut quidam putant, sed quædam illius passio, in qua tota Columella laxata, extremâ sui parte major est & livida; superna verò tenuis, ut similitudinem fructus uvæ, unde nomen accepit, præ se ferat. Latini Uvam & Uvulam nominant. Galibid.

Staphyloma, est oculi morbus, cum in summâ tunicâ quiddam acino simile evenit. 2. meth. 2.

Status morbi, est vehementissima totius morbi pars, 1. de cris. 8. Vel, Status morbi aliud non est, quàm morbi, quantum ad casus, & ad symptomata attinet, maximum. 1. aph. 7. Vide Consistentia.

Steatocèle, affectio est scroti, succrescente in eo quopiam sævo simili corpore. lib. Introd.

Steatoma. Vide Atheromata.

Stegnosis, stipatio, curis vitium, quo per occultos meatus prohibetur transmitti, quod superfluum est, excrementum fuliginosum, obstructis sive densatis meatibus, quam densitatem uōm, i.e. conniventiam vocant. 3. de san. tuend. cap. 10.

Stegnorica medicamenta, adstringentia, qua sensibiles

sibiles excretiones cohibent; quod quid enim claudit, & continet in se, nec quicquam sensibile ex sese emittit, Græcè στέγρον, sive Stegnoticum nuncupatur. 5. simpl. 14. Vide Obstruentia.

Stelechiæa, vena est superficialis, & caudicis more sita, unde omnes alia vena, sanguineis ac pedestribus animalibus procedunt. 6. de anat. adm. cap. 8. Estq. vena magna, ad portas jecoris sita, aliarum omnium caudex. Ibid. cap. 10.

Stephanos, Corona, & Iris, sunt locus ille communis, in quo universa oculi tunica simul committuntur. 14. meth. 19.

Stephaniæa, sive coronaria vena, futura, & os. Vide Coronale os.

Sternon, est antè Thoracis os, sive os Pectoris. 7. de anat. adm. cap. 2. Sedes enim omnibus costis duplex est, prior sternon, i.e. pectoris os, posterior verrebæ, quæ totidem numero omnind sunt, quot & costæ habentur, duodecim inquam: enimverò pectoris os, unum quidem os apparet, membranis autem detractis, quod & plura ossa sint, & numero totidem, quot cum eo costæ dearticulantur, palam innoscit. 8. de anat. adm. cap. 1.

Sternutatio, maximum remedium capitis halitibus repleti est, quâ uno impulsu tum à pulmone, tum à capite spiritus emittitur copiosissimus, ad expurganda ea, quæ in anterioribus Cerebri ventriculis, & in naribus offendunt. 2. de caus. sympt. cap. 4. Sternutatoria verò medicamenta sunt, quæ naribus admota, vapore ad Cerebrum sublato, crassitudinem humoris attenuant, & per naves seu palatum Cerebrum expurgant. 13. meth. 21.

Stigmata, inter cutis vitia numerantur, & dicuntur

non puncta, sed macula punctorum, magnitudine suâ & formâ hominis cutem & superficiem deformantes ac variantes. Vermicatam vulgò nominant.

Stomachi paralysis, symptoma est virtutis stomachi attractricis, cum alimentum aut omnino non trahere potest, aut quàm trahit debilissimè. 3. de sympt. causc. 2.

Stomachicos eos appellant, qui appetentiam perdidērunt, & quibus post sumptum cibum, ventris os gravatur atq; opprimitur, egros intolerabilis anxietas habet. Appellantur quoq; Stomachici, illi, quibus nausea conringit, & maxime si ad vomitum impellantur, & iisdem simul cibi corrumpantur, quandoq; acidi, quandoq; nidore infecti, quandoq; aliam vitiatam qualitatem adepti. Ad-hæc, eos Stomachicos appellant, quibus ructus huiusmodi cum molestia quadam, anxietate, & subversione contingunt, sæpè cum nondum cibum acceperunt. Quin etiam, quibus per plurimum tempus, cibi in ore ventris morantur, gravantes & vix descendentes, tales etiam Stomachicos appellant. Alios item appetitum caninum habentes, ut & plurima edant, & maxime gravati. paulò post revomant, vocant Stomachicos. Alios rursus, qui fortiter exolvuntur, ubi diutius in ediam pertulerint, & si non citius cibum accipiant, in ore ventris morsus percipiunt, quorum aliqui etiam nauseosi sunt, nisi citius potum ac cibum acceptent, Stomachicos etiam vocant. 8. de comp. med. loc. cap. 2.

Stomachum, os ventris appellanti Medici superius sive finistrum. Sic Stomachica animi deliquia appellant, & quosdam stomachicos esse dicunt: sic in eo loco oborto ab affectu p.n. appellantes, velut Hepaticos ab hepate, Colicos à Colo, Nephriticos à renibus, Spleni-

cos

cos à splene affecto, 2. de comp. med. loc. cap. 1. & 4. de caus. puls. 23. licet Stomachi nomine, etiam collum, omni ventri prepositum, instar Isthmi cujusdam angustum, intelligatur. 4. de usu part. cap. 1. Quin & Oesophagus, Stomachus dicitur. Vide Oesophagus. Est igitur Stomachus, os ventriculi, i.e. meatus superior ventriculi, per quem cibi in ipsum ventriculum intromittuntur. Aliud habet & Ventriculus os infernum, quod Græci πύλωρον, per quod chylus descendit, vocitant; duobus enim nominibus, Veteres, Os ventriculi nominabant, Stomachum & Cardiam, i.e. Cor. 8. de comp. med. loc.

Stomatica medicamenta sunt, quæ modicè siccant: sic vocata, quòd in assiduo sint usu; cujusmodi sunt, quod ex Moris conficitur, & quod ex Rubi fructu, & quod ex succo corticis juglandium viridis, atq; etiam his magis, quod ex musto, & cupressi sphaerulis componitur. 5. meth. 10.

Strabilismus, sive Strabismus, est musculorum oculi, non omnium, sed aliquorum resolutio, ob quam causam vel sursum, vel deorsum, vel in latera nuunt oculi. lib. finit. med. Vide Illosis.

Stranguria, est vesicæ affectus, quo urina non retinetur, sed guttatim destillat, lib. finit. med. unde etiam Urinæ stillicidium appellatur. 8. de placit. 6. Fit autem vel imbecillitate vesicæ, vel urinae acrimonia. 3. de caus. sympt. cap. 2. Vide Ischuria, & Celiaca.

Strangulatio, est internecio, ob respirationis defectum facta; vel propter angustiam, & coarctationem alicujus spiritualium, i.e. respirationi servientium organorum; vel propter virtutis thoracem moventis imbecillitatem; vel propter vitalis principii vehementem refrigerationem: Angustia autem fit, vel repleta eâ regione, quæ inter tho-

racem

racen & *pulmonem* est *intermedia*, vel *pulmonis cavernis* & *fistulis obstructis*, vel *inflammatione quâdam totum viscus habente*, vel *asperâ arteriâ*, vel *eius arteria caput*, quod *Græci Laryngem* & *Bronchon* nominant, *Latini Guttur*; vel *illâ gutturi præjacente capacitate*, quam *Græci Pharynga*, *Latini Fauces* nominant, *affectum quempiam perpetiente*. 4.aph.34.

Strangulatio uteri, & *apnœæ*, i.e. *spiritus interceptiones*, quæ *mulieribus quidem assidue*, & *præsertim viduis accidunt*, sunt *innatâ caliditate*, à *multitudine materia frigida aggravatâ*, ad *similitudinem flammæ*, quæ *præmultis humidis lignis suffocatur*. 3.de diff. resp. c.10. & 6.de loc. aff.5. *Affectus hic Græcis ὄσσεια*, vel ὄσσειν πνῖς, quibusdam *ἄνωρον ὄσσειν* dicitur: *Latinis autem Uteri strangulatus*, *Uterina suffocatio*, vel *Spirationis ob uterum privatio*, tùm à *parte affecta*, tùm à *superveniente symptomate appellatur*.

Strangulator. Vide *Lycoides*, & *Lupus*.

Strictor. Vide *Anulus*, *Rectum*, *Sphincter*.

Strigmenta, sunt *particula quedam intestinorum*, quæ *in excretionibus biliosis simul dejiciuntur*, summâ *intestinorum tunicâ*, *humoris acrimoniam derafa*. 4.de art.31. Vide *Rhypodea*.

Struma. Vide *Choëras*, *Parotides*, *Scrofulæ*.

Strypina. Vide *Halituosa*.

Stulticia, est *rationis deperditio*, cum *lesione memoria*, & *phantasia*. 3.de loc. aff.5.

Stupefacientia. Vide *Anodyna*.

Stupor, insignis est *refrigeratio*, idcirco *corporibus ita dispositis*, & *sensûs*, & *motûs difficultatem inducit*; quem admodum *completa refrigeratio* & *sensum* & *motum omnino*

omnino tollit, & *paralysin inducit*. Equidem *novi quosdam aded refrigeratis pedibus*, ut *primis quidem diebus sensus periret*, *sequentibus deinde diebus emortui pedes putrescerent*. 2.de loc. aff.2. Est *insuper Stupor symptoma*, quale *dentibus evenit post esum malorum immaturorum*, & *aliorum acerborum & acidorum*, proprio nomine appellatur *αἰσωδία*. 3.de aliment. facult. cap.16. Est *deniq; Stupor*, cum *nervus aliquis obstruitur*, vel *adstringitur*, *aded*, ut *spiritus animalis ad membrum transmitti nequeat*, hinc *membra sensu & motu privantur*. lib.de ren. aff. dign. cap.3.

Stryloides. Vide *Graphoides*, & *Lithoides*.

Strymmata, *spissamenta sunt*, quæ *oleis adduntur*, aut *odori gratiâ*, aut ut *compositiones diutius ab injuriis immunes permaneant*. 2.de comp. med. per gen.2.

Stryptica medicamenta sunt, quæ *stringunt partes relaxatas*. lib.de Dynam. in proëm.

Subalaris vena. Vide *Axillaris*.

Subclavium. Vide *Cataclida*.

Subcarrilaginea. Vide *Hypochondria*.

Subcinctura. Vide *Diaphragma*.

Subcingentes membranæ. Vide *Hypezochotes*.

Subductione, *Hippocrates appellat per alvum excurrentia*. 7.aph.64. Dicitur autem *subductio de ea tantum excretionem*, quæ *per alvum fit*; nequaquam autem de eâ, quæ *fit per universum corpus*. 2.aph.18.

Subfasciationes, & *Subligamina*. Vide *Epidesmus*, & *Plagulæ*.

Subligamentum, *Enæorema*, & *Nubecula*, *Hippocrati est*, quod *in urina*, *neq; in summitate*, *neq; in fundo vasis*, sed *in media sede sublime & exquisitè medicum*

dium existit; Nubecula autem id, quod supernatat in urina desuper, dicitur. 1. progn. 26.

Sublimis spiritus, est externus aer, qui ob suffocationis periculum, toto thorace, in suspiriosis cynanchicis, suppuratis, peripneumonicis magnâ vi attrahitur; nam nobis inculpatè degentibus, solis infernis iis, quæ ad seprum transversum sunt, partibus inspiramus; sin ampliorem spirationem requirimus, etiam partes infernis vicinas unâ movemus. Ubi plurimâ indigemus respiratione, tùm partes etiam ad aperta scoptula agitamus, totius thoracis validâ operâ urentes. comm. 2. in 3. de morb. vulg. 4.

Submissio. Vide Ablatio.

Substitutas medicinas appello, quæ in alterius locum subrogari queunt. lib. de substit. med.

Subsultus. Vide Palpitatio.

Subversio stomachi, est aut appetitus deperditio, aut nauseosa affectio, ab accepto cibo facta. 8. de comp. med. loc. 3.

Subversio volvulosa stomachi, appellatur fortis & contentiosus vomitus; nam quemadmodum in Volvulis, subversiones fiunt, cum magna contentione & violentiâ, aded ut stercus etiam evomant; sic etiam alios vomitus violentiores concitatos, quis appellare Volvulos posset. 8. de comp. med. loc. cap. 3.

Subvola, manus pars est exterior: ut enim supina pars manus, juxta pollicem assurgens, Thenar, & Vola dicitur; ita huic opposita, Hypothenar, i. e. Subvola nominatur. lib. Introd. cap. 10.

Succus. Vide Humor.

Succum medicatum vocant eum, qui primum defacatur, exinde verò Solis aut Ignis calore sic densatur, ut lon-

longiore tempore citra corruptionem asservari queat: Arabes Rob vocant. Ex hoc genere est, quod ab iisdem Miva dicitur: sic enim appellant succum fructuum, ed usq; defecatum & decoctum, ut sapa aut mellis consistentiam acquirat.

Sudamina, (Græcè ἰδρώα) è genere sunt pustularum in summâ harentium corporis parte, quæ ad instar ulcerum cutem exasperant, proveniunt autem, veluti & ipsum ostendit nomen, propter multos sudores biliosiores, & mordaciores, mordent enim hi cutem, & pruriginosam efficiunt, & per modum ulcerum exasperant. 3. aph. 21.

Sudor, Græcè ἰδρώς, est humidum tertia concoctionis excrementum, per cutem aqua specie erumpens, cujus materia est humor tenuis, & serosus, alimento permistus, quod id facilius exiguas & capillorū modo tenues venas subeat, atq; ab his in partes, quæ eo ali debent, sese insinuet; est quin imò ejusdem cum urina generis, in eo tantum ab illâ differens, quod hæc ad vesicam, ille longius in corporis habitum deferatur; cujus humoris excretio secundum naturam est, non minus quam urina & aliorum excrementorum.

Sudor bonus est in febribus, qui evenit die judicatorio, ex toto promanat corpore, calidus, insuper integrè febrem finit, vel morbum tolerabiliorem efficit, idq; in acutis morbis. 1. progn. 26.

Suffocatio. Vide Strangulatio.

Suffusio. Vide Hypochyma.

Suffumigium. Vide Thymiaia.

Sugillatio. Vide Contusio, Hyposphagma, Hæmalopa, Exuccatio.

Sumen. Vide Ephebæon.

Sum-

Summum humerum. *Vide* Acromion.

Supercilia, sunt ea pars faciei, ubi frons definit, ceteri termini hujus eminentes, & pilis confiti. *lib. Introduct. cap. 10.*

Superexcretionem, aut Superpurgationem, recentiores Medici vocant eas evacuationes, in quibus Natura, ad judicatorium auxilium concitata, modum excessit. *3. de comp. med. loc. cap. 3.*

Supergeminalis. *Vide* Epididymis.

Supergenualis. *Vide* Parella.

Superhumeralis, quae & Epomis dicitur. *Vide* Humerus.

Superimprægnatio. *Vide* Epicyema.

Superligamina. *Vide* Epidesmus, & Plagulae.

Superligula. *Vide* Epiglottis.

Superpurgatio, & Supervacuatio. *Vide* Hypercatharsis.

Supinicas, stomachi affectio est, quâ in quamprimum assumpto cibo, si paulo fortiori motu corpus moveatur, statim vomunt. Vulgò Supinicas stomachi appellatur, contingit juxta intemperiem quamcumque, citra vitiatos humores. Aliquando sequitur ad solam oris ventriculi debilitatem, quod cibos amplecti, eiq; obvolvi non potest, veluti tota ventris amplitudo solet. Fit etiam propter humiditatem multam quidem, non tamen malignae qualitatis. Irriguis enim stomachus per largam humectationem, similiter ut ligamenta nervorum, laxatur; quandoque, verò cum vitia alicujus, modice tamen humiditatis complexu; etenim sicuti multa, ita & valde vitia peritromata, citra cibum, nauseam efficiunt. *8. de compos. med. loc. c. 3.*

Suppuratio. *Vide* Purulentia.

Suppuratus est, qui multum puris inter thoracem & pul-

pulmonem collectum habet; communiter verò omnes, quibus inflammatum viscus aliquod suppuratum est, Suppuratos, Empyos & Empyicos vocant. *4. de caus. sympt. cap. 6.* Suppurari autem, aliquando idem est quod corrumpi; sic enim sanguis, cum è suo loco exciderit, & per minimas partes ad eas, quae in musculis sunt, cavitates, aut per inania spatia, quae vasis circumjacent, fuerit effusus, suppuratur, aliquando nigrescit, aliquando in grumos vertitur, praesertim quando in magnam cavitatem præter naturam exciderit. *6. aph. 20.* *Vide* Empyus, & Purulentus.

Sura, est Tibia venter, Graeci γαστρονύχιον vocant. *3. de usu part. c. 10.* Est posterior tibiae pars carnosae. *16. de usu part. 8.* Veluti anteriorem carnis expertem, Anticnemion, & Ocream nominant. *2. de anat. ad. cap. 4.* *Vide* Tibia.

Surditas, νύφωσις, est actio auditus abolita, à causa aliqua præter naturam, videlicet à lesa audiendi facultate, ejusve primario instrumento, quod est animalis spiritus, p. n. affecto, aut lesis organo reliquis, quae Natura ad audiendum comparavit.

Suspensum. *Vide* Sedimentum, & Hypostasis.

Suspiriosus, i. e. Asthmaticus. *lib. de remed. par. fac.*

Sutura. *Vide* Commissura, & Compages.

Sycosis, Marisca, Ficus, Ficatio, est tumor, à fici similitudine sic dictus, ulcerosus, rotundus, subdurus, rubicundus, dolorificus; ex quo aliquando exiguum & glutinosum quid, inaequale & graveolens, egreditur, in barba maxime exoriens; aliquando & cumprimis in capillo proveniens, quod semper fici similitudinem fert, & carnis excrescentiam. Interdum in mento fit, ab humore non so-

lūm crasso, sed etiam partice serosa & tenuis humiditas, quā exulceratur: eoq; differt ab Iontho. Nascitur & in ano, solā magnitudine à Thymo differens. Latini Mariscam appellant, quam aliqui dicunt esse ficum præ pinguedine hiantem. 2. meth. 2. & 10. simpl. Appellatur etiam Sycolis, interioris palpebræ dura & asperior scissura. com. 2. in 6. de morb. vulg. 4. & lib. de ocul. cap. 9.

Syderatio, (Græcis σφάκελις) est corruptio solidorum corporum omnium, ipsiq; adeo osibus etiam inexistens, ne dum carnibus, aut vasculis solis; quo differt à Gangræna, quæ est mortificatio solidorum corporum, non osium. lib. de tumor. cap. 11. & 7. de anat. adm. cap. 13. Totam substantia uniuscujusq; partis corruptionem, Syderationem (i.e. Sphacelon) Veteres appellant: sed in partibus carnosiss, alijs quoq; nominibus, videlicet putridam carnem, marcidam, & vitiatam, alijsq; hujusmodi, eandem nuncupare consueverunt; de esse verò, quod in tota substantia vitiatur, syderatum seu sphacelatum tate inquirunt. Tale autem vitium osibus contingit, quando adiacens caro prava sanies producit, quibus ipsa madefaciendo corrumpit. 2. de fract. 20. Unde Sphacelare, i.e. corrumpere; & Sphacelon, i.e. Caries. 5. de loc. aff. 3. Semisyderatus autem dicitur, qui alterā tantum parte, dextrā aut sinistrā, computruit. lib. de aqua, aere, & loc. cap. 6. & 4. de artic. 17.

Symmetria, est temperies, & contemperatura, temperata sive debita convenientia, & proportio inter se tūc similiarium partium, in calido, frigido, humido, & sicco; tūc instrumentalium, in compositione, numero, magnitudine, figurā. 1. de sanit. tuend. cap. 1.

Symmetrum absolute est, quod nulli collatum, medium

diūm est, & mediocre, adeoq; omnis temperiei, tūc activarum, tūc passivarum qualitarum, norma constituitur: tale & Ensarcon, & Quadratum est. Non absolute verò symmetrum, quod in aliqua specie vel genere tale est, ut ad ipsius comparisonem, aliquid temperatum, vel intemperatum dicatur. 1. de temp. cap. 6. Symmetrum verò medicamentum est, quod & similis temperamenti est cum eo, cui admoveatur, & mediū temperamenti est omnium primarum qualitarum. 5. simplic. 25.

Συναγωγή, est per consensum, seu per viciniam affici, quoties pars aliqua non proprio affectu, sed alieno afficitur. 1. de loc. aff. cap. 6.

Sympathia, est affectio compatiens aliteri cui-dam primò patienti partium, idq; vel propter earum vicinitatem, vel propter societatem, quæ in ea sunt. com. 1. in 1. prorrhet. 20. Vide Idiopathia.

Sympeplis (Græcis πένανδος) est concoctio, quā Natura crassis & crudis humoribus, & concoctu difficilioribus, per abscessum providet, veluti calidioribus & tenuioribus per excretionem. 3. progn. 23.

Symphylis, est naturalis osium unio, per quam duo ossa sibi invicem aut immediate coalescunt, (veluti fungosiora, mollioraq;) aut aliorum interventu connascuntur, (ut sunt sicciora, & densiora) nempe mediā cartilagine, & dicitur Synchondrosis; vel mediis nervis, & dicitur Synneurosis; vel mediā carne, & dicitur Symparcolis. lib. de osib. in præm.

Symptoma (alias Palsio, πάλσις, & πάλθνα, & Epigenema, quasi supergenium, vel supergenium dixeris,) generatim nominatur, quicquid animali præter naturam accidit; ut sunt tūc morbi ipsi, tūc morborum

cause, intra corpus subsistentes. Alterâ verò significatione, ac magis propriâ, reliqua omnia, quæ (morbis, humoribus, causis exceptis) præter naturam sunt, Symptomata nominantur. lib. de sympt. diff. cap. 1. & cap. 2.

Symptomafis, affectus est, quo meatus, qui oculo videndi facultatem tribuit, ex atrophîâ, vel resolutione fit ætior, & concidit. lib. Introd. cap. 15.

Symbebcos, (Græcis συμβεβυκός) i.e. accidens; apud Philosophos id est, quod substantia opponitur; sed à Medicis, tum maxime Gal. 1. meth. contrâ distinguitur symptomaticus: Quæ enim, inquit, constitutionem partium, undè actio nascitur, necessario sequuntur, sanis quidem nobis symbebicota, i.e. accidentia egrotantibus symptomata nuncupantur. Accidentium autem differentias, 2. meth. tres constituit; sunt enim vel ut affectus, vel ut actiones, vel ut passionis: quorum hæc exempla ponit, inambulare, uri, cædi, album aut nigrum esse. Præterea, id ex accidenti dicitur fieri, quod nec primùm, nec per se fit; id quod exemplo calculorum motorum declarat Gal. lib. de differ. sympt.

Synanche. Vide Cynanche.

Synarthrosis. Vide Articulus.

Synætia. Vide Continentes causæ.

Synceras dejectiones, vocat Hippocrates impermixtas aquosæ humiditati, quibus solus humor aliquis dejectur, sive sit biliosus, sive melancholicus, sive porri colorem præ se ferens, sive bilis, quæ æruginosa nominatur; cuiusmodi dejectiones omnes, exustam esse omnem nativam humiditatem à calore febrili, demonstrant. 7. aph. 6.

Synchondrosis. Vide Symphyllis.

Synchisis, est oculi virium, in quo confusi sunt ejus humo-

humores: id quod accidit ut plurimum ex vehementi plaga, interdum verò & ex Uvæ tunica inflammatione, ruptis ejus vasibus, & effuso humore eorundem.

Syncomistos panis. Vide Autopyrus.

Syncope, est præceptus virium lapsus, 12. meth. 5. quem virium lapsum duo præcipua symptomata consequuntur, ex soluto quidem nativo calore, frigiditas totius corporis, colliquatâ verò solidorum corporum substantiâ, sudor, quem Medici syncopicon, & diaphoreticum appellant; ex quibus pulsus defectio, & sensus motusque privatio consequuntur. Differt à Lipopsychia & Liporhythmia, quod, licet utraq. affectio hæc affatim & confectim fiat, in syncope tamen plurimus subsequitur sudor diaphoreticus, languidiores vires reddit; sudor autem aut nullus, aut modicus est in exolutione, lipopsychia, & liporhythmia, minoremque noxam viribus infert.

Syncretica, h.e. relaxantia medicamenta. 2. de anat. adm. cap. 1.

Syncrimata, vocant corporum simplicium & elementorum compositiones, seu concreciones. lib. de differ. morb. cap. 5.

Syncrasis, i.e. concretio & contemperatio. lib. de maxime, cap. 4.

Syndesmi, sunt ligamenta, sensus expertia, quæ ex osse ortum ducentia, (non ex Cerebro aut spinali medullâ) rotunda sunt, alba & exanguia, cavitare carentia, in fibras divisa. 6. meth. 4. Vide Ligamentum.

Syndrome, concursus est & congressus symptomatum. lib. finit. med. Plethorica autem syndrome, est omnium humorum concursus; Syndrome verò pathognomonica, est concursus symptomatum, morbum, hujus scilicet

speciem, sedem & causam conjunctam indicantium. lib. de cur. rat. per sang. cap. 9.

Synneurosis. Vide Symphysis.

Synocha, h.e. continens febris est, cujus universum tempus una accessio est, & quæ vel semper in eodem vigore consistit, vel minuitur, vel augetur, donec judicetur; quæcumq; enim, per circuitus certos, ægritudinis accessiones fiunt, ex membrorum dispositionibus ortum habent, quæ scilicet membra vel mittunt, vel suscipiunt, vel generant, vel attrahunt, superfluitates; sed quæ circuitum non habent, in his nulla est corporis pars, quæ præcipue sit laesa, sed qui in venis & arteriis omnibus continentur humores, atq; ii præsertim, qui in maximis atq; plurimo calore abundantibus vasibus sunt, aut ob aliam quamvis causam, ut in Ephemeris, aut ob putrefactionem ferventes, febrem accendunt, Synocham appellatam, quæ à principio usq; ad finem nullam habet intermissionem, ac tamdiu perseverat, hominemq; deurit, donec, qui eam causantur, humores aut ex toto absumentur, aut coquantur, aut utrumq; patiantur. 2. de diff. feb. Febris hæc & Synochus putrida, deurens, ardens, Causon, succensa appellatur. 2. de cris. c. 6. Vide Cōtinua & Febrem Synochon.

Synochus, i.e. continens febris, quantum febrim genus numeratur, quod quia ex sui natura ultra tertium diem extenditur, nec humorem putrescentem habeat, nec febrilem calorem ut habitum possideat, propterea nec diaria, nec putrida, nec hæctica dici potest, sed vel diaria plurium dierum, vel Synochus non putrida, vel Synochus conclusa merito appellari potest; quam febrem vel conviventia meatuum, vel recens corporum densatio & stipatio excitat. 9. meth. 1.

Sy-

Synodontes. Vide Hiatuli.

Synonyma, i.e. Univoca, quæ inter se communicantia, & in aliquo tertio convenientia, ab uno factam denominationem habent. 4. acut. 13.

Synopsis, i.e. compendium. lib. de nervor. diff. cap. 17.

Syntaxis, distentio, opposita est laxitati: utraq; & in cute, & in articulis contingit, aut resiccatis, aut perfrigeratis, aut inflammatis, aut induratis iisdem; in cute verò, non his tantum modis, sed etiam quoties muscoli intra ipsam quovis modo augeantur, tum maxime ex carnis copia & abundantia, ut in utre pleno aqua, & Tympania, quod Galenus in pluribus libris Methodi testatur.

Syntaxis, i.e. mutua compositio, & connexio. 1. de usu part. 14.

Syntexis, Colliquatio. Vide Febris colliquativa.

Synthesis, est osium compositio, qualiscumq; demum; est enim universi generis nomen: alius nominibus vocatur Galeno, Syntaxis, & Homilia. lib. de osib.

Synulorica medicamina sunt, quæ ulceribus cicatricem inducunt. 13. meth. 5.

Syphon. Vide Metrenchyræ.

Syringotomata, instrumenta sunt, quæ ad fistulas incidendas sunt comparata. 6. meth. 4.

Syræon. Vide Sapa.

Syrinx, i.e. fistula, tubulus est callosus, angustus, oblongus, interdum etiam obliquus, os habens, cui cicatrix obduci nequit, per quod humor statim temporibus excernitur ichorosus, acris. Porro, fistularum alia cœcæ nominantur, quæ osculum in profundo, sinum ad superfi-

Y 4

ciem habent; alia occultæ, quæ & os, & sinum obtinent in profundo. lib. finit. med. Vide Fistula.

Syllarcolis. Vide Symphysis.

Systematica inæqualitas, est congregatio multarum inæqualitatum, & pulsus ex congerie multarum pulsationum inæqualium consurgens. 4. de loc. aff. 8.

Systole, est submissio pulsus, 1. de diff. febr. cap. 7. (dicitur etiam Systole & Diastole, i.e. constrictio, & dilatatio, de moribus thoracis & pulmonis, lib. de vocal. instr. diss. cap. 2.) quo motu facultas fuliginosa excrementa expellit & repurgat, atq; ira refrigerii calori nativo molitur.

Systrophe, Phyma, & Schleria, h.e. tuberculum durum, ut exponit Gal. in linguis. Hipp. 4. acut.

T

TABES, (Græcis cōmuniter Phthisis appellata) est ulceratio pulmonis, thoracis, & faucium, tussicula, quam debiles comitantur febres, & corporis universi consumptio. lib. finit. med. Nominatur etiam Tabes, alicujus corporis particula præter naturam diminutio, sive ea in prima formatione hujusmodi appareat sive post. lib. de diff. morb. c. 9. Vide Ex ægritudine senectus, & Phthisis.

Tabes oculi, (alias Rheridosis dicitur) est solius imminuta pupilla corrugatio, incidentibus aliis super alias rugis, quod spiritus parcius à Cerebro, quam pro natura deberet, affluat. Differt à Tabe oculi senum, quæ est corrugatio corneæ tunice, & pupillæ angustia, ab imbecillitate senectutis, cum ex defectu humoris tenuis, quo repletur, cum ex spiritus supernæ affluentis inopia. 10. de usu part. & 3. aph. 16.

Tabida febris. Vide Ex ægritudine senectus, & Marasmus.

Tabi-

Tabidos appellant veteres Medici, qui morbo tabifico, quem Phrhoën vocant, sunt obnoxii. Tales propriissime sunt, qui aded sunt angusto thorace & restricto, ut à tergo in morem alarum promineant, apertâ scopulâ; unde hos etiam Pterigodes, i.e. alatos vocant. Præterea, quibus caput facile impletur, & spiritus organis multas destillationes demittit, ii facile tabescunt. com. 1. in 1. de morb. vulg. 18.

Talpa, & Testudo, sunt affectus, cutis capitis proprii, nomina à recentioribus correctâ, cum apud antiquos hi affectus non fuerint descripti. Testudo autem Guidoni, abscessus est magnus, mollis, humoralis, latiore formâ, in modum testudinis, unde nomen accepit: quæ, si in capite nascatur, Talpatia, vel Talpa dicitur; in collo, Bocium; in testiculis, Hernia: interdum autem cum pure squamis, vel fistulis reperitur, reponitur sub abscessuum genere, & sub meliceride potius, quam atheromate. Talpa verò, cum albam materiam contineat, ad atheromata potius, quam meliceridem refertur. Bocium verò, vulgus vocat molem & laxum tumorem in exteriori gutturis parte, quem Græci Bronchocelen, nostri Herniam gutturis, & eo affectos, gutturosos vocant. Est autem colli tumor grandis, & rotundus inter cutem & asperam arteriam, in quo modò caro hebes, modò humor aliquis, mellis, adipi, pultri, aut aquæ similis, includitur. Huic similis affectus est, quem Guido vocat Natam, seu Naptram, quæ est excrecentia magna, carnosâ, veluti caro Natium, vel anchorarum, diversarum quidem formarum & magnitudinum, cujusmodi sunt Melopepon & Cucurbita.

Talus, non idem est ac malleolus, sed dicitur os sub malleolis contentum, unde quaq; contextum, quod ne tangere quidem possit. lib. de osib. cap. 22.

Y 5

Taraxis (seu Conturbatio) est, cum oculus, leviter ac mediocriter commotus, rubicundior evadit, ac obscure videt. lib. Introd. cap. 15. Paulus desinit, esse humiditatem & caliditatem oculi cum rubore præter naturam, à causa externa inductam; ut Sole, fumo, pulvere, oleo. Differt ergo ab Ophthalmia, quæ causam tantum internam agnoscit. Paul. lib. 3. cap. 22.

Tardus pulsus est, cum longo tempore arteria distenditur. 1. de diff. puls. cap. 7.

Tarson. Vide Pedion.

Tarsus oculi, est substantia quadam membranea, durior, ac tensa, quâ parte Periostris sive conjunctiva oculi tunica remeare ad corneam incipit, tenuibus pertusa foraminibus, ex quibus palpebrarum pili emicant propter suam duritiem, palpebram in rectitudinem extendens. 10. de usu part. Vide Cilia.

Taurus, dicitur quoque inter cætera, inferior Colis pars, in longitudinem ejus usque, ad sedem porrecta. lib. Introd. cap. 10.

Tela aranea. Vide Rhagois.

Telephia, & Chironia, ulcera dicuntur inveterata, & quæ vix curam recipiunt, cicatricemque difficilime contrahunt: sic dicta, quod Chirone, Medicina peritissimo, ad sanationem indigeant. Vide Chironia.

Telma, est solidum, & tensum, durum, ac pilis etiam nudum pedis vestigium. lib. de musc. diss. cap. 33.

Temperies, (Græcis ὑγεία) miscibilium est concentus & harmonia s. vel c. s. h. elementi mixtio, ad mixti actiones obeundas necessaria. lib. 1. de temper. c. 2. 3.

Tempora, ὑποκίρσι, appellantur partes, ab utroque synipitis latere supra aures sitæ. lib. Introd. cap. 10.

Tem-

Tempora morborum, tale quid sunt in morbis, quale quid in animalibus sunt differentia secundum ætates; neque enim tempus simpliciter hoc vocabulo significatur; neque conveniens illud tempus, in quo præsidia etiam usurpari debent: sed tantum morborum ætas, quæ temporum vicissitudine immutatur; ut animal ætatibus. lib. de morb. temp. cap. 1.

Temporales futuræ. Vide Lepidoides.

Temporales musculi. Vide Croraphitæ, & Mandibularii.

Tendones, fines sunt musculorum, pronervationes, seu aponeuroses vocant Anatomici, qui mediis partibus sunt nervosiores; inter se tamen in eo differunt, quod aliquando minus vel carnosæ, vel nervosæ substantiæ in se habent: quando carnis substantia inest amplior, carnosam pronervationem; quando parcius, nervosam appellant. 2. de artic. 5.

Tenesmus, est continua & implacabilis desidendi cupiditas, quâ tamen nihil, præter cruenta pauca & mucosa, egeritur; quare præsens affectio etiam Tentio, & Tentio appellatur, quoniam in ea fit in recto intestino tentio, cum dejicere vehementer homines expetentes, continuo exurgunt. 7. aph. 27. & lib. finit. med.

Tenor, apud Hippocratem est idem quod nervus intentus. 1. de placit. 9. & 1. de artic. 47.

Tensio. Vide Tenesmus.

Tensivus dolor est, qui tensionis sensum inducit acrius particulis. 3. de loc. affect. 9. Unde tensiva lassitudo, quæ & phlegmonosa est. 7. de comp. med. loc. cap. 1. Vide Dolor tristis.

Tentigo. Vide Priapismus.

Tenue

Tenue intestinum, (aliàs Ileon, & Involucrum) est tertium in ordine, jejuno intestino substantiâ simile: differt autem, quod neq. vacuum reperiatur, neq. tot vasis & involucris scateat. 6. de anat. adm. cap. 9. & lib. de anat. viv.

Tenuia appellantur medicamenta, quæ facile in tenues comminui partes possunt; Leptomeri Græcis: Crassa, quæ contrâ, Parimeri appellata. 1. simpl. 3.

Tenuis pulsus. Vide Gracilis.

Terebella. Vide Abaptista.

Teredo, Teredon, sive Terdo, est caries in osse. 3. meth. 1.

Teretes, lumbrici sunt, palmi longitudine, vel etiam majore, ad stomachum usq. proserpentes vermes. lib. Introd. cap. 13.

Tergum, Noton Græcè, sunt posteriores corporis partes, quæ collo subiacent, E. G. scapula, dorsum, spina, & lumbi. lib. Introd. cap. 10.

Terra Argyrite. Vide Argyrite terra.

Terra medicaminosa, quod aquâ irrigatâ, faciliè in lutum solvitur, appellatur: quia verò eâ utimur velut aliis medicamentis, idcirco non injuriâ Pharmatitidis, i. e. medicaminosa vocatur; nempe, quia sola est ejusmodi, ut evidentiorẽ vim medicaminosam possideat. 9. simplic.

Terræ intestina, γαστέρεα Græcis, sunt Lumbrici terrefres. 11. simplic.

Tertiana simpliciter, est Tertiana intermittens: contingit enim, hanc ipsam, sine aliqua adjectione, Tertianam simpliciter nominari; quemadmodum & Quotidiana intermittens, Quotidiana simpliciter appellatur. 2. de diff. feb. cap. 7. Earum febrium intermittentium, quæ tertiâ quoq.

quoq. die accessionem faciunt, quæ quidem breve habent accessionis tempus (quod duodecim horarum æquinoctialium spatio ad summum finitur, 2. de differ. febr. cap. 3.) ac cum rigore invadunt, & per sudores, & bilis vomitum, & biliosa excrementa finiuntur, his Tertianæ exquisitæ nomen impositum est; quibus verò aliquid horum deficit, hæ non exquisitæ, sed simpliciter Tertianæ appellantur: quod si intermissionem minorem habuerint, accessione videlicet in longius tempus protractâ, hæ Tertianæ extentæ vocantur. 2. de differ. febr. cap. 8. Exquisita verò Tertiana est, quæ sui ipsius naturam puram & sinceram servat, i. e. flavam bilem redundantem, & moram, tempus æstivum, locum calidum & siccum, hominis ætatem, & temperiem similem. 4. aph. 59.

Tertianus circuitus. Vide Quotidianus.

Testes, testiculi, ὀρχεῖς, sunt corpora duo glandulosa, alba, mollia, rara, laxa, cavernosa, rotunda, seminis & generationis principium, Græcis, quod duo sint, Αἰδοῦοι appellantur, quos ipsos Gal. 3. de aliment. facult. glandibus annumeravit: in maribus extra abdomen sunt, & propendent musculis, quos ὑπεραγέες vocant, suffulti; mulieribus intus latent à lateribus uteri, frigidiores, minores, & imperfectiores longè quàm marium. 14. de usu part. cap. 10.

Testudo. Vide Camarion, Fornices, Talpa.

Tenatos, rigor, distentio nervorum, est convulsio perpetua totius corporis rigidi, & in neutram partem se inclinare queuntis, contractis ad suum principium nervis & musculis, quibus caput annuit, renuit, circumagitur, æqualiter videlicet in ante & retro tensis. Gal. lib. de muscul. diff. Vide Distentio.

Terra.

Tetrapharmacum medicamentum est, quod ex cera, adipe, resina, pice, aqua omnium portione constat. lib. adversus Lycum. cap. 7.

Thele, papilla, mamma capitulum est, unde infans lac sugit, medium in mamma protuberans, quam ambit circulus quidam subniger, qui *phos* appellatur.

Thenara, proprie vocant prominentes *phala* manus partes, a verbo *deivao*, quod est verberare, ut nonnulli volunt; quippe cum his prominentibus partibus percutere soleamus ea, quae percutimus; alii non omnes partes prominentes palmas, sed solas eas, quae sub pollicibus extant, sic appellant. 1. de fract. 20.

Therapeutice, i. e. Medendi methodus: 7. de compos. med. per gen. cap. 1. quae & Curatoria dicitur.

Theriaca appellarunt Crito, & eum sequuti, quod viperam carnes acciperet; Andromachus vero, qui primus illam composuit, Galenem, h. e. tranquillam. lib. de usu Theriac. ad Pamph. prope finem.

Therisma, terribilissimum ulcus est, tum ex se nascens, tum alteri superveniens, ut refert Celsus, colore lividum, nigrum, odore foedum, multo mucoso humore repletum; quod inflammatio, febris, prurigo & dolor comitantur, a quo sanguis interdum fluit, serpit id ipsum & exedit partes finitimas; ac ob id aliqui Herpetem exedentem vocant; alii dicunt idem esse cum Carcinomate, quod Gal. com. 2. in 6. Epid. dicit in solo pulmone generari; alii in quacunque corporis parte carnosam provenire id ipsum statuunt.

Thermantica, calefactoria medicamenta sunt, quae suo calore, omnem partem calefaciunt. lib. de Dynamid. in proem.

Ther-

Therminthi nomen, nigrae quaedam pustulae, in cruribus maxime orientes, significat; a figura coloris, magnitudinisque similitudine, quam cum Therminthorum, i. e. cicinerum fructu habent, derivatum. comm. 3. in 6. de morb. vulg. 37.

Thlasma, aut **Thlasis**. Vide **Rhegma**, & **Unionis solutio**.

Thlypsis. Vide **Epiparoxine**ste.

Thoracem, consueverunt appellare Veteres totum illud spatium, quod duodecim costis, utrinque, circumscribitur; pertinet anteriore quidem parte ad pectorale os, ac septum transversum; declinat vero posteriore ad spinam, duodecim vertebrae circumscriptum. lib. de ossib. c. 13. & 6. de usu part. cap. 2.

Thorexin, nominare consuevit Hippocrates vini portionem. 2. aph. 21.

Thrombos, sanguinis grumus est, aut sanguis concretus. 5. meth. 8.

Thrombosis, affectus est, in quo lac grumescit in mammas, & in casei formam transit; Grumescentiam lactis Interpretes nonnulli vocant.

Thymiama, Latinis suffumigium, ex moderate adstringentibus, reficantibus, ac discutientibus viriosis & serosis humores, & corrigentibus humorum malitiam, & iis, quae contraria vi pollent adversus putrefactiones, cujusmodi sunt aromata, constat. 8. de comp. med. loc. cap. 7.

Thymus, aspera carnis extuberatio est, circa genitalia, ac sedem oriri solita. lib. finit. med. & 14. meth. 3. Est & tumor praeter naturam. Vide **Epulides**. Est & Thymus idem quod Glandium, seu Aden, seu Glandula. Vide **Aden**, **Glandula**. Vel, ut alii, **Thymos** carnosae est excrescen-

crescentia, nunc in glande, nunc in præputio, nunc in ipsa sede consistens: sic dictus, quod Corymbis Thymi sit similis. Thymorum autem alii mites, alii maligni. Mites, sunt exigui, scabri, candidi, dolore carentes; feri autem, ampliores, scabriores, lividi, dolorifici.

Thyreoides cartilago. Vide Scutiformis, & Crioides.

Thyroides, est os pubis foramen, ab ostii similitudine sic appellatum. 3. de anat. adm. cap. 13.

Tibia, est tota cruris pars, inter talum & genu, in interiori parte sita; cuius tibia pars anterior, tenuis, & carnis expers, Ocrea appellatur. lib. de osib. cap. 22. Eademq; infra genu, Anticnemion, (Latinis Crea:) 2. de anat. adm. cap. 4. Posterior carnosâ pars, Sura, & Gastrocnemion dicitur. 16. de usu part. cap. 8.

Tilmata, sunt divisiones, facta in fibris musculorum, dum scilicet illæ nimis distentæ, interdum rumpuntur. 4. de iis, quæ in medic.

Titillatio oculorum. Vide Mollities.

Toma, pro Phlebotomia usurpatum legimus, lib. 2. de nat. hum. cap. 9.

Tomi, dentes, aliâs Incisorii, dicuntur quatuor primi anteriores, ad cultri similitudinem, ad eos cibos incidendos, qui molliem in se habent; sicuti ad dura confingenda, alii utrinq; proximi constituuntur. Cateri ferè omnes dentes, molares, sive maxillares, Græcis Mylvi, & Molæ appellantur. lib. de osib. c. 4. & 11. de usu part. cap. 8.

Tonica, sive Tonorica medicamenta sunt, quæ extrinsecus illiniuntur partibus nervosis, ad robur hisce conciliandum. 13. meth. 22.

Toni-

Tonicus motus, est in primis in Terano, duabus contrariis virtutibus, oppositorum musculorum, inter se quasi pugnantibus. 1. de motu musc. cap. 8.

Tonos, nervus, nuncupatur ab ipsis operationibus: uti enim Nervus ἀπό τῆς τάσεως, i. e. à flectendo; ita Tonos ἀπό τῆς τένσεως, i. e. à tendendo deductum est. 1. de motu musc. cap. 1. Vide Nervus.

Tonillæ. Vide Isthmus, Uvæ, Paristhmia.

Tophus. Vide Callus.

Topica remedia, i. e. localia, 13. meth. 22. quæ loco affecto non prius applicari debent, quàm totum prius corpus purgatum sit; ne hisce irritato affectu, affluxus ad membrum læsum vitiosi succi promoveatur. lib. de remed. par. fac. cap. 6.

Torcular, sive Linon, est locus quidam vacuus, quasi cisterna in vertice capitis, in quem meningis duplicationes sanguinem redundantem deducunt, undè rursum velut ab arce quâdam, omnibus subjectis partibus, sanguinis rivus mittuntur. 9. de usu part. cap. 6. & 9. de anat. adm. cap. 1.

Tormina, Dysenteria, propriè non pro ulceratione intestinorum, ut pleriq; Medici solent, sed pro cruentâ ex intestinis proluvie sumit Hippocrates: ut etiam, quando ex Jecoris imbecillitate cruenta dejiuntur, affectio talis quoq; Torminum nomine appellatur: id quod & fieri, & dici à Medicis quoq; videtur. 4. de art. 4. Fiunt autem tormina, & propter morsum vehementem, & propter spiritum flatuosum, qui non habet exitum, sed in intestinorū involucri est interceptus & p. n. detentus. 4. aph. 11. Vide Dysenteria.

Torpor, est motus & sensus difficultas, diminutio in toto corpore, & maxime in artubus à frigore, & compres-

sione nervosorum corporum, concitata. 1. de caus. sympr. c. 5. Aliquando Torpor significat, ventriculi in concoquendis cibis imbecillitatem. com. 3. in 6. de morb. vulg. 1.

Tortio est, cum articulus quidem est illæsus, sed nervosa circa ipsum partes torta & p. n. contracta sunt: id quod maxime in his contingit, quorum in vacuum gressus dilabitur. 3. de iis, quæ in med. 31.

Toxica, h. e. venena, quæ mortem inferunt. lib. de Dynamid.

Trachea, sunt medicamenta aspera, quæ suffocata loca ulcerant, & exasperant. lib. de Dynamid. in proem.

Trachea arteria. Vide Aspera arteria.

Trachoma, altera est species scabiei palpebrarum, dolorem, & gravitatem in oculis, humiditatemq; nimiam ingenerans. lib. de ocul. par. 4. cap. 9. Inde Trachomata appellantur, quæ hanc asperitatem detergunt. 14. meth. 19. Hinc quoq; τραχίτης, asperitas, dicta est vitiosa conformatio, parti, cui accidit, inæqualitatem inducens; opposita affectio lævitati: quæ sunt duo prima morborum genera in formatione sita.

Transductio, est diducti ossis in naturalem statum reductio. lib. finit. med.

Tragemata, sunt ea, quæ post cœnam, voluptatis inter bibendum excitanda gratiâ, assumuntur. 1. de alim. fac. 34.

Transpiratio, seu Perspiratio, est insensibilis per poros diffusio excrementorum fuliginosorum. 1. de sanit. tuend. cap. 12. Vide Inspiratio.

Translativus motus. Vide Metalepticus,

Transumptivus motus, sive Metalepticus, est, quo per machinas utuntur plurimi, tum Archirecti, tum Medici, qualem motum Natura musculis conciliavit, quoniam
nervo-

nervorum principio existens, Cerebrum & ratio, ibidem radicata, per nervos, tanquam habenas, musculos laryngis E. G. intendit; sic etiam nervus, qui à cerebro profisciscitur, à superiori loco per totum collum fertur deorsum, ad multam usq; thoracis partem, indeq; rursus redit usq; ad laryngem, ubi nervus in laryngis musculos insertus, quasi à manibus quibusdam, singuli musculi deorsum trahuntur. 7. de usu part. 14.

Traulotes, Latinis Blæsitas: quâ passione correpti, τραυλοί Græcis, Blæsi verò Latinis dicuntur, qui certas alphabeti literas exprimere nequeunt.

Tremor. Vide Palpitatio.

Tremor oculorum. Vide Mollities.

Trichiasis, i. e. capillitium, morbus est, in quo cum crassa urina, veluti capilli una exeunt. 4. aph. 76. Ad hæc, Trichiasis est affectio, in qua pili inutiles & pungentes palpebris innascuntur. 4. de comp. med. loc. cap. 8.

Triens, h. e. uncia quatuor. 4. de compos. med. loc. c. 14.

Triglochina, sive Trifulca figura est, qualis E. G. inest quinq; membranis Cordis, tribus in dexterâ parte, duabus in sinistrâ consistentibus, similis figuræ triangulari, & telorum cuspidibus. 7. de anat. adm. cap. 9.

Trigona medicamenta, sunt ex seminibus composita, quæ sicut ad torporem inducendum miriora, ita in futurum minus sunt tuta: quibus omnibus utilius anodyna (ὀνώδυνα) sumuntur. 12. meth. 1.

Trismos, sive Trysmos, Latinis Stridor, est convulsio musculorum mandibularium, ex qua fit dentium invicem concussio. 2. de caus. sympr. cap. 2.

Trifulca. Vide Triglochina.

Tritæophyes (quæ & Tritæus) febris, est Tertia

ne naturam sapiens, quæ tertio die exasperatur, & ferme in integritatem remittit; sed si quæ febris tertio quoque die exacerbatur, neque per minimum intervallum ita mitescat, ut in eo febricitans prope sinceram in febricitatem assequi videatur, hanc si quis triæophyes nominare velit, forsan & ipse non sine ratione loquetur. comm. 2. in 6. de morb. vulg. 23.

Tritæus. Vide Tritæophyes.

Trivus, (Græcè τριβῶ) apud Hippocratem significat eam corporis partem, cui sive stantes sive ambulantes, sive sedentes, sive jacentes, innitimur; ut stantibus nobis atque ambulantes, planta pedum; nates sedentibus; spina supinis; cubito innitentibus, cubitus. 2. de his, quæ in medic.

Trochantera, Latinis Tuberculum, magni ossis femoris processum in specie sic vocant. 2. de anat. adm. cap. 6. & lib. de ossib. cap. 21. Vide Femur.

Trochlea brachii. Vide Bathmides.

Trochiscos. Vide Pastillos.

Tromata, Latinis ictus, nominat Hippocrates magnas noxas, ab aliquo extrinseco, etiam sine vulnere illatas. com. 5. in 6. de morb. vulg. 12.

Tromos, i.e. tremor. 2. meth. 2.

Trypsin. Vide Anacrypsin.

Trylmos. Vide Trismos.

Tubercula, sunt quædam sponte nascentes, & celerrime factæ inflammationes, quæ celerrime in altum attoluntur acumen, & celerrime suppurantur, & plurima horum in inguinibus & alis est generatio, quoniam in his partibus plena sunt adenes, qui apti naturâ sunt ad universi corporis superfuitates promptè excipiedas. 3. aph. 26.

Tuberculum insuper Phyma nominat Hippocrates, quod

quod in aliis ipse solitus est vocare suppurationem, Græcè Empyema. 7. aph. 8. & lib. de tumor. cap. 15.

Tumor. Vide Oncos.

Tunicarum nomine, quidam sola composita operimenta designant; alii autem crassa; alii composita simul & crassa. Ad eundem autem modum & de membranis litigant: quibusdam enim simplicitas sufficit; aliis autem tenuitas; alii ambobus opus esse arbitrantur, ut ita nominentur, quasi tenuia fuerint simul, & simplicia operimenta. At antiqui ceræ, tunicas, membranas, meningas, præter hæc omnia alia operimenta sic vocant; quos nos quoque sequentes, à vana quidem in nominibus garrulitate discedemus. 4. de usu part. cap. 9.

Tunicæ cordis, sunt corpora regentia extrinsecus utrumque cordis ventriculum. 6. de usu part. cap. 8.

Turgere, verbum est translatum ab animalibus concubitu appetentibus, ad humores: nam sicut illa stare loco non possunt, quâdam titillatione impulsæ, eoque affectu concitata motu feruntur turbulento; sic & humores plerumque in motu vehementiore, atque transfluxu à partibus ad partes, in morbi principio, moventes, titillantes, & quiescere non permittentes, cum & ipsi pariter moveantur, & transfluant, & perenni hac suâ latione egrum molestant, turgere dicuntur. Tales ergo humores turgentes dicuntur, qui sunt in motu, latione, & fluxu. 1. aph. 22.

Turgidus dolor est, qui à parte primariâ affectâ, veluti à radice incipiens, celeriter in partes adjacentes transfertur. 2. de loc. aff. 7.

Turgidus pulsus. Vide Gracilis.

Tusis, est vehementissima quædam esslatio, quâ plurimus simul, celerrimèque foras ætus spiritus, attrahit, pro-

pellitq; unà secum suo impetu, quæ vias suas obstruunt. 2. de sympt. caus. 4. Cum enim externus aer in asperas arterias trahatur, quæ cartilagineæ duræq; sunt, nec contrahi circa id, quod continent, possunt, concitatum hunc excogitavit spiritus exitum, quem vocant rulsim, quo spiritus sibi ipsi violenter & cum impetu delatus, vias expurget, non aliter, quàm rubos, & fistulas, expurgant harum opifices. 4. de caus. sympt. cap. 3.

Tulsis sicca, in qua nihil expuitur. 4. aph. 54.

Tylosis, i. e. callus: sic autem nuncupatur, cum in palpebris aspritudines ex senectute crassiores, albidiores, & parùm sensiles extiterint, eòq; minùs deleri possunt. lib. Introd. cap. 15.

Tympanias, sive Tympanites, Hydrops est species, in quo spiritus flatûsve crassi frigidi, totam thoracis superiorem & inferiorem regionem, tumentes facit. 4. acut. 111. Vide Ascites.

Tynesmus, qui & Tinesmus, & Tenesmus appellatur, est recti intestini vehemens tensio, & assidua deiectionis cupiditas, paucis admodum sequentibus excrementis, quæ quidem ab initio pituitosa & pinguis, progressu vero temporis, etiam abrasionis specie deiciuntur, & iis, quæ à supernis descendunt, haudquaquam misceri videntur. 6. de loc. aff. 2. Tinesmus (alibi dicit Gal.) ulcus est in recto intestino factum, quod quidem infert symptomata Dysenteria similia, nixus tamen multò vehementiores, quàm sunt dysentericorum. 3. de sympt. caus. 2.

Typhodes febres, i. e. succedentes, ut Causodes incendentes sunt, quarum mediæ est Semitertiana. 1. aph. 12. Vide Febris Typhodes.

Typhomania, (quam & Typhoniam vocant) est deli-

delirus Lethargus, vel lethargicum delirium. lib. finit. med. Typhoimia, appellatur commistus affectus ex Lethargo & Phrenitide. lib. de Comat. cap. 2. Ego verò, quoties ad finem usque tum desipientia, tum Coma persistunt, affectionem hanc ex Phrenitide, & Lethargo mistam appello; quidam Typhomaniam vocaverunt. 1. prorrh. 1.

Typus, est ordo intentionum & remissionum; Periodus sive circuitus, est tempus intentionum ac remissionum in morbis factum. lib. de Typis, c. 2. Sive, est formula quedam accessionis, cum vel subsequitur, vel anticipat. Definitur quoq; quod sit reditus ab eodem, ad idem. 1. de eris. 3.

Tyria, apud Arabes, idem est ac Ophiasis: Tyri enim voce, omnes serpentes, & potissimum viperas intelligunt.

V

VACUATIO, Græcis νεωωσις. Vide Purgatio. Vacuus pulsus est, qui arteria elevationem facit bullosam, ut digitorum impressioni egressus, per vacua occurrat. 1. de diff. puls. cap. 6.

Vaginalis tunica. Vide Elythroide.

Vaginæ. Vide Membrana dura.

Valga, appellantur crura, in exteriorem partem vergentia; quæ verò in interiorem, vara & manca. 3. de his, quæ in med. 31.

Vapor, humor est extenuatus, qui plurimus est in spiramentorum raritate, corporis mollitie, substantie fusione. 1. simpl. 8.

Varices, sive Cirrus, Antiqui venas omnes dilatatas appellabant. lib. de tumor. 16. Varices, sunt venæ latiores in coxis, testiculis & cruribus, quæ ex crasso & melanco-

lico sanguine rurgent, aded ut pellente naturâ, ad partes ignobiliores, humores crassos, & melancholicos, dictarum passionum generatio sequatur. 6. apb. 21.

Variciformis flexus. *Vide* Flexus variciformis.

Varicosum parastata. *Vide* Glandulosi assistentes.

Varicosus assitens. *Vide* Genitalis, Glandulosi assistentes, & Meatus genitalis.

Varicosus meatus. *Vide* Genitalis.

Varus, exiguus durusq; tumor est, in faciei cute obortus, Græcis Ionthos, differt à ficosis tumoribus in mento provenientes, non solum quod ex crasso humore consistat, verum etiam quod participet renui quâdam sanie, cuius ratione facile ulceratur, non rectè nec ex arte curatus. lib. de remed. par. fac. cap. 11. *Vide* Ionthos, & Ficosus tumor.

Vasa deferentia. *Vide* Glandulosi assistentes.

Vasa spermatica, Seminaria, quæ vulgò preparantia appellantur. *Vide* Glandulosi assistentes. ●

Vehemens pulsus (sive Validus, & Fortis) est, qui violenter tactum impellit, & quasi ferit: Remissus sive Languidus, qui debiliter. lib. de puls. ad Tyron. cap. 3. & lib. 3. de diff. puls. cap. 5.

Vehementia morbi, est ea, quam magnitudinem vocant; & mos morbi, quem modum sive naturam morbi appellant. 1. de cris. 3.

Vellicationes, seu discriptiones, junioribus Medicis appellantur convulsionones, quæ in fibris musculorum contingunt, dum nimis intentæ, interdum rumpuntur. 3. de his, quæ in medic. 30.

Vena, φλέβ, est vas spermaticum, unâ constans tunicâ, fibris triplicibus contextum, sanguini deferendo destinatum.

tum. Venæ etiam nomine, arterias comprehenderunt Veteres: quo sensu Plato in Timæo, venas à Corde oriri, asserit, ut testatur Gal. 6. de placit. *Vide* Arteria.

Vena arteriosa. *Vide* Arteria venosa.

Vena axillaris. *Vide* Axillaris vena.

Vena azygos, quasi conjugio carens, vulgò Vena sinè pari, ea est, quæ in quibusdam animantibus juxta Cor adnascitur; in quibusdam verò, ut in hominibus, ex ea emergit parte, quâ Cordis aurem dextram vena Cava tangit; hinc siquidem emergens, humiliter depressiusq; per Cor defertur, atq; in spinam contorquetur. 2. acut. 10.

Vena Basilica. *Vide* Axillaris.

Vena capillaris. *Vide* Apanthismos.

Vena capitis. *Vide* Humeraria.

Vena cava. *Vide* Cava vena.

Vena Cephalica. *Vide* Cephalica vena.

Vena communis. *Vide* Communis vena, & Media vena.

Vena conjugio carens. *Vide* Vena azygos.

Vena coronalis, sive Stephaniciæ. *Vide* Vena Peristephaniciæ.

Vena crassa. *Vide* Crassa vena.

Vena cubiti externa. *Vide* Humeraria.

Vena cubiti interna. *Vide* Axillaris.

Venæ emulgentes. *Vide* Emulgentes venæ.

Vena funis brachii. *Vide* Funis brachii.

Venæ guidez. *Vide* Apoplecticiæ.

Venæ Hæmorrhoidales. *Vide* Hæmorrhagia.

Vena Hepatica. *Vide* Axillaris.

Vena Humeralis. *Vide* Humeraria.

Vena Jecoraria. *Vide* Cava vena.

Vena Ischiadica. *Vide* Ischiadica vena.

Venæ Jugulares. *Vide* Apoplectica.

Vena lata & magna, ipsa dicitur humeralis vena. *1. de artic. 53.* Licet communiter Medici, & Anatomici Magnam vocent venam Porta, sicut Cavam, maximam appellant.

Vena manifesta. *Vide* Manifesta vena.

Vena media. *Vide* Communis.

Venæ mesaraicæ. *Vide* Mesenterium.

Vena nigra. *Vide* Media Cubiti vena.

Vena Peristephaniæ (Latinis Coronaria) est, quæ Cor ipsum coronat, principiumq; sui ortus extra membranas habet. *6. de usu part. cap. 14.*

Vena Poplicis, est ramus medius venæ Cavae, qui deorsum ad poplitum fertur, & per profundum Suræ procedens, non modicam in musculos ejus ramorum sobolem spargit, atq; ob id hæc vena (quemadmodum etiam in manu) communis, seu media dicitur. *lib. de dissect. ven.*

Vena porta. *Vide* Cava vena.

Vena purpurea. *Vide* Communis vena, Media vena.

Vena salvatella. *Vide* Salvatella vena.

Vena saphena. *Vide* Saphena vena.

Vena sine pari. *Vide* Vena azygos.

Vena splenitica. *Vide* Salvatella vena.

Venæ, & arteriæ umbilicales sunt, quæ uteri acetabulis adhærescunt, quibus fœtus in utero alligatur, & per quas alimentum trahit. *1. de semin.*

Veneticos oculos appellant eos, qui suffusione affecti sunt; sunt autem Venetici oculi duobus modis; vel propter aquam, si nimium fuerit coagulata; vel propter sicci-

siccitatem, quam patitur crystallinus humor. *lib. de ocul. part. 4. cap. 12.*

Ventrem superiorem, Veteres appellant thoracem; alimenti autem receptaculum sive abdomen, omneq; id, quod à septo transverso est, ventrem inferiorem. Interdum autem ventrem inferiorem nominabant, in quem cibi assumuntur; & quæ ab eo sunt omnia, ventrem superiorem. Sic nominant etiam sola crassiora intestina. Deniq; sunt, qui Colon duntaxat, ventrem inferiorem vocant. *4. acut. 112. & 7. aph. 38.*

Ventriculus est, in quem primò animalia cibum pertrahunt. *6. de anat. adm. cap. 2.* Aliquando Ventriculi os superius pro stomacho sumitur. *lib. de cur. rat. per sang. cap. 1.*

Vermiculans pulsus est, cum nobis tangentibus, quasi perreptantis arteriam vermis, undarum in modum insurgentis, sensus exhibetur, idem ille parvus est, languidus, & creber; sin autem non parvitati, sed magnitudini sit adjunctus, dicitur Undosus; si ad extremam deveniat remissionem, crebritatem, & parvitatem, formicans dicitur. *lib. de puls. ad Tyron. cap. 8. & 1. de differ. puls. cap. 26. & 27.*

Vermiformis excrescentia, sive Epiphyfis. *Vide* Vermis Cerebri.

Vermis Cerebri, est obstaculum quoddam, quod habet pars ea, quæ à medio Cerebri ventriculo, ad posteriorem itur, cujus forma est sicut pinea. *lib. de ocul. part. 2. c. 2.* Quin particula quadam Cerebri incumbit meatui, qui est à Cerebro ad Cerebellum, quæ circumscriptionem obinet, figurâ vermi, in lignis enascenti, similem. Hinc etiam Anatomici excrescentiam & processum vermi-

for-

formem, corpus hoc, quod totum meatum contegit, vocant. 9. de anat. adm. 5. & 8. de usu part. cap. 14.

Vernaculus morbus. Vide Endemius, Epidemius, & Communis.

Verricularis. Vide Amphiblestroide.

Verrucosa. Vide Dulcia ulcera.

Vertex Capitis, (Græcis νωτοφύ) in media capitis regione, syncipitur superante, est collocatus: unde velut à centro, circulus, capillorum proventus, incipere videtur. lib. Introd. cap. 10.

Vertex, apex, aut mucro Cordis, est inferior visceris terminus, figurâ turbinatus, qui infernè pectoris ostii regioni cohaerescit, ubi etiam mucronata cartilago constituitur. 7. de anat. adm. cap. 3.

Vertebra. Vide Dorsum.

Verrigo, est affectio, quâ caput absq; externis causis in gyrum circumagi videtur. 4. acut. 42. Vide Scotodinos.

Vesica fellis. Vide Cystis Choledochos.

Vestigium, vocatur inferior pars pedis. 2. de fract. 10.

Veternus, est gravis sopor, de caus. morb. cap. 3. sive ignavia & stoliditas cum somnolentiâ. 1. prorrh. 31. & 2. aph. 3. Dicitur autem Veternus, quasi veteranus morbus, qui Lethargus vocatur, in quo agri veteranorum, i.e. senum more, inexpergiscibili somno detinentur. Terrentius in Eunuchio.

Vibratio, sive Agitatio, est violentus corporis motus, huiusq; partium motus, ut conquiescere non liceat, etiamsi strenuè admodum renitatur: differens à Tremore, qui, nisi partem movere velis, non accidit. lib. de trem. palp. c. 6.

Vibratus pulsus, (Græcè νλονόδus.) Vide Convulsivus.

Vicum

Vicum appello, non tantum qui cibo & potione constat, verum etiam qui omnibus aliis, ut ocio, exercitatione, balneo, Venere, somno, vigiliis, & omnibus, quæ quovis modo sunt in humanis corporibus, ipsamq; adeo vivendi rationem. comm. 3. in 3. de morb. vulg. 9.

Villi. Vide Fibræ.

Vinaciæ, sunt solida uvarum reliquia, cum in torculari succus ipsarum omnis expressus fuerit. 2. de alim. fac. 9.

Vinum aparachyton, i.e. originale, cui marina aqua non est addita. 4. de comp. med. loc. cap. 7. Cui proinde opponitur Vinum rethalaßomenon. 4. acut. 2.

Vinum vinosum. Vide Hydatodes, & Oenodes.

Virtus naturalis. Vide Virtutes.

Virtus ratiocinatrix. Vide Virtutes.

Virtus vitalis. Vide Virtutes.

Virtutes, (Medici facultates, Plato vocat Animas) sunt tres illæ, quæ toti corpori, ex principiis, suo veluti fonte distributæ, animal gubernant. Prima, naturalis, alatrix, appetitrix, alterans, & concoquens appellatur, 2. progn. 26. ad nutriendum animal necessaria, stirpibus communis, quæ Jecur pro fonte habet; canales verò, ab hoc in totum corpus sparsos, obtinet ipsas venas. Altera, facultas seu anima vitalis, & animosa appellatur virtus, quæ non modo ut stirpibus, aut vitâ præditis, sed etiam ut animalibus, Anima est insita, sedem habet in Corde, ejusdemq; canales arteriæ sunt. Postrema, Ratiocinatrix; in Cerebro domicilium habens, voluntariis actionibus, unâ cum sensibus præsidens, cujus canales sunt nervi, sensum motumq; in totum animal deferentes. 9. meth. 10.

Vitalis motus. Vide Motuum species.

Vitel-

Vitellina sive lutea bilis. Vide Bilis pallida.

Vitiliginum, quas Alphos vocant, generatio, similis est cum eo affectu, quem Leuce sive albam Vitiliginem, Arabes Alboras appellant, non tamen sub iis tota caro vitatur, ut in Leuce, sed in summo corpore, veluti squama quapiam, Vitilignes consistunt; albæ quidem, ex pituitoso, nigra, ex melancholico succo exorta. 3. de sympt. caus. cap. 2. In Vitiligne autem alba, fit nutrimenti apostrophia, non assimilatio. 1. de natur. fac. cap. 11.

Vitreus oculi humor. Vide Hycloides, & CrySTALLINUS.

Vitreus humor, à Praxagorâ appellatur vitrea Pituita, pituita species est frigidissima; quippe vitro fusso, tum colore, tum substantiâ, haud ab similibus. 2. de loc. affect. 5.

Ulcerata dulcia. Vide Ochthode, & Dulcia ulcera.

Ulceratio oculi, est ruptio circa corneam tunicam, vel ex ictu, vel ex phlegmone proveniens. lib. finit. med.

Ulcus, Græcis Elcos. Vide Unionis solutio.

Ulcus depascens. Vide Phagedænas.

Ulna. Vide Cubitus.

Ullomelia, i. e. solimembra, est totius corporis, ex membris compago. 1. de usu part. 8.

Umbilicus, nihil aliud est, quam multitudo magnorum vasorum, quæ ex multis parvis venis, & arteriis, & propaginibus earumdem per totum Chorion dispersis, constata, eo loci unitur, per quæ ipsissima vasa, & sanguis, & spiritus ad fœtum derivatur, in medio urinaculum habentium. lib. de dissect. vulv. cap. 10.

Uncia habet drachmas octo, quæ drachmæ etiam Holce dicuntur. Drachma habet siliquas duo-de-vigin-

ii;

ti; alii dicunt scrupulos tres. Scrupulus habet obolos duos. Obolus siliquas tres. lib. de pond. & mens. cap. 3.

Undosus pulsus. Vide Vermiculans.

Unguis, sive Ungula. Vide Pterygium.

Unio. Vide Prosthefis.

Unionis solutio, sive Continuitatis solutio, est morbus, in quo partes, quæ secundum naturam unitæ debebant esse, à sese invicem solvuntur, lib. de const. art. c. 6. quæ quidem unionis solutio, si in osse fiat, dicitur Fractura, seu Catagma; in nervosis musculorum partibus ex distensione, Ruptura; in fibris, Convulsio, seu Spasma; in carne ex vulnere, Incisio; ex aliquo acuto, Punctura, seu Punctio; ex aliquo gravi, Contusio; ex erosione in osse, Tereodon; in carnosiss partibus, Ulcus; in instrumenta libus & ligamentis, Avulsio, sive Apophthagma: Ibid. in vasis, musculisq, ex violento ictu, vel gravi casu, vel alio quopiam valente motu excitata, Rhegma & Thlasma; cum contusione & ruptione, Ecchymosis, 4. meth. 1. ab aliquo acuto occurrente, atq, abscondente, Incisio, Dissectio, & Sedes. lib. de caus. morb. cap. 11.

Universalis morbus. Vide Communis.

Univoca. Vide Æquivoca.

Vocis organa voco, per quæ spiritus redditus, vox efficitur; hæc sunt, aspera arteria, guttur, fauces, veluti spiritus plectrum, per ipsas transeuntis; nam hæc vocis Instrumentum sunt, ut locutionis Lingua.

Volamânus, nominatur supina pars manûs, juxta pollicem assurgens, Græcè Thenar: cui pars opposita, Hypothenar, & Subvola vocatur. 1. de usu part. cap. 17.

Voluntarius motus. Vide Motuum species.

Vol-

Volvulus. Vide Ileos, & Chordapsus.

Volvulosa stomachi subversio. Vide Subversio.

Vomica. Vide Sinus, Fistula, &c.

Vomitus & Nausea, expultricis facultatis ventriculi depravati motus sunt, ad ea, quæ hujus in cavitate continentur, noxia quàm citissimè per stomachum vacuanda. Neg, idem est vomituum & singultientium motus; quippe in vomitionibus ea, quæ in capacitatem sunt ventris, rejiciuntur; in singultu, quæ in ipsa ventriculi sunt substantiæ & fibrosis nexubus, simili scilicet tum affectu, tum motu, qualis est iis, qui ex intemperie tussunt, omnibus nimirum ventriculi partibus, quod sibi molestum est, expellentibus. 3. de sympt. caus. cap. 2.

Vrachichronius (βραχυχρόν) morbus est, qui brevi tempore finitur. **Polychronius** verò, qui longo tempore perdurat. 3. de dieb. decr. cap. 13.

Urachòs, appellatur meatus, & Ligamentum, quod infantis Umbilico inferitur, ex quo etiam enascitur ille, & suspensus est, qui ipse meatus mutuo concursu quinq; vasorum umbilicalium absolvitur; nam à venis, quæ secundas implent, binæ prodeunt venæ, ab arteriis ibidem sitis, itidem binæ arteriæ, & à nervis unus nervus, qui complicati mutuo, Umbilicum absolvunt. lib. Introd. c. ii. Vide Umbilicus, & Urinaculum.

Uraniscus, i.e. parvum cælum, quod Latine palatum dicitur, pars est oris superior, à cæli similitudine fictum. lib. finit. med.

Urentia. Vide Caustica.

Ureteres, (pori Urinarii) sunt meatus oblongi & fortes, qui renes vesicæ committunt, & ducunt per colatoria, urinas à sanguine segregatas, ad vesicam. 5. de usu part. c. 5.

Qui

Qui Urinarii meatus nec arteriæ sunt, cum nec pulsant, nec duplici consistunt tunica; neg, venæ, quia sanguinem in se nullum continent, nec similem omnino venæ habent tunicam; à nervis autem plus distant, quàm à jam dictis. 1. de nat. fac. cap. 6.

Urethra, sive Urichra, est meatus penis, urina reddenda accommodatus, quem & fistulam urinariam appellant: 4. aph. 82. oritur à cervice vesicæ. 1. de loc. aff. c. i. Vide Fistula urinaria.

Uretica. Vide Diuretica.

Urina, quam Græci ὕρον vocant, est excrementum tenue & aquosum sanguinis. 5. de usu part. cap. 5. Vide Lotionium.

Urina optima, cujus sedimen album, & leve, & æquale extitit omni tempore, usq; dum judicatus fuerit morbus. lib. de atrâ bil. cap. 8.

Urinaculum, (quod Græci ὑρακόν, alii ὑρακόν vocant) est & dicitur illud, quod ex venis duabus totidemq; arteriis, & uno nervo simul in χεῖρ sive muliebribus locis quandam quasi caudam conficit: hoc meatu, qui à supremâ foris vesicæ fundi regione, per umbilicum in cavitatem pertinet, quæ inter secundum & tertium consistit involutum, lotium in alantoidea tunicam derivatur. Hunc solers Natura excogitavit atq; fabrefecit, ut fetus urinam, longius à corpore summo veret ipsius, & ne per vesicæ cervice urinam reddita, admotaq; teneræ cuti, ipsam suâ exulceraret acrimoniâ. Apud Hippocratem lib. πειγ. νεφελίας, ita legitur: Οὐδὲ τὴν νεφελίαν νέμειται τὴν ἐξατλίαν, ἀλλ' ἐνυατὰ λείπει τὸν ὑρακόν καὶ στεγνόν ἐστίν. ubi pro mucrone cordis sumitur. Vel brevius: **Urinaculum** est meatus, qui ex fundo vesicæ exortus, lotium in tunicam Alan-

A a

roidem in pregnantibus derivat: sic dictus à similitudine, quam habet cum intestinis. 15. de usu part. cap. 15. Vide Urachòs, & Umbilicus.

Urinarii. Vide Ureteres.

Urinarius meatus, Græcè ὑραχὸς, ὑρῆθρα. Vide Ureteres.

Urinæ difficultas & suppressio. Vide Ischuria.

Urinæ profluvium. Vide Diabetes.

Urinæ stillicidium. Vide Ischuria. 3. aph. 16.

Urinæ substantia. Vide Consistentia.

Uron. Vide Urina.

Uteraria. Vide Hysterica.

Uteri suffocatio, est respirationis ob uterum p.n. affectum ablatio: Apnoea etiam vocatur: item Uterina suffocatio, & strangulatio: 5. aph. 35. deniq; Hystericus morbus. 4. de caus. puls. cap. 22.

Uteri Rheuma. Vide Menfes.

Uterus, ὕστερ, Vulva, & Matrix, est ea corporis pars, quæ mulieribus ad concipiendum & pariendum, à Natura est concessa. 6. de loc. aff. cap. 5.

Utricularii. Vide Hyderici, & Ascites.

Uva. Vide Gargareon, & Staphyle.

Uvæ, Paristhmia, & Tonsillæ, nihil aliud sunt, quam inflammationes; Uvæ quidem, Gargareonis; Tonsillæ verò, adenum eorum, qui in principio faucium, inter se oppositi sunt; quemadmodum Paristhmia, corporum eorum, quæ in faucibus sunt. Videtur autem Hippocrates non omnem Gargareonis inflammationem, Uvam nominare, sed eam solam, quæ Gargareonis figura similis acino uvæ est. lib. de tumorib. cap. 17. Vide Staphyle, & Gargareon.

Uvæ

Uvæ vinosæ, quæ nullam vehementem qualitatem habent. 2. de aliment. fac. cap. 9.

Ulvea oculi tunica. Vide Rhagois, & Cœrulea.

Ulviformis. Vide Rhagois, & Cœrulea.

Vulgaris morbus. Vide Communis morbus.

Vullio (aut potius Divullio) est, cum fibra musculorum nimis distent & rumpuntur. Aliàs Discerptio appellatur. 3. de iis, quæ in med. 30.

Vulva. Vide Hystera, & Uterus.

Uvula. Vide Staphyle.

X

XEROPHTHALMIA (i.e. arida lippitudo) est & dicitur, cum angularū, qui in oculis sunt, ulcera & aspritudinem, & pruritum contraxerunt, palpebræ insuper rubent, & lacryma salsa & nitrosa ab oculis profluit. lib. Introd. cap. 15. Vide Sclerophthalmia.

Xerotribia, i.e. sicca frictio. 8. meth. 2.

Xiphoides. Vide Pectorale os, & Cartilago ensiformis.

Xyster. Vide Aures.

Z

ZOOGOMIA, i.e. animalium perfectorum univoca generatio. lib. de constit. art. cap. 13.

Zulapium, Actuarius, & alii recentiores Græci barbarâ voce appellant id, quod Officina iridem barbaro vocabulo Julepum nuncupant: fit ex stillatitio liquore, aut etiam ex succis cum saccharo decoctis, ad justam consistentiam, ut ex Mesue constat.

Zygoma os (sive Jugale os) est, quod temporis musculo præpositum, transversam in medio suturam habet, cujus posterior pars cum capitis osse, quod juxta aures est,

Aa 2

372 LEXIC. MED.

anterior cum parte supercilii extrema, ad parvum oculi
angulum, continuatur, lib. de osib. cap. 2. quod duplex
est, ad utramq; aurem, super foramina, per qua facultas
audiendi est, emergit. lib. Introd. cap. 11. Vulgò Os

paris vocant: alii Jugamentum: Græcis

σύνωα, sive *σύνωαδες*, quasi con-

jugale, & ex duobus con-

jugatum, voca-

tur.

F I N I S.

Pag. 344. lin. 16. legatur: & faucium: quam,
infficula, debiles &c. Pag. 349. lin. 21. propendens:
musculis, quos &c. Reliqua, levia forsan, errata.
Lector benevolus ipse corrigere non gravabitur.





